



INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fluconazol HEXAL 50 mg hårde kapsler
Fluconazol HEXAL 100 mg hårde kapsler
Fluconazol HEXAL 150 mg hårde kapsler
Fluconazol HEXAL 200 mg hårde kapsler

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fluconazol Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal
3. Sådan skal du tage Fluconazol Hexal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fluconazol er et svampemiddel af triazol-typen.

Fluconazol Hexal anvendes til at behandle:

Svampeinfektioner, der er forårsaget af gærsvampe. Det gælder særligt:

- **Svampeinfektioner**, forårsaget af Candida-svampe, og som angriber de **indre organer**, herunder:
 - Gærsvampe i blodet.
 - Spredning af Candida-svamp til et eller flere organer.
 - Andre Candida-infektioner i kroppen.
 - Svampeinfektioner, der særligt hos risikopatienter kan være livstruende, f.eks. infektioner i bughinden.
- **Meningitis** (betændelse i hjerne-rygmarvshinderne), der er forårsaget af gærsvampen *Cryptococcus neoformans* hos patienter med svækket immunforsvar.



- Candida-forårsagede **svampeinfektioner i slimhinder** hos patienter med svækket immunforsvar, f.eks.:
 - infektioner i munden, svælget eller spiserøret.
 - infektioner i slimhinderne i de øvre luftveje, hvis lungerne ikke er berørte.
- infektioner med Candida-smitstoffer i urinen.
- **Forebyggelse af Candida-infektioner** hos patienter med nedsat antal hvide blodlegemer (f.eks. i forbindelse med en knoglemarvstransplantation).
- **Svampeinfektioner i huden**, der er bekræftet ved mikroskopiundersøgelse, herunder svampeinfektioner på overkroppen, underbenene eller fødderne i tilfælde, hvor systemisk behandling bør overvejes.
- Akutte og tilbagevendende Candida-forårsagede **svampeinfektioner i skeden**, der ikke kan behandles lokalt.

Fluconazol Hexal må ikke anvendes til behandling af tinea capitis ("ringorm i hovedbunden") hos børn.

Fluconazol, der er det aktive stof i dette lægemiddel, tilhører en gruppe af aktive stoffer, der kaldes triazolderivater.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLUCONAZOL HEXAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluconazol Hexal

- Hvis du er **overfølsom** (allergisk) over for **fluconazol**, over for azoler eller over for et eller flere af **hjælpestofferne** i Fluconazol Hexal.
- **Samtidig med terfenadin**, hvis du får flere doser af fluconazol på 400 mg pr. dag eller mere, eller samtidig med lægemidler, der indeholder **cisaprid** (anvendes normalt til behandling af kvalme og opkastning), **pimozid** (anvendes ved mentale forstyrrelser), **astemizol** (anvendes til sæsonbetonede allergier) eller **quinidin** (anvendes til behandling af malaria og regulering af hjerterytmen). Denne kombination kan give hjerteproblemer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Fluconazol Hexal

- Fluconazol kan give en hurtig og alvorlig leverbetændelse, som kan medføre livstruende leversvigt (se pkt. 4 "Bivirkninger"). Kontakt lægen, før du ophører med behandlingen, hvis du udvikler tegn som utilpashed, der kommer hurtigt, og/eller utilpashed forbundet med, at det hvide i øjnene bliver gult, mørk urin, hudkløe, tendens til at bløde eller hjernesygdom på grund af leveren (symptomer på nedsat leverfunktion eller hurtig og alvorlig leverbetændelse).
- Hvis du udvikler hudafskalning eller hududslæt, mens du er i behandling med fluconazol, skal du fortælle det til lægen. Lægen vil enten afbryde behandlingen med Fluconazol Hexal eller følge dig tæt under behandlingen.



- Fluconazol skal anvendes med forsigtighed, hvis du på samme tid får medicin, der påvirker hjerterytmen, og hvis du er tilbøjelig til at have uregelmæssig hjerterytme (arytmier).
- Hvis din nyrefunktion er alvorligt nedsat, skal dosis nedsættes. Se også pkt. 3 "Sådan skal du tage Fluconazol Hexal".
- Du skal fortælle det til lægen, hvis du tager anden medicin på samme tid. Lægen vil afgøre, om du skal overvåges (se også afsnittet "Brug af anden medicin").
- Hvis du får en alvorlig overfølsomhedsreaktion. Se også pkt. 4 "Bivirkninger".

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til **lægen eller apoteket**, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager følgende lægemidler:

- **Terfenadin**, der er et lægemiddel mod allergi.
- **Astemizol**, der er et lægemiddel mod allergi.
- **Cisaprid**, der er et lægemiddel mod mave-tarmforstyrrelser.
- **Pimozid**, der er et lægemiddel mod psykoser.
- **Quinidin**, der er et lægemiddel mod uregelmæssig hjerterytme og **erythromycin**, der er et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner.

Samtidig brug af fluconazol og et eller flere af ovennævnte lægemidler kan medføre forhøjet indhold af disse lægemidler i blodet og dermed øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. På grund af denne alvorlige risiko for uregelmæssig hjerterytme og dermed for livstruende hjertestop må astemizol, cisaprid, pimozid og quinidin ikke anvendes samtidig med fluconazol, og erythromycin bør ikke anvendes samtidig med fluconazol. Terfenadin må ikke anvendes sammen med fluconazol, hvis fluconazoldosis er på 400 mg eller mere. Hvis fluconazoldosis er mindre end 400 mg kan samtidig anvendelse finde sted under tæt lægelig kontrol.

Virkningen af Fluconazol Hexal kan påvirkes ved samtidig behandling med:

- **Hydrochlorthiazid**, et vanddrivende middel.
- **Rifampicin**, et lægemiddel mod tuberkulose.

Fluconazol hæmmer visse stofskifteenzymmer. Blodkoncentrationen af lægemidler, der omsættes af disse enzymer (f.eks. også **sekalealkaloïder**), kan stige, hvis de anvendes sammen med fluconazol. Disse kombinationer skal derfor anvendes med forsigtighed og under tæt lægelig overvågning indtil 4-5 dage efter endt behandling.

Herudover kan virkningen af følgende lægemidler påvirkes ved samtidig anvendelse af fluconazol:

- **Alfentanil**, et bedøvelsesmiddel.
- **Amitriptylin, nortriptylin**, lægemidler mod depression.
- **Amphotericin B**, et lægemiddel mod svampeinfektioner.
- **Blodfortyndende midler af coumarin-typen**, såsom phenprocoumon og warfarin
- **Benzodiazepiner**, såsom midazolam and triazolam.



- **Carbamazepin**, et lægemiddel mod epilepsi.
- **Celecoxib**, et smertestillende lægemiddel (antiinflammatorisk).
- **Ciclosporin**, et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet.
- **Cyclophosphamid**, et lægemiddel til behandling af kræft.
- **Diabetesmedicin af sulfonylurinstof-typen**, såsom chlorpropamid, glibenclamid, glipizid og tolbutamid.

- **Fentanyl**, et lægemiddel til behandling af stærke smerter.
- **Halofantrin**, et lægemiddel mod malaria.
- **Kolesterolsænkende lægemidler**
som f.eks. atorvastatin, simvastatin og fluvastatin.
Hvis de anvendes sammen med Fluconazol Hexal, kan det øge risikoen for forandringer i musklerne.
- **Losartan**, et blodtrykssænkende lægemiddel.
- **Methadon**, et lægemiddel til behandling af afhængighed af stoffer.
- **Nifedipin, isradipin, nicardipine, amlodipin og felodipin**, lægemidler mod forhøjet blodtryk og visse hjertesygdomme.
- **P-piller**.
- **Phenytoin**, et lægemiddel mod epilepsi.
- **Prednison**, et steroidhormon.
- **Rifabutin**, et lægemiddel mod tuberkulose.
- **Saquinavir**, et lægemiddel til HIV-behandling.
- **Tacrolimus og sirolimus**, lægemidler, der undertrykker immunsystemet.
- **Theophyllin**, et lægemiddel mod astma.
- **Vincaalkaloider**, lægemidler til behandling af kræft.
- **Vitamin A**.
- **Visse betændelsesdæmpende lægemidler**, f.eks. flurbiprofen, ibuprofen, naproxen, lornoxicam, meloxicam og diclofenac.
- **Zidovudin**, et lægemiddel til HIV-behandling.

Lægemidler mod for meget mavesyre samt strålebehandling påvirker ikke i betydelig grad optagelsen af fluconazol fra mave-tarmkanalen.

Brug af Fluconazol Hexal sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluconazol Hexal sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du ikke tage Fluconazol Hexal, medmindre din læge klart har anbefalet det.

Amning

Hvis du tager Fluconazol Hexal, mens du ammer, kan det muligvis påvirke dit barn. Derfor frarådes amning. Tal med lægen, inden du begynder at tage Fluconazol Hexal hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluconazol Hexal kan give bivirkninger som svimmelhed eller krampeanfald, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol Hexal**

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Dette lægemiddel indeholder det røde farvestof ponceau 4R (E 124), der kan forårsage overfølsomhedsreaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TAGE FLUCONAZOL HEXAL

Tag altid Fluconazol Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Indtagelse

Kapslerne må ikke tygges men skal synkes hele med et glas vand på samme tidspunkt hver dag uafhængigt af måltider.

Den sædvanlige dosering og behandlingsvarighed er som følger:

Voksne***Fluconazol Hexal 50 mg:***

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af *Candida*:
8-16 hårde* kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.
Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.
- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:
Behandling af meningitis:
8 hårde kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.
Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.
Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:
4 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.
- **Svampeinfektioner i slimhinderne**
Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar.
1-2 hårde kapsler en gang dagligt.
Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.
Forebyggelse af svampeinfektioner:
1-8 hårde kapsler en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.
- **Svampeinfektioner i huden**
Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:



1 hård kapsel en gang om dagen eller 3 hårde kapsler en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

1 hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

3 hårde kapsler som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 100 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af *Candida*:

4-8 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

4 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

2 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar.

50 mg* en gang dagligt.

Dosis kan øges til 1 Fluconazol Hexal 100 mg hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50 mg* til 400 mg (4 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.

- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

150 mg* som enkeltdosis.



Fluconazol Hexal 150 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af Candida:
400-800 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.
Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

400 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

200 mg* en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar:

50-100 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50-400 mg* en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.

- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 1 Fluconazol Hexal 150 mg hård kapsel en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

1 hård kapsel som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 200 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af Candida:
2-4 hårde kapsler den første dag. Herefter 1-2 hårde kapsler en gang dagligt.
Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

1-2 hårde kapsler en gang dagligt.



Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

1 hård kapsel en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar:

50-100 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50 mg* til 400 mg (2 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.

- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

150 mg* som enkeltdosis.

Ældre

Medmindre du har nyreproblemer, skal du anvende den samme dosis som angivet under ”Voksne”.

Børn

Til indtagelse gennem munden hos børn anbefales det at anvende en opløsning og pulver/granulat, som kan fås i handlen.

Der anbefales følgende doser pr. kg legemsvægt til børn:

Børn over 4 uger gamle:

- **Svampeinfektioner i slimhinderne:**

3-6 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt en gang dagligt.

- **Candida- og kryptokokkinfektioner i kroppen:**

6-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.

- **Forebyggelse af svampeinfektioner hos børn med nedsat antal hvide blodlegemer:**

3-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.



Børn må maksimalt få en dosis på 400 mg dagligt.

Børn på 4 uger og derunder:

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. I barnets **første 2 uger** skal der doseres det samme antal mg pr. kg som til ældre børn, men dosis skal administreres hver 72. time. Børn i denne aldersgruppe må maksimalt få en dosis på 12 mg/kg hver 72. time.

I barnets **3. og 4. uge** skal der gives den samme dosis hver 48. time. Børn i denne aldersgruppe må maksimalt få en dosis på 12 mg/kg hver 48. time.

Dosis til børn med nedsat nyrefunktion skal justeres i henhold til retningslinjerne for voksne (se nedenfor), afhængigt af hvor meget nyrefunktionen er nedsat.

Børn og voksne med nedsat nyrefunktion

Afhængigt af din nyrefunktion vil din læge muligvis justere ovennævnte doser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du føler, at virkningen af Fluconazol Hexal er for stærk eller svag.

Hvis du har taget for mange Fluconazol Hexal hårde kapsler

Kontakt altid lægen, så lægen kan tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluconazol Hexal end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Hexal

Hvis du har glemt en dosis, kan du uden problemer tage den senere samme dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fluconazol Hexal

For at undgå vedvarende eller tilbagevendende svampeinfektioner, skal du tage Fluconazol Hexal regelmæssigt med den dosering og i så lang tid, som lægen har anvist.

* Til denne dosering findes hårde kapsler med andre styrker.

4. BIVIRKNINGER

Fluconazol Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige livstruende bivirkninger:

Hvis du udvikler en alvorlig **overfølsomhedsreaktion** over for dette lægemiddel, skal du **straks** holde op med at tage det og **straks** kontakte lægen eller tage til nærmeste skadestue, da du kan have behov for øjeblikkelig lægehjælp.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed.

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede, men hos færre end 1 ud af 10 behandlede)

- Hovedpine.



- Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning.
- Forhøjelse af bestemte leverværdier.
- Hududslæt.

Ikke almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 behandlede, men hos færre end 1 ud af 100 behandlede)

- Nedsat kaliumindhold i blodet.
- Søvnløshed, søvnighed.
- Krampeanfald, svimmelhed, myrekryb, ændret smagssans.
- Vertigo (snurrende fornemmelse i hovedet).
- Fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed.
- Ophobning af galdevæske, gulsot (gul hud).
- Kløe, nældefeber, øget svedtendens, hududslæt forårsaget af lægemiddelforgiftning.
- Muskelsmerter.
- Udmattelse, utilpashed, svaghed, feber.

Sjældne (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 behandlede, men hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede)

- Ændrede blodtal, f.eks. et nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader.
- Alvorlige generaliserede overfølsomhedsreaktioner.
- Øget indhold af kolesterol og triglycerider i blodet.
- Rysten.
- Uregelmæssig hjerterytme (arytmi).
- Leversvigt, ødelæggelse af leverceller, leverbetændelse, skade på leverceller.
- Alvorlige hudlidelser med hudafskalning, pusholdige blærer, forskellige former for rødfarvning af huden, hævelse af huden, hævelser i ansigtet, hårtab.

Børn: De bivirkninger hos børn, der er indberettet, kan sammenlignes med de bivirkninger, der er set hos voksne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en **bivirkning** er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fluconazol Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.



6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fluconazol Hexal indeholder

- Aktivt stof: fluconazol.
Én hård kapsel indeholder 50, 100, 150, 200 mg fluconazol.
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, gelatine, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, kolloidt vandfrit silica, titandioxid (E 171).

Fluconazol Hexal 50, 100, 200 mg indeholder desuden:
Indigocarmin (E 132)

Fluconazol Hexal 200 mg indeholder desuden:
Ponceau 4R rødt farvestof (E 124)

Farveprint: Shellak, sort jernoxid (E 172), propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

Fluconazol Hexal 50 mg hårde kapsler er lyseblå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 100 mg:

Fluconazol Hexal 100 mg hårde kapsler er blå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 150 mg:

Fluconazol Hexal 150 mg hårde kapsler er hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 1, 2, 4 eller 6 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Fluconazol Hexal 200 mg hårde kapsler er lilla og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 18. November 2009.