



INDLÆGSSEDDEL



INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Fluconazol HEXAL 50, 100, 150, 200 mg hårde kapsler Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Fluconazol Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Fluconazol Hexals virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal
3. Sådan skal du tage Fluconazol Hexal
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Fluconazol Hexal
6. Yderligere oplysninger

1. **Fluconazol Hexals virkning og hvad du skal bruge det til**
Fluconazol er et svampemiddel af triazol-typen.

Fluconazol Hexal anvendes til at behandle:

Svampeinfektioner, der er forårsaget af gærsvampe. Det gælder særligt:

- **Svampeinfektioner**, forårsaget af Candida-svampe, og som angriber de **indre organer**, herunder:
 - Gærsvampe i blodet.
 - Spredning af Candida-svamp til et eller flere organer.
 - Andre Candida-infektioner i kroppen.
 - Svampeinfektioner, der særligt hos risikopatienter kan være livstruende, f.eks. infektioner i bughinden.
- **Meningitis** (betændelse i hjerne-rygmarvshinderne), der er forårsaget af gærsvampen *Cryptococcus neoformans* hos patienter med svækket immunforsvar.
- Candida-forårsagede **svampeinfektioner i slimhinder** hos patienter med svækket immunforsvar, f.eks.:
 - infektioner i munden, svelget eller spiserøret.
 - infektioner i slimhinderne i de øvre luftveje, hvis lungerne ikke er berørte.



- infektioner med Candida-smitstoffer i urinen.
- **Forebyggelse af Candida-infektioner** hos patienter med nedsat antal hvide blodlegemer (f.eks. i forbindelse med en knoglemarvstransplantation).
- **Svampeinfektioner i huden**, der er bekræftet ved mikroskopiundersøgelse, herunder svampeinfektioner på overkroppen, underbenene eller fødderne i tilfælde, hvor systemisk behandling bør overvejes.
- Akutte og tilbagevendende Candida-forårsagede **svampeinfektioner i skeden**, der ikke kan behandles lokalt.

Fluconazol, der er det aktive stof i dette lægemiddel, tilhører en gruppe af aktive stoffer, der kaldes triazolderivater.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal

Tag ikke Fluconazol Hexal

- Hvis du er **overfølsom** (allergisk) over for **fluconazol**, over for azoler eller over for et eller flere af **hjælpestofferne** i Fluconazol Hexal.
- **Sammen med lægemidler** som f.eks. cisaprid, astemizol, terfenadin, pimozid og quinidin. Se også "Vær ekstra forsigtig med at tage Fluconazol Hexal" og "Brug af anden medicin".

Vær ekstra forsigtig med at tage Fluconazol Hexal

- Hvis dine levertal forværres under behandlingen med fluconazol, bør du følges tæt af din læge. Lægen vil afbryde behandlingen ved de første tegn på leverskade (såsom pludselig utilpashed og/eller opkastning ledsaget af gulfarvning af det hvide i øjnene, mørk urin, kløe i huden eller øget blødningstendens). Lever tallene kan som regel normaliseres.
- Vær forsigtig med at bruge fluconazol, hvis du samtidig får medicin, der påvirker din hjerterytme, og hvis du har tilbøjelighed til uregelmæssig hjerterytme eller har alvorlige hjertelidelser eller elektrolytforstyrrelser som f.eks. nedsat kalium-, magnesium- eller calciumindhold i blodet.
- Hvis du udvikler hudafskalning eller hududslæt, mens du er i behandling med fluconazol, skal du fortælle det til lægen. Lægen vil enten afbryde behandlingen med Fluconazol Hexal eller følge dig tæt under behandlingen.



- Hvis din nyrefunktion er alvorligt nedsat, skal dosis nedsættes. Se også pkt. 3 "Sådan skal du tage Fluconazol Hexal".
- Hvis du får en alvorlig overfølsomhedsreaktion. Se også pkt. 4 "Bivirkninger".

Børn

Da erfaringen med behandling af børn er begrænset, bør Fluconazol Hexal ikke anvendes til børn under 16 år, hvis der forefindes andre behandlingsmuligheder.

Ældre (over 65 år)

Dosis skal tilpasses i tilfælde af nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til **lægen eller apoteket**, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager følgende lægemidler:

- **Terfenadin**, der er et lægemiddel mod allergi.
- **Astemizol**, der er et lægemiddel mod allergi.
- **Cisaprid**, der er et lægemiddel mod mave-tarmforstyrrelser.
- **Pimozid**, der er et lægemiddel mod psykoser.
- **Quinidin**, der er et lægemiddel mod uregelmæssig hjerterytme.

Samtidig brug af fluconazol og et eller flere af ovennævnte lægemidler kan medføre forhøjet indhold af disse lægemidler i blodet og dermed øge risikoen for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. På grund af denne alvorlige risiko for uregelmæssig hjerterytme og dermed for livstruende hjertestop, må astemizol og cisaprid ikke anvendes samtidig med fluconazol. Terfenadin må ikke anvendes sammen med fluconazol, hvis fluconazoldosis er på 400 mg eller mere. Hvis fluconazoldosis er mindre end 400 mg kan samtidig anvendelse finde sted under tæt lægelig kontrol.

Virkningen af Fluconazol Hexal kan påvirkes ved samtidig behandling med:

- **Hydrochlorthiazid**, et vanddrivende middel.
- **Rifampicin**, et lægemiddel mod tuberkulose.

Fluconazol hæmmer visse stofskifteenzymmer. Blodkoncentrationen af lægemidler, der omsættes af disse enzymer (f.eks. også **sekalealkaloider**), kan stige, hvis de anvendes sammen med fluconazol. Disse kombinationer skal derfor anvendes med forsigtighed og under tæt lægelig overvågning indtil 4-5 dage efter endt behandling.

Herudover kan virkningen af følgende lægemidler påvirkes ved samtidig anvendelse af fluconazol:

- **Alfentanil**, et bedøvelsesmiddel.
- **Amitriptylin**, et lægemiddel mod depression.
- **Amphotericin B**, et lægemiddel mod svampeinfektioner.



- **Blodfortyndende midler af coumarin-typen**, såsom phenprocoumon og warfarin
- **Benzodiazepiner**, såsom midazolam and triazolam.
- **Nifedipin, isradipin, nicardipine, amlodipin og felodipin**, lægemidler mod forhøjet blodtryk og visse hjertesygdomme.
- **Carbamazepin**, et lægemiddel mod epilepsi.
- **Celecoxib**, et smertestillende lægemiddel (antiinflammatorisk).
- **Cyclosporin**, et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet.
- **Didanosin**, et lægemiddel mod HIV.
- **Halofantrin**, et lægemiddel mod malaria.
- **Kolesterolsænkende lægemidler**
som f.eks. atorvastatin, simvastatin og fluvastatin.
Hvis de anvendes sammen med Fluconazol Hexal, kan det øge risikoen for forandringer i musklerne.
- **Losartan**, et blodtrykssænkende lægemiddel.
- **P-piller**.
- **Phenytoin**, et lægemiddel mod epilepsi.
- **Prednison**, et steroidhormon.
- **Rifabutin**, et lægemiddel mod tuberkulose.
- **Diabetesmedicin af sulfonylurinstof-typen**, såsom chlorpropamid, glibenclamid, glipizid og tolbutamid.
- **Tacrolimus og sirolimus**, lægmidler, der undertrykker immunsystemet.
- **Theophyllin**, et lægemiddel mod astma.
- **Trimetrexat**, et lægemiddel mod kræft.
- **Zidovudin**, et lægemiddel mod HIV.

Lægemidler mod for meget mavesyre samt strålebehandling påvirker ikke i betydelig grad optagelsen af fluconazol fra mave-tarmkanalen.

Brug af Fluconazol Hexal sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluconazol Hexal sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du ikke tage Fluconazol Hexal, medmindre din læge klart har anbefalet det. Hvis du er i langtidsbehandling med Fluconazol Hexal (mere end en uge) og i den fødedygtige alder, skal du bruge et sikkert præventionsmiddel under behandlingen.

Amning

Hvis du tager Fluconazol Hexal, mens du ammer, kan det muligvis påvirke dit barn. Tal derfor med lægen, inden du begynder at tage Fluconazol Hexal, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Fluconazol Hexal påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog kan der opstå svimmelhed eller krampeanfald. Se afsnit 4.



Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol Hexal

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Farvestoffet ponceau R4 kan forårsage overfølsomhedsreaktioner.

3. Sådan skal du tage Fluconazol Hexal

Tag altid Fluconazol Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Indtagelse

Kapslerne må ikke tygges men skal synkes hele med et glas vand på samme tidspunkt hver dag uafhængigt af måltider.

Den sædvanlige dosering og behandlingsvarighed er som følger:

Voksne

Fluconazol Hexal 50 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af *Candida*:

8 hårde kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

8 hårde kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

4 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar.

1-2 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

1-8 hårde kapsler en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.



- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

1 hård kapsel en gang om dagen eller 3 hårde kapsler en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

1 hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

3 hårde kapsler som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 100 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af *Candida*:

4 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

4 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

2 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar.

50 mg* en gang dagligt.

Dosis kan øges til 1 Fluconazol Hexal 100 mg hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50 mg* til 400 mg (4 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.

- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.



Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

150 mg* som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 150 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af Candida:

400 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:

Behandling af meningitis:

400 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

200 mg* en gang dagligt på ubestemt tid.

- **Svampeinfektioner i slimhinderne**

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar:

50-100 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50-400 mg* en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.

- **Svampeinfektioner i huden**

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 1 Fluconazol Hexal 150 mg hård kapsel en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

- **Svampeinfektioner i skeden**

1 hård kapsel som enkeltdosis.



Fluconazol Hexal 200 mg:

- **Svampeinfektioner i kroppen** forårsaget af Candida:
2 hårde kapsler den første dag. Herefter 1-2 hårde kapsler en gang dagligt.
Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.
- **Meningitis** (hjernehindebetændelse) forårsaget af *Cryptococcus*:
Behandling af meningitis:
1-2 hårde kapsler en gang dagligt.
Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.
Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:
1 hård kapsel en gang dagligt på ubestemt tid.
- **Svampeinfektioner i slimhinderne**
Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med svækket immunforsvar:
50-100 mg* en gang dagligt.
Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.
Forebyggelse af svampeinfektioner:
50 mg* til 400 mg (2 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en svampeinfektion.
- **Svampeinfektioner i huden**
Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:
50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.
Behandlingsvarighed: 2-4 uger.
Fodsvamp:
50 mg* en gang dagligt.
Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.
- **Svampeinfektioner i skeden**
150 mg* som enkeltdosis.

Ældre

Medmindre du har nyreproblemer, skal du anvende den samme dosis som angivet under ”Voksne”.

Anvendelse til børn når anden behandling ikke er mulig



Det anbefales at anvende andre tilgængelige lægemiddelformer til børn (infusionsvæske/pulver/granulat).

Fluconazol Hexal bør ikke anvendes til børn under 16 år, medmindre der ikke er andre behandlingsmuligheder. Den maksimale dosis til børn er 400 mg en gang dagligt. Den anbefalede dosis pr. kg. legemsvægt er:

Børn over 4 uger gamle:

- **Svampeinfektioner i slimhinderne:**
3-6 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt en gang dagligt.
- **Candida- og kryptokokinfektioner i kroppen:**
6-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.
- **Forebyggelse af Candida-infektioner hos børn med nedsat antal hvide blodlegemer:**
3-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.

Børn og voksne med nedsat nyrefunktion

Afhængig af din nyrefunktion vil din læge muligvis justere ovennævnte doser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du føler, at Fluconazol Hexals virkning er for stærk eller svag.

Hvis du har taget for mange Fluconazol Hexal

Kontakt altid lægen, så lægen kan tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Hexal

Hvis du har glemt en dosis, kan du uden problemer tage den senere samme dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fluconazol Hexal

For at undgå vedvarende eller tilbagevendende svampeinfektioner, skal du tage Fluconazol Hexal regelmæssigt med den dosering og i så lang tid, som lægen har anvist.

* Til denne dosering findes hårde kapsler med andre styrker.

4. Bivirkninger

Fluconazol Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige livstruende bivirkninger:



Hvis du udvikler en alvorlig **overfølsomhedsreaktion** over for dette lægemiddel, skal du **straks** holde op med at tage det og **straks** kontakte lægen eller tage til nærmeste skadestue, da du kan have behov for øjeblikkelig lægehjælp.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed.

De kan være:

- **Almindelige:** Forekommer hos mere end 1 ud af 100 behandlede men hos færre end 1 ud af 10 behandlede.
- **Ikke almindelige:** Forekommer hos mere end 1 ud af 1.000 behandlede men hos færre end 1 ud af 100 behandlede.
- **Sjældne:** Forekommer hos mere end 1 ud af 10.000 behandlede men hos færre end 1 ud af 100 behandlede.
- **Meget sjældne:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

- Blodmangel.

Sjælden:

- Ændrede blodtællinger, som f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader.

Immunsystemet

Sjælden:

- Alvorlige, generaliserede overfølsomhedsreaktioner.

Metabolisme og ernæring

Sjælden:

- Øget kolesterolindhold i blodet.
- Øget triglyceridindhold i blodet.
- Nedsat kaliumindhold i blodet.

Psykkiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

- Søvnløshed.
- Søvnighed.

Nervesystemet

Almindelig:

- Hovedpine

Ikke almindelig:

- Krampeanfald.
- Døsighed.
- Myrekryb.



- Rysten.
- Svimmelhed.
- Ændret smagssans.

Hjerte

Sjælden:

- Uregelmæssig hjerterytme.

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

- Kvalme.
- Opkastning.
- Mavesmerter.
- Diarré.

Ikke almindelig:

- Appetitløshed.
- Forstoppelse.
- Fordøjelsesbesvær.
- Luft i tarmen.
- Tør mund.

Lever og galdeveje

Almindelig:

- Stigninger i visse levertal.

Ikke almindelig:

- Ophobning af galdevæske.
- Levercellebeskadigelse.
- Gulsot.
- Øget indhold af bilirubin i blodet.
- Levercelleødelæggelse.

Sjælden:

- Leversvigt.
- Leverbetændelse.

Hud og subkutane væv

Almindelig:

- Hududslæt.

Ikke almindelig:

- Kløe.
- Øget svedtendens.
- Nældefeber.

Sjælden:



- Alvorlige hudlidelser med hudafskalning.
- Hårtab.

Meget sjældent:

- Hævelse af huden.
- Hævelser i ansigtet.
- Hududslæt forårsaget af lægemiddelforgiftning.
- Akne.
- Forskellige former for rødfarvning af huden.

Knogler, led og muskler

Ikke almindelig:

- Muskelsmerter.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

- Udmattelse.
- Utilpashed.
- Svækkelse.
- Feber.

Bivirkninger ses hyppigere hos HIV-patienter (21%) end hos patienter uden HIV (13%). Dog er typen af bivirkninger sammenlignelige hos personer med og uden HIV.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en **bivirkning** bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer du Fluconazol Hexal

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fluconazol Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30° C.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.

6. Yderligere oplysninger

Fluconazol Hexal indeholder

- **Aktivt stof: Fluconazol.**



En hård kapsel indeholder 50, 100, 150, 200 mg fluconazol.

- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, gelatine, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, kolloid, vandfri silica, titandioxid (E171).

Fluconazol Hexal 50, 100, 200 mg indeholder desuden:

Indigocarmin (E132)

Fluconazol Hexal 200 mg indeholder desuden:

Ponceau 4R rødt farvestof (E124)

Farveprint: Shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol.

Fluconazol Hexals udseende og pakningsstørrelse

Fluconazol Hexal 50 mg hårde kapsler er lyseblå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 100 mg:

Fluconazol Hexal 100 mg hårde kapsler er blå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 150 mg:

Fluconazol Hexal 150 mg hårde kapsler er hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 1, 2, 4 eller 6 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Fluconazol Hexal 200 mg hårde kapsler er lilla og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Kanalholmen 8–12, 2650 Hvidovre, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12. marts 2008.