

Indlægsseddel: Information til brugeren
Carbidopa/Levodopa 2care4 25 mg/100 mg tabletter
carbidopa/levodopa

12-2023
P405429-2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbidopa/Levodopa 2care4
3. Sådan skal du tage Carbidopa/Levodopa 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

- Carbidopa/Levodopa 2care4 er et middel mod Parkinsons sygdom, der tilhører gruppen dopaminerge stoffer.
- Carbidopa/Levodopa 2care4 øger virkningen af dopamin (et signalstof i hjernen). Det dæmper derved symptomer ved Parkinsons sygdom som muskelstivhed og rysten. Carbidopa/Levodopa 2care4 indeholder to stoffer. Dels levodopa, som erstatter det manglende dopamin i hjernen, dels carbidopa, som gør, at du kan nøjes med en mindre mængde levodopa.
- Du skal tage Carbidopa/Levodopa 2care4 mod Parkinsons sygdom og Parkinsons syndrom.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carbidopa/Levodopa 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Carbidopa/Levodopa 2care4:

- hvis du er allergisk over for levodopa, carbidopa eller et af de øvrige indholdsstoffer i Carbidopa/Levodopa 2care4 (angivet i afsnit 6).
- hvis du har eller tidligere har haft sår eller svulster i huden, som du ikke med sikkerhed ved er eller var godartede.
- hvis du tager isocarboxazid mod depression (eller lignende stoffer kaldet non-selektive monoaminoxidase hæmmere). Du må først tage Carbidopa/Levodopa 2care4 2 uger efter, du er stoppet behandlingen mod depression. Tal med lægen.
- hvis du tager moclobemid mod depression samtidig med selegilin eller rasagilin mod Parkinsons sygdom.
- hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Carbidopa/Levodopa 2care4, hvis du:

- er i behandling med andre lægemidler mod Parkinsons sygdom (levodopa). Din læge vil normalt stoppe behandlingen med levodopa mindst 12 timer før, du skal tage Carbidopa/Levodopa 2care4
- har eller tidligere har haft en sindslidelse. Det omfatter også depression
- tidligere har haft en blodprop i hjertet og har en hurtig, evt. uregelmæssig puls
- har en alvorlig sygdom i hjerte eller blodkar
- har lungesygdomme, fx astma
- har dårlige nyrer
- har dårlig lever
- har sygdomme i hypofysen, skjoldbruskkirtlen eller binyrerne
- tidligere har haft mavesår
- tidligere har haft krampes
- har grøn stær (glaukom). Ved nogle former for grøn stær (kronisk åbenvinklet glaukom) kan du godt tage Carbidopa/Levodopa 2care4, hvis din øjensygdom er godt behandlet. Tal under alle omstændigheder med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du:

- får feber, muskelstivhed og ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Kontakt lægen, hvis:

- du får ufrivillige bevægelser under behandlingen. Det kan være nødvendigt at justere dosis.
- der sker ændringer i din sindstilstand.
- du eller din familie/behandler bemærker, at du er ved at udvikle misbrugslignende symptomer, der kan medføre trang til større doser Sinemet og andre lægemidler, der anvendes til behandling af Parkinsons sygdom.
- du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd, som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen til at udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for adfærd kaldes sygelige vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. Der kan være behov for, at lægen ændrer din behandling.
- du skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld bedøvelse. Fortæl lægen, at du er i behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4.

Vær opmærksom på følgende:

- hvis du tidligere har været i behandling med levodopa alene, kan du få ufrivillige bevægelsesforstyrrelser. Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen.
- hvis du har diabetes (sukkersyge), skal du kontrollere dit blodsukker hyppigt og evt. tale med din læge om justering af dit lægemiddel mod diabetes.
- din læge vil normalt undersøge din hjertefunktion under behandlingen.
- så længe du får Carbidopa/Levodopa 2care4, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.
- oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
- behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4 kan gøre, at du pludselig falder i søvn, nogle gange uden at være søvngig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil, motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens du tager Carbidopa/Levodopa 2care4. Tal med lægen.
- behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4 kan medføre lægemiddelmisbrug, der kan medføre trang til større doser af lægemidlet.

Brug af andre lægemidler sammen med Carbidopa/Levodopa 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Du må ikke tage Carbidopa/Levodopa 2care4, hvis du er i behandling med isocarboxazid (lægemidler mod depression). Tal med lægen.

Hvis du samtidig med Carbidopa/Levodopa 2care4 tager selegilin mod Parkinsons sygdom, må du ikke tage moclobemid mod depression. Tal med lægen.

Tal med din læge, hvis du tager:

- andre lægemidler mod Parkinsons sygdom. Det kan være nødvendigt at ændre dosis af Carbidopa/Levodopa 2care4.
- lægemidler mod astma eller rygerlunger (KOL).
- lægemidler mod depression (fx moclobemid, tricykliske antidepressiva). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- jerntilskud (ferrosulfat, ferrogluconat). Du skal tage jern og Carbidopa/Levodopa 2care4 med forskudt indtagelsestidspunkt. Tal med lægen.
- lægemidler mod kvalme og opkastning (metoclopramid).
- lægemidler mod skizofreni og andre psykiske sygdomme (risperidon, phenothiaziner og butyrophenoner).
- lægemidler mod stærke smerter (opioider).
- lægemidler mod tuberkulose (isoniazid).
- lægemidler mod højt blodtryk. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
- lægemidler mod epilepsi (phenytoin).
- lægemidler mod muskeltrækningsmidler (papaverin).
- lægemidler, der påvirker nervesystemet (amfetamin)
- lægemidler mod andre sygdomme, der er relateret til ufrivillige bevægelser.

Carbidopa/Levodopa 2care4 kan påvirke visse andre prøveresultater, fx ved måling af blodsukker. Tal med lægen.

Kontakt din læge. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Vær opmærksom på, at dette også kan gælde for lægemidler, som du har taget for op til 2 uger siden, eller som du skal tage samtidig med Carbidopa/Levodopa 2care4.

Hvis du pludselig får meget lavt blodtryk, som lægen behandler med en indsprøjtning (fx adrenalin, noradrenalin, isoprenalin eller dopamin), skal du eller dine pårørende fortælle lægen, at du er i behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4.

Brug af Carbidopa/Levodopa 2care4 sammen med mad og drikke

Du skal tage Carbidopa/Levodopa 2care4 med et glas vand.

Tal med lægen, hvis du er på en høj proteindiet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Carbidopa/Levodopa 2care4 efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Carbidopa/Levodopa 2care4 efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carbidopa/Levodopa 2care4 kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Carbidopa/Levodopa 2care4 kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Behandling med Carbidopa/Levodopa 2care4 kan gøre, at du pludselig falder i søvn, nogle gange uden varsel. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil, motorcykel eller cykel eller betjener maskiner, mens du tager Carbidopa/Levodopa 2care4.

Hvis du bliver søvngig eller pludselig falder i søvn uden varsel, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykel, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dit eget eller andres liv og helbred i fare. Tal med lægen.

3. Sådan skal du tage Carbidopa/Levodopa 2care4

Tag altid Carbidopa/Levodopa 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

Delekærven på tabletterne ikke beregnet til at dele tabletterne i mindre doser og må ikke bruges på den måde. Hvis det er nødvendigt at dele en tablet for bedre at kunne sluge den, skal du sikre dig, at du har alle tabletstykkerne (den fulde dosis). Hvis du ikke har alle stykkerne, skal du smide dem ud og tage en ny tablet fra blisterpakningen.

Hvis tabletten går i stykker, når du tager den ud af blisterpakningen, skal du sikre dig, at du har alle stykkerne fra tabletten (den fulde dosis). Hvis du ikke har alle stykkerne fra den knækkede tablet, skal du smide alle stykkerne ud og tage en ny tablet fra blisterpakningen.

Hvis du kun tager en del af en tablet (en delvis dosis), kan det medføre, at dine symptomer forværres.

Din læge fastlægger dosis. Dosis af Carbidopa/Levodopa 2care4 bliver tilpasset dig personligt, afhængigt af dine symptomer, og hvordan du reagerer på lægemidlet. Kontakt straks din læge, hvis din tilstand ændrer sig. Hvis du får kvalme og opkastning eller unormale bevægelser, kan det være nødvendigt at ændre dosis.

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Pludseligt stop af behandlingen kan give alvorlige bivirkninger, især hvis du samtidig tager lægemidler mod sindslidelser. Tal med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Du skal normalt starte med 1 tablet Carbidopa/Levodopa 2care4 25 mg/100 mg, 3 gange dagligt. Lægen kan øge din dosis med 1 tablet Carbidopa/Levodopa 2care4 25 mg/100 mg hver dag eller hver anden dag. Dosis kan stige til 8 tabletter Carbidopa/Levodopa 2care4 25 mg/100 mg dagligt. Følg lægens anvisning. Den maksimale dosis er 200 mg carbidopa og 2 g levodopa dagligt.

Brug til børn og unge

Du må ikke bruge Carbidopa/Levodopa 2care4 til børn og unge under 18 år, hvis det ikke er foreskrevet af lægen.

Hvis du har taget for mange Carbidopa/Levodopa 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Carbidopa/Levodopa 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, ufrivillige bevægelser, rastløshed og uro. Det kan også vise sig som hallucinationer, kramper, hurtig puls, for højt blodtryk, der kan være efterfulgt af for lavt blodtryk ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling, forstyrrelser i saltbalancen og nyrsvigt. Desuden muskelsygdom med svækket muskulatur, feber og rød urin.

Hvis du har glemt at tage Carbidopa/Levodopa 2care4

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Genoptag det sædvanlige skema så hurtigt som muligt.

Hvis du holder op med at tage Carbidopa/Levodopa 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Skal du have en mindre dosis, skal nedtrapning af dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludselig ophører, eller din dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række særdeles alvorlige symptomer som feber, udtalt muskelstivhed og ændret sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Depression, i alvorlige tilfælde med selvmordstanker. Kontakt læge.

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Generel sløghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer).
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens (malignt neuroleptisk syndrom). Ring 112 (livsfarligt).
- Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Mavesår med smerter i øverste del af maven. Kontakt læge.
- Hævelse af ansigt, læber og tunge. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
- Spontan opstået blødning i hud og/eller slimhinder, smerter og hævelse af led, ofte samtidig med akutte mavesmerter og -blødning (Schönlein-Henochs purpura). Kontakt straks læge eller skadestue.
- Psykotiske tilstande med vrangforestillinger og paranoide forestillinger. Kontakt læge.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Hudkræft. Kontakt omgående læge, hvis du får nye modernmærker eller modernmærker, som begynder at vokse eller forandre sig på anden måde.
- Kramper i øjenmusklerne med stirren opad. Kontakt læge.
- Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Urinvejsinfektioner.
- Ufrivillige og formålsløse bevægelser af kroppen, der kan vise sig som kastende, slyngende og rykkende bevægelser.

Almindelige til meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter)

- Hjertebanken.

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Unormal træthed og søvnighed. Meget sjældent kan der være udtalt træthed i dagtimerne og pludselig falden i søvn under daglige gøremål. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Åndenød. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Svimmelhed. Hvis du har for lavt blodtryk, kan du få svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling.
- Perioder med skift mellem overdrevne bevægelser og fuldstændig ubevægelighed.
- Stikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

- Opkastning, diarré, kvalme, manglende appetit.
- Brystsmerter.
- Unormale drømme.
- Forvirring.

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Muskeltrækninger. Kontakt lægen. Det kan være, at lægen skal ændre din dosis.
- Besvimelse.
- Nældefeber.
- Rastløshed og uro.

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Årebetændelse med smerter og hævelse langs blodåren. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært for højt blodtryk er alvorligt.
- Svigtende eller nedsat hukommelse.
- Mørkfarvet spyt, mørkfarvet urin.
- Kløe, hårtab, udslæt, mørkfarvet sved.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- Krammer i øjenlågene. Kontakt lægen. Det kan være, at lægen skal ændre din dosis.
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Væske i kroppen. Kontakt læge.
- Vægtøgning, vægttab.
- Bitter smag.
- Øget rysten på hænderne, usikre bevægelser, meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
- Hovedpine, uskarpt syn, nedsat sanseskarphed.
- Formindsket pupil, hængende øjenlåg og formindsket øjenspalte (Horners syndrom).
- Følelsesløshed.
- Stimuleringsfornemmelse.
- Dobbeltsyn, sløret syn, udvidede pupiller.
- Hæshed, unormal vejrtrækning, hikke.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.
- Spytlåd, synkebesvær.
- Mavesmerter og ubehag, forstoppelse, øget luftafgang fra tarmen, fordøjelsesbesvær, brændende fornemmelse på tungen.
- Ufrivillig vandladning.
- Øget svedtendens, rødmen.
- Muskelkrammer, krampe i tyggemusklene.
- Faldtendens.
- Hedeture, utilpashed.
- Kraftsløshed og svaghed, træthed.
- Unormal gang.
- Angst, desorientering, opstemthed.
- Søvnløshed.
- Skæren tænder.

Der kan opstå udvikling af lægemiddelmisbrug (som i nogle tilfælde kan medføre bivirkninger).

Du kan opleve følgende bivirkninger:

- Trang til større doser Carbidopa/Levodopa 2care4 ud over den dosis, der er nødvendig for kontrol af motoriske symptomer, kendt som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Nogle patienter oplever svære unormale og ufrivillige bevægelser (dyskinesi), humørsvingninger eller andre bivirkninger, efter de har taget større doser Carbidopa/Levodopa 2care4.
- Manglende evne til at modstå trangene til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:
 - Sygelig spilletrang (ludomani) på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser.
 - Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, fx øget sexlyst (libido).
 - Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge.
 - Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. Lægen vil diskutere måder at reducere og kontrollere disse symptomer.

Carbidopa/Levodopa 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx påvirkning af leveren, påvirkning af nyrerne, stigning i blodsukker.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carbidopa/Levodopa 2care4 indeholder:

- Aktive stoffer: 25 mg carbidopa og 100 mg levodopa.
- Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose, magnesiumstearat, majsstivelse, quinolingult (E104).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Carbidopa/Levodopa 2care4 25 mg/100 mg er gule, ovale tabletter med delekærv, glatte på den ene side og præget med "650" på den anden side.

Pakningsstørrelser

Carbidopa/Levodopa 2care4 fås i en pakningsstørrelse à 100 tabletter.

Indehaver af markeds- føringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2023.