



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Furosemid Hexal 40 mg tabletter

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Furosemid Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give Furosemid Hexal til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Furosemid Hexals virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Hexal
3. Sådan skal du tage Furosemid Hexal
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Furosemid Hexal
6. Yderligere oplysninger

1. FUROSEMID HEXALS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Furosemid Hexal er et vanddrivende lægemiddel, som tilhører gruppen af lægemidler kaldet loop-diuretika. Furosemid Hexal virker ved at øge udskillelsen af væske ved tilstande med øget væskeophobning i kroppen. Dette kan medvirke til at sænke blodtrykket, samt at lette væskeophobninger i kroppen.

Furosemid Hexal anvendes til forebyggelse og behandling af:

- Forhøjet blodtryk.
- Væskeansamlinger i kroppen i forbindelse med hjerte- eller leversygdomme.
- Væskeansamlinger i kroppen i forbindelse med nyresygdomme.
- Væskeansamlinger i lungerne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FUROSEMID HEXAL

Tag ikke Furosemid Hexal

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du har nyresvigt med manglende urinproduktion.
- Hvis du har meget lav koncentration af kalium eller natrium i blodet.
- Hvis du har alvorlig væskemangel.
- Hvis du ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Furosemid Hexal

- Hvis du har for lavt blodtryk.
- Hvis du har væskemangel.
- Hvis du har sukkersyge.
- Hvis du har gigt.



- Hvis du har vandladningsproblemer (f.eks. forstørret prostata, udvidelse af nyrebækkenet eller forsnævring i urinleder).
- Hvis du har for lavt indhold af protein i blodet (f.eks. ved sygdomstilstanden nefrotisk syndrom).
- Hvis du har leverproblemer, nedsat nyrefunktion eller får akutte nyreproblemer.
- Hvis du på grund af visse sygdomme, f.eks. hjerte-karsygdomme, kan risikere et kraftigt fald i blodtrykket.
- Hvis det er et for tidlig født barn, der behandles.
- Hvis du har saltmangel. Ved langtidsbehandling med Furosemid Hexal skal du spise kaliumrig kost (f.eks. kartofler, bananer, tomater, spinat og tørret frugt). I nogle tilfælde anbefales medicinsk kaliumerstatning.

Hvis ovenstående gælder for dig, skal du kontakte lægen, inden du påbegynder behandlingen med Furosemid Hexal.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Furosemid Hexal.

Hvis du er i behandling i længere tid, vil lægen muligvis tage en blodprøve under behandlingsforløbet.

Brug af anden medicin

Visse andre lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Furosemid Hexal. Dette gælder især:

- Aminoglykosider som f.eks. kanamycin, gentamicin, tobramycin (mod infektioner).
- Cisplatin (kræftmedicin).
- Lithium (ved manio-depressiv sygdom).
- Glukokortikosteroider (mod gigtsygdomme), carbenoxolon (mod mavesår), afføringsmidler eller lakrids kan medføre tab af kalium.
- Sucralfat (mod sure opstød og mavesår) bør tages mindst 2 timer før eller efter Furosemid Hexal.
- Hjertemedicin (hjerteglykosider samt klasse I og III antiarytmika).
- Terfenadin (mod allergi).
- Aminoglykosider, cefalosporiner og polymyxiner (mod infektion).
- Carbamazepin (mod epilepsi).
- Amphotericin (mod svamp).
- Reboxetin (mod depression).

Furosemid Hexal kan øge virkningen af:

- Andre lægemidler mod forhøjet blodtryk, f.eks. ACE-hæmmere.
- Theophyllin (mod astma) -eller curareliggende muskelafslappende midler.

Furosemid Hexal kan mindske virkningen af:

- Lægemidler mod sukkersyge.
- Adrenalin og noradrenalin (mod kredsløbssvigt).

Lægemidler der kan mindske virkningen af Furosemid Hexal:

- NSAID som f.eks. indomethacin og acetylsalicylsyre (mod smerter).
- Probenecid (mod urinsur gigt).
- Methotrexat (cytostatikum).
- Phenytoin (mod epilepsi).

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

**Brug af Furosemid Hexal sammen med mad og drikke**

Tabletterne skal tages på tom mave og sammen med et stort glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Furosemid Hexal efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Furosemid Hexal, da det bliver udskilt i modermælken. Hvis behandling er nødvendig skal amning ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Furosemid Hexal kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid Hexal

Furosemid Hexal indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FUROSEMID HEXAL

Tag altid Furosemid Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Tabletterne skal tages på tom mave og sammen med et stort glas vand.

Voksne

Væskeansamlinger i kroppen i forbindelse med hjerte- eller leversygdomme

Startdosis er sædvanligvis ½-1 tablet (20-40 mg). Ved behov kan dosis øges gradvist. Følg lægens anvisninger. Vedligeholdelsesdosis er normalt 1-2 tabletter (40-80 mg).

Væskeansamlinger i kroppen i forbindelse med nyresygdomme:

Startdosis er sædvanligvis 1 tablet (40 mg). Ved behov kan dosis øges gradvist. Følg lægens anvisninger. Vedligeholdelsesdosis er normalt 1-2 tabletter (40-80 mg).

Forhøjet blodtryk:

1 tablet én gang dagligt (40 mg). Ved alvorlige tilfælde kan dosis øges op til 60 mg dagligt. Følg lægens anvisninger.

Børn

2 mg furosemid pr. kg kropsvægt pr. døgn. Følg lægens anvisninger. Maksimaldosis er 40 mg pr. dag.

Ældre

Samme dosering som for voksne. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan her være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Mildt nedsat leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.



Moderat til svært nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Furosemid Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furosemid Hexal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være: Kraftigt blodtryksfald (hvilket viser sig ved træthed og svimmelhed og som kan udvikle sig til shock), akut nyresvigt, blodprop, vrangforestilling, lammelse, sløvhed og forvirring.

Hvis du har glemt at tage Furosemid Hexal

Glemmer du at tage Furosemid Hexal skal du blot fortsætte med din sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Furosemid Hexal kan, som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger

(mere end 1 ud af 1.000 og mindre end 1 ud af 100 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Nedsat antal blodplader.

Sjældne bivirkninger

(mere end 1 ud af 10.000 og mindre end 1 ud af 1.000 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Nyrebetændelse. En akut svær overfølsomhedsreaktion. Ændringer i blodbilledet og betændelse i blodkar.

Meget sjældne bivirkninger

(Mindre end 1 ud af 10.000 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Blodmangel pga. manglende udvikling af knoglemarven, mangel på en type af de hvide blodlegemer, akut betændelse i bugspytkirtlen.

Herudover kan følgende alvorlige bivirkning forekomme: Kredsløbskollaps.

Fremkommer ovennævnte bivirkninger, så kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger

(mere end 1 ud af 1.000 og mindre end 1 ud af 100 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Reaktioner i hud og slimhinder f.eks. kløe, blæreformede udslæt, nældefeber, små blødninger, diffust rødt udslæt især i ansigt, på arme og ben og i mundens slimhinde (erythema multiforme), afskalning af huden, lysfølsomhed.

Sjældne bivirkninger

(mere end 1 ud af 10.000 og mindre end 1 ud af 1.000 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Forvrænget lydopfattelse, tinnitus (øresusen), feber, mavetarm problemer (f.eks. kvalme, opkastning og diarre).

Meget sjældne bivirkninger

(Mindre end 1 ud af 10.000 behandlede risikerer at få bivirkninger)

Ophobning af galde i galdevejene. Stigning i leverværdier.

Herudover kan følgende ikke-alvorlige bivirkninger forekomme: Forstyrrelser i salt- og væskebalancen, øget indhold af urinstof, kolesterol, fedtstof eller sukker i blodet, kredsløbsproblemer (symptomer: hovedpine,



svimmelhed, stemme forvrængning, mundtørhed, tørst, lavt blodtryk dehydrering), opkoncentrering af blodlegemerne, vandladningsproblemer, blodpropper og nyresten.

Glukosetolerancen kan være nedsat under behandling med furosemid.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.
Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. SÅDAN OPBEVARER DU FUROSEMID HEXAL

Opbevar Furosemid Hexal utilgængeligt for børn.

Opbevar Furosemid Hexal i original emballage, da lægemidlet er lysfølsomt.

Brug ikke Furosemid Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Furosemid Hexal indeholder:

Aktivt stof: Furosemid 40 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; Majsstivelse og natriumstivelsesglycolat.

Furosemid Hexals udseende og pakningsstørrelse

Furosemid Hexal er en hvid, rund, let konveks tablet med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning: 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100 og 250 tabletter.

HDPE- plastbeholder: 100 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Revideret 17-07-2007