

1000144499-001-01

**Indlægsseddel: Information til brugeren**  
**Strepsils Honning og Citron, sugetabletter**  
2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/amylnmetakresol 0,6 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strepsils Honning og Citron.
3. Sådan skal du tage Strepsils Honning og Citron.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

## 1. Virkning og anvendelse

Strepsils Honning og Citron sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning. Strepsils Honning og Citron anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 6 år.

## 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strepsils Honning og Citron

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Tag ikke Strepsils Honning og Citron

- hvis du er allergisk over for 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylnmetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strepsils Honning og Citron (angivet i punkt 6).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

**Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strepsils Honning og Citron**

- hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel.
- hvis du har hvedeallergi.
- hvis du er diabetiker, da Strepsils Honning og Citron indeholder 1,0 g glucose og 1,5 g saccharose pr. sugetablet.

Strepsils Honning og Citron indeholder sulfitter, hvilket i sjældne tilfælde kan medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

#### Brug af anden medicin sammen med Strepsils Honning og Citron

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

#### Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### Graviditet:

- Du kan tage Strepsils Honning og Citron under graviditet.

#### Amning:

- Du kan tage Strepsils Honning og Citron, selvom du ammer.

#### Frugtbarhed:

- Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils Honning og Citron påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

#### Strepsils Honning og Citron indeholder glucose og saccharose

- Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

#### Strepsils Honning og Citron indeholder duftstof citral, geraniol, d-limonen og linalool.

- Dette lægemiddel indeholder duftstof med citral, geraniol, d-limonen og linalool. Citral, geraniol, d-limonen og linalool kan medføre allergiske reaktioner.

#### Strepsils Honning og Citron indeholder hvedestivelse.

- Dette lægemiddel indeholder kun spormængder af gluten (fra hvedestivelse). Det betragtes som 'glutenfrit' og anses derfor for

sikkert for patienter med coliaci.

- En sugetablet indeholder ikke mere end 22,04 mikrogram gluten.

## 3. Sådan skal du tage Strepsils Honning og Citron

Tag altid Strepsils Honning og Citron nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Honning og Citron skal opløses langsomt i munden.

#### Den anbefalede dosis er

##### Voksne:

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid.

##### Brug til børn:

###### Børn over 6 år:

Som ovenfor til voksne.

###### Børn på 6-11 år:

Lægemidlet bør administreres under en voksens opsyn.

###### Børn under 6 år:

Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning.

##### Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre.

#### Hvis du har taget for mange Strepsils Honning og Citron

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Strepsils Honning og Citron, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

#### Symptomer:

- Ondt i maven

#### Hvis du har glemt at tage Strepsils Honning og Citron

- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

#### Hvis du holder op med at tage Strepsils Honning og Citron

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock.) Kan være livsfarligt. Ring 112.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles ved længere tids brug. Der kan ligeledes være risiko for huller i tænderne ved længere tids brug

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhed / Øget følsomhed for (hypersensitivitet).
- Hævelse i hals (pharyngeal ødem).
- Hævelse i munden.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

- livsfarligt. Ring 112.
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
  - Smerter i tungen.
  - Ubehag/gener i munden.
  - Hals irritation.
  - Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden (oral paræstesi)
  - Udslæt.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Kvalme
- Sure opstød/halsbrand (dyspepsi).

**Hypigheden er ikke kendt:**

- Mavesmerter.

**Børn:**

Hypigheden, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 6 år som for voksne.

**Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

---

- Opbevar Strepsils Honning og Citron utilgængeligt for børn.
- Tag ikke Strepsils Honning og Citron efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Opbevar ikke Strepsils Honning og Citron ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevares i original emballage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

---

**Strepsils Honning og Citron indeholder:**

**Aktivt stof:**  
2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg og amylmetakresol 0,6 mg.

**Øvrige indholdsstoffer:**

Flydende saccharose, flydende glucose (indeholder sulfitter samt hvedestivelse indeholdende gluten), honning, vinsyre (E334), citronolie (terpenfri), pebermynteolie, og quinolin gult (E104).

**Udseende og pakningsstørrelser:**

Strepsils Honning og Citron er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten.

Strepsils Honning og Citron fås i:  
Strepsils Honning og Citron findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

**Indehaver af markedsføringstilladelsen**  
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  
Mail: [info@orifarm.com](mailto:info@orifarm.com)  
Tlf.: +45 6395 2700

**Fremstiller:**  
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2021.