

Indlægsseddel: Information til forbrugeren

Pamol® oral opløsning 24 mg/ml paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol
3. Sådan skal du tage Pamol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pamol oral opløsning er et smertestillende lægemiddel til lindring af svage til moderate smerter hos børn. Pamol virker febernedsættende.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Pamol for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol

Tag ikke Pamol

- hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pamol (angivet i afsnit 6).
- hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

**BØRN ELLER UNGE
I HJEMMET?**

Læs advarslen og vær omhyggelig med,
hvordan du opbevarer denne medicin.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Pamol.

Pamol bør anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har nedsat leverfunktion
- lider af kronisk alkoholisme
- har stærkt nedsat nyrefunktion

Hvis du får høj feber, tegn på infektion eller hvis dine symptomer varer i mere end 3 dage, skal du altid kontakte lægen.

Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pamol. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Vær opmærksom på at Pamol indeholder alkohol.

Brug af anden medicin sammen med Pamol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med lægen inden du tager Pamol, hvis du er i behandling med en eller flere af følgende slags medicin:

- medicin mod urinsur gigt (probenecid)
- smertestillende medicin (salicylamid, diflunisal)
- medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, domperidon)
- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
- blodfortyndende medicin (warfarin, andre coumariner)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin)

For at undgå overdosering skal du sikre dig, at medicin du bruger samtidigt med Pamol ikke også indeholder paracetamol.

Pamol oral opløsning indeholder alkohol. Du må ikke tage Pamol, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

Brug af Pamol sammen med mad, drikkevarer og alkohol

Du kan tage Pamol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Et samtidigt kronisk forbrug af alkohol kan øge risikoen for leverforgiftning.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Pamol. Dette produkt er beregnet til børn.

Graviditet

Pamol kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen eller jordemoderen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere.

Amning

Du kan tage Pamol, selvom du ammer.

Frugtbarhed

Paracetamol er vist ikke at have effekt på mandlig eller kvindelig fertilitet

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pamol oral opløsning indeholder ethanol

Dette lægemiddel indeholder 1,3 vol % alkohol, d.v.s. op til 210 mg alkohol pr. dosis, svarende til 5,2 ml øl eller 2,2 ml vin pr. dosis. Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun dette lægemiddel til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe såsom patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Pamol oral opløsning indeholder maltitol

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan have en mild afførende effekt.

Energi: 10 kJ (2,3 kcal) pr. g maltitol.

3. Sådan skal du tage Pamol

Brug altid Pamol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug vedlagte doseringssprøjte eller målebæger til at afmåle medicinen med.

Brug til børn

Den sædvanlige daglige dosis til børn er: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser, for eksempel:

10 kg: 5 ml højst 4 gange i døgnet.

20 kg: 10 ml højst 4 gange i døgnet.

30 kg: 15 ml højst 4 gange i døgnet eller 20 ml højst 3 gange i døgnet.

40 kg: 20 ml højst 4 gange i døgnet.

Det er vigtigt at overholde en dosering, der er tilpasset barnets vægt. Doseringen bør være jævnt fordelt over hele døgnet; herved undgås smerte- og feberudsving.

Du må kun bruge Pamol til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Pamol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pamol, end der står i denne indlægsseddel, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.

Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlernæring eller personer i behandling med lægemidler som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.

Tag aldrig mere Pamol end anbefalet. En højere dosis øger ikke den smertestillende virkning, men kan i stedet medføre alvorlig leverskade. Symptomerne på leverskade opstår først efter nogle dage. Det er derfor meget vigtigt, at du straks kontakter din læge, hvis du har taget mere Pamol end anbefalet i denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at tage Pamol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Nældefeber, udslæt, påvirkning af leveren (alvorlig), herunder leverforgiftning og leversvigt, allergisk reaktion.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Overfølsomhedsreaktioner f.eks. allergisk chok eller allergisk reaktion (alvorlig), almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (alvorlig), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (alvorlig) og påvirkning af luftvejene.

Ved langtidsbehandling er der risiko for nyreskader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pamol utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Brug ikke Pamol efter den udløbsdato, der står på flasken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pamol 24 mg/ml oral opløsning indeholder

- Aktivt stof: Paracetamol.
- Øvrige indholdsstoffer: Citronsyremonohydrat (E 330), ethanol (1,3 vol %), glycerol 85 % (E 422), macrogol (E 1521), natriumcitrat (E 331) og rensset vand.
Sødestoffer: 500 mg maltitol (E 965), 0,8 mg natriumcyclamat (E 952) og 80 mikrogram saccharinnatrium (E 954).
Smagsstoffer: Anisaroma og lakridsekstrakt.
Konserveringsmiddel: Kaliumsorbat (E 202).

Udseende og pakningsstørrelser

Pamol oral opløsning er en klar væske.

Pamol oral opløsning findes i flasker à 100 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S

info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księżstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021