

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**Itraconazol Sandoz 100 mg kapsler**
Itraconazol**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Itraconazol Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give Itraconazol Sandoz til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Itraconazol Sandozs virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Itraconazol Sandoz
3. Sådan skal du tage Itraconazol Sandoz
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Itraconazol Sandoz
6. Yderligere oplysninger

1. ITRACONAZOL SANDOZS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Itraconazol Sandoz er et lægemiddel, som anvendes til behandling af sygdomsfremkaldende svamp. Itraconazol Sandoz virker ved at forhindre svampen i at opbygge en ny cellevæg. Uden en velfungerende cellevæg dør svampen.

Itraconazol Sandoz anvendes til behandling af svampeinfektioner i skeden samt til behandling af svampeinfektioner i hud, negle og indre organer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ITRACONAZOL SANDOZ**Tag ikke Itraconazol Sandoz**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for itraconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du er i behandling med Itraconazol Sandoz og samtidig anvender lægemidler, som indeholder: terfinadin, astemizol og mizolastin (anvendes mod allergi), cisaprid (anvendes ved visse fordøjelsesforstyrrelser), dofetilid eller quinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser), pimozid (mod psykiske forstyrrelser), lovastatin og simvastatin (kolesterol-sænkende lægemiddel), triazolam og midazolam (sovemiddel), ergotamin og dihydroergotamin (migrænemiddel).
- hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. (læs afsnit 2 om "Graviditet og amning").

Vær ekstra forsigtig med at tage Itraconazol Sandoz:

- hvis du er overfølsom over for andre lægemidler mod svampeinfektioner. Informer din læge.
- hvis du har eller har haft hjertesvigt eller andre hjertesygdomme. Du skal straks kontakte din læge, hvis du får åndenød, pludselig vægtøgning, opsvulmet mave, hævede ben eller føler dig unormalt træt.
- hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion, da kan din læge evt. ændre på doseringen.

Itraconazol kan i meget sjældne tilfælde forårsage leversvigt og alvorlige leverforstyrrelser. Du skal straks afbryde behandlingen og kontakte din læge, hvis du mærker nogen af følgende symptomer: appetitløshed, opkastning, ualmindelig træthed, mavesmerter eller kraftig mørkfarvning af urinen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Hvis du tager Itraconazol Sandoz samtidig med visse andre lægemidler, kan behandlingen med disse lægemidler eller Itraconazol Sandoz påvirkes. Dette gælder især:

Hvis du har været i behandling med: rifampicin, rifabutin (anvendes mod tuberkulose), fenobarbital, fenytoin og carbamazepin, (anvendes mod epilepsi) eller naturlægemidlet perikon, må du først indtage Itraconazol Sandoz 2 uger efter, du er stoppet med behandlingen af et eller flere af ovenstående lægemidler.

Hvis du anvender syreneutraliserende lægemidler f.eks. aluminiumhydroxid, bør dette indtages mindst 2 timer efter indtagelsen af Itraconazol Sandoz for ikke at nedsætte virkningen af Itraconazol Sandoz.

Informér din læge inden behandlingen, hvis du tager nogen af følgende lægemiddelstoffer:

Isoniazid (anvendes mod tuberkulose), visse typer antibiotika (f.eks. clarithromycin og erythromycin), visse lægemiddelstoffer mod allergi (terfinadin, mizolastin, astemizol og ebastin), visse lægemiddelstoffer mod fordøjelsesproblemer (cisaprid), visse sovemidler (triazolam, midazolam), visse lægemiddelstoffer, som påvirker hjerte og blodtryk (f.eks. dofetilid, quinidin, dihydropyridiner, verapamil og digoxin), visse lægemiddelstoffer mod migræne (ergotamin og dihydroergotamin), visse lægemiddelstoffer mod psykiske forstyrrelser (pimozid), visse kolesterolsænkende lægemiddelstoffer (simvastatin og lovastatin), visse blodfortyndende lægemiddelstoffer (warfarin), lægemiddelstoffer mod HIV- infektion (ritonavir, indinavir og saquinavir), visse lægemiddelstoffer til behandling af cancer (f.eks. busulfan, docetaxel og trimetrexat), visse lægemiddelstoffer, som anvendes efter transplantation (ciclosporin, takrolimus og sirolimus), visse lægemiddelstoffer, som anvendes ved behandling af angst (buspiron, alprazolam og brotizolam), smertestillende lægemiddelstof, som anvendes i forbindelse med operationer (f.eks. alfetanyl), visse lægemiddelstoffer mod inflammationer (methylprednisolon), visse lægemiddelstoffer mod depression (reboxetin) og visse syreneutraliserende lægemidler (omeprazol).

Brug af Itraconazol Sandoz sammen med mad og drikke

Itraconazol Sandoz bør tages umiddelbart i forbindelse med et måltid, da optagelsen af lægemidlet herved øges.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du kontakte din læge, inden du tager lægemidlet, da itraconazol kan forårsage fosterskader. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, mens du bruger Itraconazol Sandoz, og anvende præventionsmidlet frem til den næste menstruationsperiode, da lægemiddelstoffet er 2-4 uger om at udskilles fra kroppen.

Amning:

Itraconazol Sandoz bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, så spørg din læge til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Itraconazol Sandoz påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om øvrige indholdsstoffer i Itraconazol Sandoz:

Itraconazol Sandoz indeholder sukker. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ITRACONAZOL SANDOZ

Tag altid Itraconazol Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Kapslen bør tages sammen med ½ glas vand i forbindelse med et måltid, da lægemiddelstoffet derved optages bedre. For visse patienter, som tager syresekretionshæmmere (f.eks. omeprazol), tilrådes det at indtage Itraconazol Sandoz sammen med cola, da lægemidlet hermed optages bedre. Spørg din læge eller apoteket til råds. Hvis du synes, at virkningen af Itraconazol Sandoz er for kraftig eller for svag, så kontakt din læge.

Dosering

Voksne:

Den normale dosering er 1-4 kapsler daglig. Behandlingstidens længde afhænger af, hvilken infektionstype du er i behandling for og kan variere fra 1 dag til 3 måneder. Følg lægens anvisning.

Børn: Itraconazol Sandoz må kun anvendes til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Ældre: Itraconazol Sandoz må kun anvendes til ældre efter lægens anvisning.

Nedsat nyre-leverfunktion: Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Itraconazol Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Itraconazol Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Ring eventuelt 112.

4. BIVIRKNINGER

Itraconazol Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De hyppigst forekommende er gener fra mave-tarmsystemet, leverpåvirkning eller hudlidelser.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

For lavt kaliumindhold i blodet, for højt fedtindhold i blodet. Neuropati, som er en betændelsestilstand i nervebanerne til arme og ben. Hjertesvigt. Vand i lungerne. Alvorligt leversvigt og leverpåvirkning. Allergiske hudreaktioner herunder Stevens-Johnson syndrom, som er en alvorlig hudreaktion med feber, blæreformede udslæt samt betændelsestilstande.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hovedpine og svimmelhed. Mavesmerter, opkastning, fordøjelsesforstyrrelser, kvalme, diarré og forstoppelse. Allergiske hudreaktioner som rødmen af huden, kløe, nældefeber og hårtab. Væske i kroppen og menstruationsforstyrrelser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. SÅDAN OPBEVARER DU ITRACONAZOL SANDOZ

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Itraconazol Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares under 25°C.

Opbevares i den originale pakning.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Itraconazol Sandoz 100 mg kapsler, indeholder

Aktivt stof: itraconazol 100 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler; poloxamer; hypromellose; gelatine og farvestofferne titandioxid (E171); indigocarmin (E132) og quinolingult (E104).

Itraconazol Sandoz udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Itraconazol Sandoz er grønne, uigennemsigtige kapsler, som indeholder små kugler.

Pakningsstørrelse

Blistre indeholdende: 4, 6, 14, 15, 18, 28, 60 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Sandoz A/S, C. F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ.

Fremstiller

Liconsa S. A., Avda. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 20. maj 2008