

Metformin 1A Farma 500 mg og 850 mg filmovertrukne tabletter

Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Metformin 1A Farma til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse

Metformin 1A Farma 500 mg og Metformin 1A Farma 850 mg er filmovertrukne tabletter.

Metformin 1A Farma nedsætter blodets indhold af glukose, ved at nedsætte glukoseoptagelsen fra tarmen og øge cellernes forbrug af glukose.

Du kan bruge Metformin 1A Farma til behandling af ikke insulinkrævende sukkersyge (type 2 diabetes). Du kan bruge Metformin 1A Farma, hvis kostomlægning, motion og vægttab ikke har tilstrækkelig virkning.

Metformin 1A Farma kan anvendes sammen med andre perorale antidiabetika eller insulin.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Metformin 1A Farma

Brug ikke Metformin 1A Farma hvis:

- Du er overfølsom over for metformin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metformin 1A Farma.
- Du har tendens til syreforgiftning.
- Du har nedsat funktion af nyrer eller lever.
- Du har en svær infektion.
- Du har væskemangel eller
- har fået svære kvæstelser.
- Du skal have eller lige har fået kontrastmidler sprøjtet ind i en åre ved en røntgenundersøgelse.
- Du har en alvorlig hjerte- eller lungesygdom.
- Du har et stort forbrug af alkohol eller er beruset.

Særlige forholdsregler

Tal med din læge hvis:

- Du har nedsat funktion af nyrer eller lever.

Metformin hydrochloride

Film-coated tablet 500 mg and 850 mg – Salutas

Package leaflet

Section 1.3.3

2007 05 21

Page 2 of 5

- Du skal til røntgenundersøgelse, hvor du skal have et kontrastmiddel sprøjtet ind i en blodåre. Du skal i samråd med lægen holde op med Metformin 1A Farma før undersøgelsen. Du må først begynde med den igen, når din nyrefunktion er blevet kontrolleret.
- Du skal bedøves.
- Du har dårligt reguleret diabetes.
- Du spiser meget uregelmæssigt og du springer måltider over eller hvis du lægger din kost om.
- Du er i behandling med andre typer tabletter mod diabetes (sulfonylurinstoffer) eller med insulin.
- Du er i behandling med smertestillende medicin (NSAID) eller vanddrivende medicin eller medicin mod for højt blodtryk.

Brug af Metformin 1A Farma sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Metformin 1A Farma sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metformin 1A Farma, filmovertrukne tabletter

Metformin 1A Farma indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må ikke bruge Metformin 1A Farma under graviditet.

Ved graviditet eller ønske herom, bør du have behandlingen ændret til insulinbehandling.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge Metformin 1A Farma, da Metformin 1A Farma bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metformin 1A Farma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Visse andre lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Metformin 1A Farma. Tal med din læge, hvis du bruger:

- Hjertemedicin (f.eks. betablokkere, ACE hæmmere og vanddrivende medicin).
- Astmamedikamenter (f.eks. prednison eller andre glukokortikoider og beta-2-agonister).
- Alkohol eller alkoholholdige midler.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, medicin som er købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Metformin 1A Farma

Voksne:

Sædvanlig startdosis er 1 tablet 2 eller 3 gange daglig.

Du kan sammen med din læge ændre dosis på grundlag af dine målinger af dit blodglukose.

En langsom øgning i dosis kan mindske eventuelle mavegener. Den højeste dosis er 3 g daglig.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn (og unge under 18 år):

Du må kun bruge Metformin 1A Farma til børn efter lægens anvisning.

Du skal sluge tabletterne hele sammen med et glas vand under eller efter et måltid.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Metformin 1A Farma?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metformin 1A Farma, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Metformin kan kun give for lavt blodglukose, hvis du tager det sammen med andre tabletter mod diabetes eller insulin. Symptomerne vil være rysten på hænderne, sved, sult, uklarhed, evt. kramper og bevidstløshed.

Har du glemt at tage Metformin 1A Farma?

Glemmer du at tage Metformin 1A Farma skal du blot fortsætte med din sædvanlige dosis - tag *ikke* dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Metformin 1A Farma kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Mælkesyreforgiftning (laktacidose) med åndenød, døsighed, lav kropstemperatur og evt. bevidsthedstab.

Fremkommer ovennævnte bivirkning, så kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

Metformin hydrochloride

Film-coated tablet 500 mg and 850 mg – Salutas

Package leaflet

Section 1.3.3

2007 05 21

Page 4 of 5

Appetitløshed, kvalme, opkastning, diaré og mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mere end 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 behandlede): Metalsmag. Hudrødme.

Der kan i meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Metformin 1A Farma utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metformin 1A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Metformin 1A Farma, filmovertrukne tabletter indeholder:

1 tablet indeholder:

Det virksomme indholdsstof:

De øvrige indholdsstoffer:

Metforminhydrochlorid 500 mg eller 850 mg.

Copovidon; natriumstivelsesglycolat; mikrokrySTALLinsk cellulose; silica, kolloid vandfri; magnesiumstearat; hypromellose; lactosemonohydrat; macrogol 4000, titandioxid (E 171).

Indehaver af markedsføringstilladelse:

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund, telefon 43 20 12 60.

e-mail: 1a.info@1apharma.com

Fremstiller:

Salutas GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, D-39179 Barleben

Metformin hydrochloride

Film-coated tablet 500 mg and 850 mg – Salutas

Package leaflet

Section 1.3.3

2007 05 21

Page 5 of 5

Revideret 05/2007