



INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter
Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter
Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter
Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottabletter
Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottabletter

metoprololsuccinat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Metoprololsuccinat Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat Hexal
3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat Hexal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Metoprololsuccinat, der er det aktive indholdsstof i Metoprololsuccinat Hexal, blokerer visse beta-receptorer i kroppen, særligt dem i hjertet (selektiv beta-receptorblokker).

Metoprololsuccinat Hexal anvendes ved:

- **Forhøjet blodtryk.**
- **Brystsmerter.**
- **Hjerterytmeforstyrrelser** med hurtig puls.
- behandling efter den akutte fase af et hjerteanfald.
- **Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag.**
- Forebyggelse af **migræne**.
- Behandling af en **svækket hjertemuskel**.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METOPROLOLSUCCINAT HEXAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Metoprololsuccinat Hexal

- Hvis du er **allergisk** (overfølsom) over for metoprololsuccinat, andre beta-receptorblokkere eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Hexal.
- Hvis du har **2. eller 3. grads hjertebløt**.



- Hvis du har **svag hjertemuskel**, der ikke er stabiliseret (dette vil sædvanligvis medføre åndenød og hævede ankler).
- Hvis du har en **meget lav puls** (under 50 slag i minuttet) eller **uregelmæssigt hjerteslag** (syg sinus-syndrom).
- Hvis du tidligere har haft et **hjertetilfælde med shock**.
- Hvis du har **meget dårligt blodomløb**, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.
- Hvis du har **meget lavt blodtryk**, hvilket kan medføre svimmelhed og besvimelse.
- Hvis lægen har fortalt dig, at du har **for meget syre i blodet** (metabolisk acidose).
- Hvis du har en alvorlig form for bronkial astma eller andre svære vejrtrækningsproblemer.
- Hvis du tager medicin kaldet **monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)**.

Vær ekstra forsigtig med at tage Metoprololsuccinat Hexal

- Hvis du lider af **astma eller pibende vejrtrækning**. Vær forsigtig med at bruge beta-receptorblokkere.
- Hvis du har **diabetes mellitus**. Behandling med Metoprololsuccinat Hexal kan nødvendiggøre justering af din diabetesbehandling og skjule symptomerne på lavt blodsukkerniveau.
- Hvis du har **1. grads hjerteblok**.
- Hvis du har **dårligt blodomløb**, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder..
- Hvis du har en **hormondannende svulst** i binyremarven (fæokromocytom). I dette tilfælde skal du inden og under behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal have behandling med en alfa-receptorblokker.
- Hvis din **skjoldbruskkirtel er overaktiv** (hyperthyreoidisme). Metoprololsuccinat Hexal kan skjule symptomerne på en overaktiv skjoldbruskkirtel.
- Hvis du skal **opereres**. Fortæl narkoselægen, at du tager Metoprololsuccinat Hexal, inden du bliver bedøvet..
- Hvis du har eller har haft **psoriasis**, da beta-receptorblokkere kan forværre eller forårsage psoriasis.
- Hvis du har **allergi**. Denne medicin kan forstærke din reaktion på pollen eller andre allergener.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Anden medicin kan påvirke virkningen af Metoprololsuccinat Hexal, og Metoprololsuccinat Hexal kan påvirke virkningen af anden medicin. Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager:

- **Clonidin** (mod forhøjet blodtryk): Hvis det bliver nødvendigt at afbryde samtidig behandling med clonidin, skal du stoppe med at tage beta-receptorblokkeren (f.eks. Metoprololsuccinat Hexal) adskillige dage forinden. Din læge vil give dig klare anvisninger for, hvordan du skal gøre.
- Såkaldte **monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere)**. Du må ikke tage Metoprololsuccinat Hexal sammen med disse.
- **Calciumantagonister** af verapamil- eller diltiazemtypen (mod forhøjet blodtryk, brystsmarter eller uregelmæssigt hjerteslag) eller **medicin mod hjerterytmeforstyrrelser** (antiarytmika).
- Bedøvelsesmidler, der skal inhaleres.
- Anden **blodtrykssænkende medicin**.
- Såkaldte **sympatomimetika**, der er medicin mod astma eller tilstoppet næse.
- **Reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, guanfacin, propafenon, amiodaron, quinidin og hjerteglykosider** (mod hjerteproblemer).
- **Andre betablokkere**, såsom øjendråber med timolol.
- **Insulin og diabetesmedicin, som indtages gennem munden**. Metoprololsuccinat Hexal kan undertrykke symptomerne på et lavt blodsukkerniveau. Du skal regelmæssigt have målt dit blodsukkerniveau og om nødvendigt have tilpasset din diabetesbehandling.



- **Medicin mod smerter, betændelse og arthritis** (såsom indometacin eller celecoxib).
- **Adrenalin**, også kaldet epinefrin. Metoprololsuccinat Hexal kan nedsætte adrenalins virkning på overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner).
- **Medicin mod bakterieinfektioner (rifampicin)**.
- **Medicin mod mavesår (cimetidin)**.
- **Hydralazin** (mod forhøjet blodtryk).
- **Medicin mod depression** (såsom paroxetin, fluoxetin og sertralin).
- **Medicin mod psykiske forstyrrelser** (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen).
- **Diphenhydramin** (medicin mod høfeber og allergi).
- **Terbinafin** (mod svamp).
- **Hydroxychloroquin** (mod malaria).
- **Lidocain** (til lokal bedøvelse).

Brug af Metoprololsuccinat Hexal sammen med mad og drikke

Samtidig brug af Metoprololsuccinat Hexal og **alkohol** kan **forstærke den sløvende effekt** af begge substanser.

Du skal **undgå alkohol**, mens du er i behandling med Metoprololsuccinat Hexal.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Metoprololsuccinat Hexal må kun anvendes under graviditet, hvis det er tvingende nødvendigt, og hvis lægen har vurderet, at fordelene ved behandlingen overstiger de mulige risici. Behandlingen med metoprolol skal afbrydes 48-72 timer før det forventede fødselstidspunkt. Hvis dette ikke er muligt, vil en læge holde dit nyfødte barn under nøje observation i de første 48-72 timer efter fødslen.

Amning

Metoprolol udskilles i modermælk.

Selvom brug af de anbefalede doser ikke forventes at medføre bivirkninger, skal ammede spædbørn dog nøje overvåges for tegn på effekter af lægemidlet (f.eks. lægeovervågning af hjertefunktionen).

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololsuccinat Hexal kan give bivirkninger som **svimmelhed** og **træthed**, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gør sig særligt gældende, hvis du samtidig drikker alkohol, og når du skifter fra anden medicin til Metoprololsuccinat Hexal.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat Hexal

Metoprololsuccinat Hexal indeholder glucose, lactose og saccharose (sukker). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE METOPROLOLSUCCINAT HEXAL

Tag altid Metoprololsuccinat Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Metoprololsuccinat Hexal 25 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

- Hvis du har **mildt til moderat forhøjet blodtryk**, skal tage 2 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter **én gang dagligt** (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).



- Om nødvendigt kan **dosis øges til 4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter** dagligt (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

- **4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190* mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjerterytmier)

- **4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 47,5-190* mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

- **8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190* mg metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjerteranken)

- **4 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95* mg metoprololsuccinat).
- **Om nødvendigt kan dosis øges til 8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190* mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

4-8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190* mg metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerteinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjerteinsufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal tilpasses din tilstand.

- Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **III-IV**, er den anbefalede startdosis i den **første uge ½ Metoprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 11,88 mg metoprololsuccinat).
I **anden uge** af behandlingen kan dosis øges til **1 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).
Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **II**, er den anbefalede startdosis i de **første to uger 1 Metoprololsuccinat Hexal 23,75 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).
- Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan **fordoble dosis med to ugers mellemrum op til 8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
- **Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 8 Metoprololsuccinat Hexal 25 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 50mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)



- Hvis du har **mildt til moderat forhøjet blodtryk**, skal du tage **1 Metoprololsuccinat Hexal 50mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan **dosis øges til 2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

- 2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 95-190* mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjerterytmier)

- **2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

- **4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjerteranken)

- **2 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan **dosis øges til 4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

- **2-4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg* metoprololsuccinat).

Svækket hjertemuskel (hjerterufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjerterufficiens, og dosis af metoprololsuccinat skal tilpasses din tilstand.

- Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **III-IV**, er den anbefalede startdosis i **den første uge 11,88 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**. I **anden uge** af behandlingen kan dosis øges til **½ Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat). Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **II**, er den anbefalede startdosis i **de første to uger ½ Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 23,75 mg metoprololsuccinat).
- Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan **fordoble dosis hver anden uge op til 4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
- **Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 4 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg* metoprololsuccinat) **eller den højest tålte dosis**. Det skal være en læge med erfaring i behandling af stabil symptomatisk hjertemuskelsvækkelse, der ordinerer behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal. Lægen vil nøje overvåge din tilstand efter hver dosisøgning. Hvis dit blodtryk falder, vil lægen eventuelt være nødt til at sænke dosis af den anden medicin, du får på samme tid. Hvis dit blodtryk falder, betyder det ikke nødvendigvis, at du ikke kan få langtidsbehandling med metoprolol, men lægen vil nedsætte dosis, indtil dit blodtryk er stabiliseret.



*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

- Hvis du har **mildt til moderat forhøjet blodtryk**, skal du tage **½ Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan lægen **øge dosis til 1-2 Metoprololsuccinat Hexal 50 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet blodtryksænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

- **1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjerterytmier)

- **1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

- **2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjerteranken)

- **1 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan dosis **øges til 2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

- **1-2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjertheinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjertheinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

- Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **III-IV**, er den anbefalede startdosis i den første uge **11,88 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**. I **anden uge** af behandlingen kan dosis øges til **23,75 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**. Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **II**, er den anbefalede startdosis i de **første to uger 23,75 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**.
- Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan **fordoble dosis hver anden uge op til 2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.

Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 2 Metoprololsuccinat Hexal 100 mg depottabletter én gang dagligt (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.



Metoprololsuccinat Hexal 150 mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

- Hvis du har **mildt til moderat forhøjet blodtryk**, skal du tage **$\frac{1}{3}$ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 47,5 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan lægen **øge dosis til $\frac{2}{3}$ -1½ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottabletter dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et andet blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

- **$\frac{2}{3}$ -1½ Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjerterytmier)

- **$\frac{2}{3}$ -1½ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

- **1½ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjerteranken)

- **$\frac{2}{3}$ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan lægen **øge dosis til 1½ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

- **$\frac{2}{3}$ -1½ Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjertheinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjertheinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

- Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **III-IV**, er den anbefalede startdosis i den **første uge 11,88 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt**. I **anden uge** af behandlingen kan lægen **øge dosis til 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt**. Hvis du **har svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **II**, er den anbefalede startdosis i de **første 2 uger 23,75 mg* metoprololsuccinat én gang dagligt**.
- Derefter bør dosis øges til det dobbelte. Lægen kan **fordoble dosis hver anden uge op til 1½ Metoprololsuccinat Hexal 150 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
- **Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er 1½ Metoprololsuccinat Hexal 150mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) **eller den højest tålte dosis**.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse doseringer.

Metoprololsuccinat Hexal 200mg:

Den normale dosis, medmindre din læge har ordineret andet, er:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal



- Hvis du har **mildt til moderat forhøjet blodtryk**, skal du have **47,5 mg*** metoprololsuccinat. Om nødvendigt kan lægen **øge dosis til ½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat), eller der kan føjes et yderligere blodtrykssænkende lægemiddel til behandlingen.

Brystsmerter (angina pectoris)

- **½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan der føjes et andet lægemiddel til behandlingen af koronarsklerosen.

Hjerterytmeforstyrrelser med hurtig puls (hjerterytmier)

- **½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling efter hjertetilfælde

- **1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Generende uregelmæssige og/eller kraftige hjerteslag (hjerteranken)

- **½ Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95 mg metoprololsuccinat).
- Om nødvendigt kan lægen **øge dosis til 1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat).

Forebyggelse af migræne

- **½-1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 95-190 mg metoprololsuccinat).

Behandling af svækket hjertemuskel (hjertheinsufficiens)

Inden behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal skal din svækkede hjertemuskel først være stabiliseret med den almindelige behandling til hjertheinsufficiens, og dosis skal tilpasses din tilstand.

- Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **III-IV**, er den anbefalede startdosis i den **første uge 11,88 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**. I **anden uge** af behandlingen kan lægen **øge dosis til 23,75 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**. Hvis du har **svækket hjertemuskel** i NYHA-klasse **II**, er den anbefalede startdosis i de **første 2 uger 23,75 mg*** metoprololsuccinat **én gang dagligt**.
- Derefter bør dosis øges til det dobbelte. **Lægen kan øge dosis hver anden uge op til 1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller til den højest tålte dosis.
- Den anbefalede dosis til længerevarende vedligeholdelsesbehandling er **1 Metoprololsuccinat Hexal 200 mg depottablet én gang dagligt** (svarende til 190 mg metoprololsuccinat) eller den højest tålte dosis.

*Metoprololsuccinat Hexal depottabletter fås i andre styrker, der er egnede til disse tilfælde.

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Metoprololsuccinat Hexal er for stærk eller svag.

Børn og unge



Der er begrænset erfaring med brug af Metoprololsuccinat Hexal til børn. Det frarådes at anvende Metoprololsuccinat Hexal til børn og unge.

Ældre

Der er ikke udført forsøg med patienter over 80 år. Lægen vil derfor være særlig forsigtig med at øge dosis, hvis du er **over 80 år**.

Sådan indtager du Metoprololsuccinat Hexal

Tabletterne skal tages gennem munden.

Tag depottabletterne én gang dagligt, helst i forbindelse med morgenmaden. Synk depottabletterne hele eller delte. Du må ikke tygge eller knuse tabletterne. Tag tabletterne med vand (mindst ½ glas).

Tag altid Metoprololsuccinat Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat Hexal-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metoprololsuccinat Hexal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Lægen vil på baggrund af dine symptomer vurdere, hvilke tiltag, der er nødvendige.

Gem pakningen, så lægen kan se hvilken medicin, du har taget, og starte en passende behandling.

Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat Hexal

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt med at tage lægemidlet som ordineret.

Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat Hexal

Du må kun holde pause med eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Behandlingen med Metoprololsuccinat Hexal **må ikke afbrydes brat** men skal nedtrappes gradvist. Hvis behandling med beta-receptorblokkere bliver afbrudt brat, kan det medføre forværring af hjertesvigt og øge risikoen for et hjertetilfælde og pludseligt hjertestop.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Metoprololsuccinat Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan opstå med følgende hyppigheder:

Meget almindelig	Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede
Almindelig:	Forekommer hos mellem 1 af 10 ud af 100 behandlede
Ikke almindelig:	Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede
Sjælden:	Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede
Meget sjælden:	Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede
Ikke kendt:	Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data.

Meget Almindelig;

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal



- Udtalt blodtryksfald, særligt når du rejser dig op, i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab
- Træthed

Almindelig:

- Svimmelhed
- Hovedpine
- Nedsat pulsslag (bradykardi)
- Balanceforstyrrelser (i meget sjældne tilfælde med bevidsthedstab)
- Hjertebanken
- Kolde hænder og fødder
- Åndedrætsbesvær ved fysisk anstrengelse
- Kvalme
- Mavesmerter
- Diarré
- Forstoppelse

Ikke almindelig:

- Vægtøgning
- Depression
- Nedsat koncentrationsevne
- Døsighed eller søvnforstyrrelser
- Mareridt
- Prikken, stikken og følelsesløshed i huden (paræstesi)
- Forbigående forværring af symptomer på svækket hjertemuskel
- 1. grads hjerteblok (AV-blok)
- Smerter i hjerteregionen
- Luftvejskramper (bronkospasmer)
- Opkastning
- Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner)
- Øget svedtendens
- Muskelkramper
- Væskeophobning i kroppens væv (ødem)

Sjælden:

- Forværring af latent diabetes mellitus (unormalt højt blodsukker efter indtagelse af almindelige mængder sukker, hvilket ikke var tilfældet før behandling med Metoprololsuccinat Hexal)
- Nervøsitet
- Anspændthed
- Synsforstyrrelser
- Tørre eller irriterede øjne
- Øjenbetændelse (konjunktivitis)
- Nedsat hjertefunktion
- Hjerterytmeforstyrrelser (arytmier)
- Nedsat stimulusledning
- Tilstoppet næse
- Impotens og andre seksuelle forstyrrelser
- Peyronies sygdom (fortykkelse af bindevævslaget omkring svulmelegemerne i penis)
- Mundtørhed
- Afvigende resultater ved leverfunktionsanalyser
- Hårtab

Meget sjælden:

- Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)



- Nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni)
- Glemsomhed eller hukommelsesforstyrrelser
- Forvirring
- Hallucinationer
- Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger)
- Ringen for ørerne (tinnitus)
- Nedsat hørelse
- Vævsdød (nekrose) hos personer med alvorlige kredsløbsforstyrrelser i hænder, arme eller ben forud for behandlingen.
- Symptomforværring hos personer med periodisk halten (claudication intermittens) eller karkramper i tæer og fingre (Raynauds syndrom)
- Nedsat smagssans
- Leverbetændelse
- Lysoverfølsomhed
- Forværring af psoriasis
- Udvikling af psoriasis
- Psoriasis-lignende symptomer
- Ledsmerter, muskelsvækkelse

Lindring af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, kan lægen anbefale passende foranstaltninger til at afhjælpe bivirkningerne eller afbryde behandlingen, hvis det er nødvendigt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metoprololsuccinat Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metoprololsuccinat Hexal indeholder:

- **Aktivt stof: metoprololsuccinat.**

DK, METOPROLOLSUCCINAT Hexal



- **Øvrige indholdsstoffer:** Mikrokrystallinsk cellulose (E 460), crospovidon, glucose, hypromellose, lactosemonohydrat, macrogol 4000, magnesiumstearat (Ph. Eur.), majsstivelse, polyacrylat, kolloidt siliciumdioxid, saccharose, talcum, farvestoffet titandioxid (E 171).

Metoprololsuccinat Hexal 100mg indeholder desuden:

Gult jernoxid/jernhydroxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Metoprololsuccinat Hexal 23,5 mg/47,5 mg/190 mg er hvide, aflange tabletter med delekærv på begge sider.

Metoprololsuccinat Hexal 100 mg er lysegule, aflange tabletter med delekærv på begge sider.

Metoprololsuccinat Hexal 150 mg er hvide, aflange tabletter med to delekærve på begge sider.

PP/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

PVC/Aclar/aluminiumblisterpakninger

Pakningsstørrelser: 10, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60 og 100 depottabletter.

HDPE-tabletbeholdere

Pakningsstørrelser: 30, 60, 100, 250 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser og pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hexal A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS' medlemslande under følgende navne:

DK	METOPROLOLSUCCINAT HEXAL
FI	METOHEXAL
HU	Metoprolol Z HEXAL 25/50/100/150/200 mg retard tablets Metoprolol HEXAL Z 23,75/47,5/95/142,5/190 mg pailginto
LT	atpalaidavimo tabletės Metoprolol Hexal Z 23, 75/95/142,5 mg ilgstošās darbības
LV	tablets
NO,	
SE	Metoprolol Sandoz
PL	MetoHEXAL 25/50/100/150/200 ZK

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. marts 2011