

**Indlægsseddel: Information til brugeren****Levenova 28 100 mikrogram/20 mikrogram filmovertrukne tabletter**

levonorgestrel/ethinylestradiol

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Levenova 28 til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlægsseddel.dk](http://www.indlægsseddel.dk).

**Vigtige ting, du skal vide om hormonelle præventionsmidler af kombinationstypen:**

- Det er en af de mest pålidelige ikke-permanente præventionsmetoder, hvis de anvendes korrekt.
- De medfører en let forøget risiko for at få en blodprop i vener og arterier, især i det første år eller efter en pause på 4 uger eller mere.
- Vær opmærksom, og kontakt lægen, hvis du tror, at du har symptomer på en blodprop (se punkt 2, "Blodpropper").

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Levenova 28
3. Sådan skal du tage Levenova 28
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

- Levenova 28 er en p-pille, som anvendes for at undgå graviditet.
- Hver lyserød tablet indeholder en lille mængde af to forskellige kvindelige kønshormoner; levonorgestrel og ethinylestradiol.
- De hvide tabletter er placebotabletter og indeholder ingen aktive stoffer.
- P-piller, som indeholder to hormoner, kaldes for 'p-piller af kombinationstypen'. Levenova 28 er en såkaldt lavdosis-p-pille, fordi den kun indeholder en lille mængde hormoner.

**2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LEVENOVA 28**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**Generelle bemærkninger**

Inden du begynder med at bruge Levenova 28, bør du læse oplysningerne om blodpropper i punkt 2. Det er især vigtigt, at du læser om symptomerne på en blodprop – se punkt 2, "Blodpropper".

Inden du begynder at tage Levenova 28, vil din læge stille dig nogle spørgsmål om din egen og din nærmeste families sygehistorie. Lægen vil også måle dit blodtryk, og afhængigt af din personlige situation kan lægen også foretage andre undersøgelser.

I denne indlægsseddel er der beskrevet flere situationer, hvor du bør stoppe med at bruge Levenova 28, eller hvor virkningen af Levenova 28 kan være nedsat. I sådanne situationer bør du enten undlade at have samleje eller anvende anden ikke-hormonel prævention, f.eks. bruge kondom eller en anden barrieremetode. Brug ikke rytme- eller temperaturmetoden. Disse metoder kan være usikre, fordi Levenova 28 ændrer de månedlige forandringer i kropstemperaturen og slimforandringerne i livmoderhalsen.

**Ligesom andre hormonelle præventionsmidler beskytter Levenova 28 ikke mod HIV-infektion (AIDS) og andre seksuelt overførte sygdomme.**

Når du tager dette lægemiddel, skal du gå til regelmæssig kontrol hos lægen mindst to gange om året.

Hvis du får usædvanlige symptomer, såsom uforklarlige smerter i brystet, maven eller benene, skal du straks kontakte lægen.

**Tag ikke Levenova 28:**

- hvis du er allergisk over for levonorgestrel/ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Levenova 28 (angivet i punkt 6).
- hvis du har (eller nogensinde har haft) en blodprop i et blodkar i benet (dyb venetrombose, DVT), i lungerne (lungeemboli, LE) eller i andre organer.
- hvis du har (eller nogensinde har haft) et hjertetilfælde eller slagtilfælde.
- hvis du ved, at du har en sygdom, der påvirker din blodstørkning – for eksempel protein C-mangel, protein S-mangel, antitrombin III-mangel, faktor V Leiden eller fosfolipid-antistoffer.
- hvis du skal opereres, eller hvis du er immobiliseret i længere tid (se punkt 2, "Blodpropper").
- hvis du har (eller nogensinde har haft) en sygdom, som kan være et advarselstegn om et hjertetilfælde i fremtiden (for eksempel angina pectoris, som forårsager kraftige smerter i brystet) eller et slagtilfælde (for eksempel et forbigående mildt slagtilfælde uden følgevirkninger).
- hvis du har en sygdom, som kan øge risikoen for en blodprop i arterierne. Det gælder følgende sygdomme:
  - sukkersyge med skader på blodkar.
  - meget højt blodtryk.
  - et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider).
  - en tilstand kaldet hyperhomocysteinæmi.
- hvis du har (eller nogensinde har haft) en bestemt form for migræne med såkaldte fokale neurologiske symptomer.
- brug ikke Levenova 28, hvis du har hepatitis C og tager lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (se også afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Levenova 28").
- hvis du har (eller nogensinde har haft) betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis).
- hvis du har (eller nogensinde har haft) en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal.
- hvis du har (eller nogensinde har haft) en tumor i leveren.
- hvis du har (eller nogensinde har haft) brystkræft eller kræft i kønsorganerne, eller hvis der er mistanke om, at du har det.
- hvis du har uforklarlig blødning fra skeden.

## Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levenova 28.

- hvis nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
- hvis du har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
- hvis du har sukkersyge.
- hvis du har depression.
- hvis du skal opereres eller er immobiliseret i længere tid (se "Blodpropper" i punkt 2).
- hvis du lige har født, har du en øget risiko for blodpropper. Spørg lægen, hvor hurtigt efter fødslen, du kan begynde at tage Levenova 28.
- hvis du har betændelse i venerne under huden (overfladisk tromboflebitis).
- hvis du har åreknuder.
- hvis du har Crohns sygdom eller blødende tyktarmsbetændelse (ulcerøs colitis).
- hvis du har en blodsygdom kaldet HUS (hæmolytisk uræmisk syndrom), der forårsager nyreskade.
- hvis du har en blodsygdom kaldet seglcelleanæmi.
- hvis du har epilepsi (se afsnittet "Brug af anden medicin sammen med Levenova 28").
- hvis du har en sygdom i immunsystemet kaldet SLE (systemisk lupus erythematosus).
- hvis du har en sygdom, som indtrådte første gang under en graviditet eller i forbindelse med tidligere brug af kønshormoner (f.eks. høretab, en blodsygdom kaldet porfyri, hududslæt med blisterdannelse under graviditeten (herpes gestationis), en nervesygdom, der forårsager pludselige kropsbevægelser (Sydenhams korea)).
- hvis du har eller har haft kloasma (misfarvning af huden, især i ansigtet og på halsen, også kaldet "graviditetspletter"). I så fald bør du undgå direkte sollys og ultraviolet lys.

Du skal kontakte din læge øjeblikkeligt, hvis du oplever symptomer på angioødem som f.eks. hævelser i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær eller nældefeber muligvis med vejrtrækningsbesvær. Produkter indeholdende østrogener kan fremkalde eller forværre symptomerne på arvelig og erhvervet angioødem.

Hvornår skal du kontakte lægen?

Søg straks lægehjælp hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop, som kan betyde, at du har en blodprop i benet (dvs. dyb venetrombose), en blodprop i lungen (dvs. lungeemboli), et hjertetilfælde eller et slagtilfælde (se afsnittet "Blodpropper" (trombose) nedenfor).

Du finder en beskrivelse af symptomerne på disse alvorlige bivirkninger i afsnittet "Sådan genkender du en blodprop".

## BLODPROPPER

Når du bruger et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen, såsom Levenova 28, stiger din risiko for at få en blodprop sammenlignet med din risiko, hvis du ikke brugte det. I sjældne tilfælde kan en blodprop blokere blodkar og forårsage alvorlige problemer.

Blodpropper kan opstå

- i vener (kaldet 'venetromboser', 'venøs tromboemboli' eller 'VTE').
- i arterier (kaldet 'arterietromboser', 'arteriel tromboemboli' eller 'ATE').

Man kommer sig ikke altid helt efter en blodprop. I sjældne tilfælde kan der være alvorlige, permanente følgevirkninger, og i meget sjældne tilfælde kan blodpropper være dødelige.

**Det er vigtigt at huske på, at den samlede risiko for at få en skadelig blodprop på grund af Levenova 28 er lille.**

## SÅDAN GENKENDER DU EN BLODPROP

Søg omgående lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af følgende tegn eller symptomer.

Oplever du et eller flere af disse tegn?	Hvad lider du muligvis af?
Hævelse af ét ben eller langs en vene i benet eller foden, især hvis dette er ledsaget af: <ul style="list-style-type: none"><li>• smerte eller ømhed i benet, som du eventuelt kun kan mærke, når du står eller går.</li><li>• varmeformelse i det berørte ben.</li><li>• ændring i hudfarven på benet, f.eks. blegthed, rødme eller blåfarvning.</li></ul>	Dyb venetrombose
<ul style="list-style-type: none"><li>• pludselig, uforklarlig stakåndethed eller hurtig vejrtrækning.</li><li>• pludselig hoste uden umiddelbar årsag, eventuelt med blodigt opspyt.</li><li>• skarpe brystmerter, som kan tiltage, når du trækker vejret dybt.</li><li>• kraftig omtumlethed eller svimmelhed.</li><li>• hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.</li><li>• kraftige mavesmerter.</li></ul> Kontakt lægen, hvis du er i tvivl, da visse af disse symptomer, såsom hoste eller stakåndethed, kan mistolkes som en mildere sygdom, såsom en luftvejsinfektion (f.eks. en almindelig forkølelse).	Lungeemboli
Symptomer, som oftest forekommer i ét øje: <ul style="list-style-type: none"><li>• øjeblikkeligt synstab.</li><li>• smertefri sløring af synet, som kan udvikle sig til synstab.</li></ul>	Retinal venetrombose (blodprop i øjet)
<ul style="list-style-type: none"><li>• smerter, ubehag, trykken eller tyngdefornemmelse i brystet.</li><li>• fornemmelse af klemmen eller fylde i brystet, armen eller under brystbenet.</li><li>• mæthedfornemmelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningfornemmelse.</li><li>• ubehag i overkroppen, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen og maven.</li><li>• øget svedtendens, kvalme, opkastning eller svimmelhed.</li><li>• ekstrem svaghed, angst eller stakåndethed.</li><li>• hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.</li></ul>	Hjertetilfælde

<ul style="list-style-type: none"> <li>• pludselig svaghed eller følelsesløshed i ansigt, arme eller ben, især i den ene side af kroppen.</li> <li>• pludselig indtræden af forvirring, tale- eller forståelsesproblemer.</li> <li>• pludselige problemer med at se på det ene eller begge øjne.</li> <li>• pludselige problemer med at gå, svimmelhed, manglende balance- eller koordinationssevne.</li> <li>• pludselig, kraftig eller langvarig hovedpine uden kendt årsag.</li> <li>• bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.</li> </ul> <p>Nogle gange kan symptomerne på slagtilfælde være kortvarige og forsvinde næsten med det samme og fuldstændigt, men du bør søge hurtigt lægehjælp, da du kan have risiko for at få et nyt slagtilfælde.</p>	Slagtilfælde
<ul style="list-style-type: none"> <li>• hævelse og let blåfarvning af en arm eller et ben.</li> <li>• kraftige mavesmerter (akut abdomen).</li> </ul>	Blodpropper, der blokerer andre blodkar

## BLODPROPPER I EN VENE

### Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en vene?

- Brugen af hormonelle præventionsmidler af kombinationstypen er blevet forbundet med en øget risiko for blodpropper i en vene (venetrombose). Disse bivirkninger er dog sjældne. De opstår oftest i det første år efter opstart af et præventionsmiddel af kombinationstypen.
- Hvis der dannes en blodprop i en vene i benet eller foden, kan det forårsage en dyb venetrombose (DVT).
- Hvis en blodprop løsriver sig fra benet og sætter sig fast i lungen, kan det forårsage lungeemboli.
- I meget sjældne tilfælde kan der dannes en blodprop i en vene i et andet organ, såsom øjet (retinal venetrombose).

### Hvornår er risikoen for at få en blodprop i en vene højest?

Risikoen for at få en blodprop i en vene er højest i det første år, hvor du tager et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen for første gang. Risikoen kan også være højere, hvis du genoptager brugen af et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen (samme præparat eller et andet præparat) efter en pause på 4 uger eller mere.

Efter det første år bliver risikoen mindre, men den er altid lidt højere, end hvis du ikke brugte et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen.

Når du stopper med at tage Levenova 28, vender din risiko for at få en blodprop tilbage til det normale niveau i løbet af nogle få uger.

### Hvilken risiko er der for at få en blodprop?

Risikoen afhænger af din naturlige risiko for VTE og af typen af det hormonelle præventionsmiddel af kombinationstypen, som du tager.

Den overordnede risiko for at få en blodprop i benet eller lungen (DVT eller LE) med Levenova 28 er lille.

- Ud af 10.000 kvinder, som ikke bruger et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen, og som ikke er gravide, vil cirka 2 kvinder få en blodprop om året.
- Ud af 10.000 kvinder, som bruger et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen, som indeholder levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat, vil cirka 5-7 kvinder få en blodprop om året.
- Risikoen for at få en blodprop varierer alt efter din personlige sygehistorie (se "Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop" nedenfor).

	Risiko for udvikling af blodprop på et år
Kvinder, som <b>ikke bruger</b> p-piller/p-plaster/p-ring af kombinationstypen, og som ikke er gravide.	Cirka 2 ud af 10.000 kvinder
Kvinder, som bruger p-piller af kombinationstypen, som indeholder <b>levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat</b> .	Cirka 5-7 ud af 10.000 kvinder
Kvinder, der bruger Levenova 28.	Cirka 5-7 ud af 10.000 kvinder

### Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en vene

Risikoen for at få en blodprop med Levenova 28 er lille, men visse forhold øger risikoen. Din risiko er højere:

- hvis du er meget overvægtig (kropsmasseindeks eller BMI over 30 kg/m<sup>2</sup>).
- hvis du eller nogen i din nærmeste familie har haft en blodprop i benet, lungen eller andre organer i en ung alder (f.eks. inden 50-årsalderen). I så tilfælde kan du have en arvelig blodstørkningsforstyrrelse.
- hvis du skal opereres, eller hvis du er sengeliggende i lang tid på grund af en skade eller sygdom, eller hvis du har benet i gips. Det kan være nødvendigt at stoppe brugen af Levenova 28 flere uger inden operationen, eller mens du er mindre mobil. Hvis du er nødt til at stoppe med at tage Levenova 28, skal du spørge lægen, hvornår du kan begynde at tage det igen.
- efterhånden som du bliver ældre (især efter 35-årsalderen).
- hvis du har født inden for de seneste uger.

Jo flere af disse forhold, der gør sig gældende for dig, jo højere er risikoen for at få en blodprop.

Flyrejser (der varer over 4 timer) kan midlertidigt øge din risiko for at få en blodprop, især hvis nogle af de andre nævnte faktorer gør sig gældende for dig.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis nogle af disse forhold gør sig gældende for dig, eller hvis du er i tvivl herom. Lægen kan beslutte, at du er nødt til at stoppe med at bruge Levenova 28.

Hvis et af ovennævnte forhold ændrer sig, mens du bruger Levenova 28, f.eks. hvis et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt, skal du fortælle det til lægen.

## BLODPROPPER I EN ARTERIE

### Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en arterie?

Ligesom en blodprop i en vene kan en blodprop i en arterie forårsage alvorlige problemer. Det kan for eksempel forårsage et hjertetilfælde eller et slagtilfælde.

### Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en arterie

Det er vigtigt at bemærke, at risikoen for at få et hjertetilfælde eller slagtilfælde med Levenova 28 er meget lille, men den kan stige:

- i takt med alderen (efter 35-årsalderen).
- **hvis du ryger.** Du rådes til at holde op med at ryge, når du bruger et hormonelt præventionsmiddel af kombinationstypen som Levenova 28. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, og du er over 35 år, vil lægen eventuelt råde dig til at bruge en anden type prævention.
- hvis du er overvægtig.
- hvis du har højt blodtryk.
- hvis nogen i din nærmeste familie har haft et hjertetilfælde eller et slagtilfælde i en ung alder (inden 50-årsalderen). I så tilfælde kan du også have en højere risiko for at få et hjertetilfælde eller et slagtilfælde.
- hvis du eller nogen i din nærmeste familie har et højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider).

- hvis du lider af migræne, især migræne med aura.
- hvis du har problemer med hjertet (hjerteklapsygdom eller hjerterytmeforstyrrelser kaldet atrieflimren).
- hvis du har sukkersyge.

Hvis mere end et af disse forhold gør sig gældende for dig, eller hvis en af tilstandene er særligt alvorlig, kan risikoen for at få en blodprop være endnu højere.

Hvis et af ovennævnte forhold ændrer sig, mens du bruger Levenova 28, f.eks. hvis du begynder at ryge, hvis et nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt, skal du fortælle det til lægen.

### Levenova 28 og kræft

Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, der bruger p-piller af kombinationstypen, men det er uvist, om det skyldes behandlingen. Det kan også være, at der bliver fundet flere tumorer hos kvinder, der bruger p-piller af kombinationstypen, fordi de oftere bliver undersøgt af lægen.

Forekomsten af tumorer i brystet falder gradvist efter ophør af det hormonelle præventionsmiddel af kombinationstypen. Det er vigtigt, at du undersøger dine bryster regelmæssigt, og at du kontakter lægen, hvis du mærker en knude.

I sjældne tilfælde er der set godartede levertumorer hos brugere af p-piller, og i endnu sjældnere tilfælde ondartede levertumorer. Kontakt lægen, hvis du får usædvanligt kraftige mavesmerter.

Der er rapporteret om kræft i livmoderhalsen ved langvarig brug, men det er uklart, om seksuel adfærd eller andre faktorer, såsom humant papillomavirus (HPV), er medvirkende til dette.

### Psykiske forstyrrelser

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Levenova 28, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan i nogle tilfælde føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt.

### Blødning mellem menstruationer

I de første par måneder, hvor du tager Levenova 28, kan du få uventet blødning (blødning uden for placebo-ugen). Hvis sådanne blødninger fortsætter efter de første par måneder, eller hvis du begynder at få dem efter nogle måneder, skal lægen finde ud af, hvad der er galt.

### Hvad du skal gøre, hvis du ikke får blødning i placebo-ugen

Hvis du har taget alle de lyserøde, aktive tabletter korrekt, og du ikke har haft opkastning eller kraftig diarre, og du ikke har taget anden medicin, er det højst usandsynligt, at du er gravid.

Hvis den forventede blødning udebliver to gange i træk, kan du være gravid. Kontakt straks lægen. Start ikke på næste blisterkort, før du er sikker på, at du ikke er gravid.

### Brug af anden medicin sammen med Levenova 28

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Visse lægemidler kan påvirke indholdet af Levenova 28 i blodet og nedsætte den svangerskabsforebyggende virkning eller forårsage uventet blødning. Disse lægemidler omfatter:

- medicin til behandling af:
  - epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin, topiramet eller felbamet).
  - tuberkulose (f.eks. rifampicin).
  - leddegigt, slidgigt (etoricoxib)
  - HIV-infektioner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, efavirenz).
  - svampeinfektioner (f.eks. griseofulvin).
  - højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan)
  - urtepræparatet prikbladet perikon.

Levenova 28 kan påvirke virkningen af andre lægemidler, f.eks.:

- lægemidler indeholdende ciclosporin.
- epilepsimidlet lamotrigin (dette kan føre til hyppigere krampeanfald).
- theophyllin (anvendes til behandling af vejrtrækningsproblemer).
- tizanidin (anvendes til behandling af muskelsmerter og/eller muskelkramper).

Brug ikke Levenova 28, hvis du har hepatitis C og tager lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir da disse lægemidler kan forårsage stigninger i blodprøver vedrørende leverfunktionen (stigning i leverenzymet ALAT).

Din læge vil ordinere en anden type prævention inden opstart af behandling med disse lægemidler.

Levenova 28 kan genoptages cirka 2 uger efter afslutning af denne behandling. Se afsnittet "Brug ikke Levenova 28".

*Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen lægemidler.*

### Laboratorietests

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager p-piller, da de kan påvirke resultaterne af visse prøver.

### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

### Graviditet

Du må ikke tage Levenova 28, hvis du er gravid. Hvis du bliver gravid, mens du tager Levenova 28, skal du straks stoppe med at tage det og kontakte lægen. Hvis du ønsker at blive gravid, kan du stoppe med at tage Levenova 28 når som helst (se også "Hvis du holder op med at tage Levenova 28").

### Amning

Kvinder, der ammer, frarådes generelt at bruge Levenova 28. Kontakt lægen, hvis du ønsker at tage p-piller, og du ammer.

## Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen oplysninger, der tyder på, at Levenova 28 påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

## Levenova 28 indeholder lactose, Allura Red AC og sojalecithin

Kontakt lægen, før du tager Levenova 28, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Filmovertrækket på Levenova 28 indeholder Allura Red AC og sojalecithin, som kan medføre allergiske reaktioner.

Du må ikke tage Levenova 28, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja.

## 3. SÅDAN SKAL DU TAGE LEVENOVA 28

Tag altid Levenova 28 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har taget andre p-piller, inden du begyndte på Levenova 28, ved du, at de fleste p-piller indeholder 21 tabletter. Når du bruger sådanne p-piller, skal du tage en tablet i 21 dage, hvorefter du ikke tager nogen tabletter i en uge (tabletpause).

Når du tager Levenova 28, skal du følge et andet system. Når du har taget de 21 lyserøde tabletter, skal du fortsætte med at tage de 7 hvide tabletter; der er altså ingen tabletpause, men en "placebo-uge" (den uge, hvor du tager placebotabletterne i række 4). Eftersom du skal tage en tablet hver dag, og der ikke er nogen tabletpause imellem to pakninger, bliver det en rutine at tage tabletterne, og der er derfor mindre risiko for, at du glemmer at tage en tablet.

Levenova 28-tabletterne med de to forskellige farver er placeret i rækkefølge. En pakning indeholder 28 tabletter.

Tag en Levenova 28-tablet hver dag. Levenova 28 kan tages sammen med eller uden mad, om nødvendigt med en smule vand. Du bør tage tabletter på cirka samme tidspunkt hver dag.

**Byt ikke om på tabletterne:** tag én **lyserød** tablet én gang dagligt i de første 21 dage og så én **hvid** tablet én gang dagligt i de sidste 7 dage. Du skal starte på et nyt blisterkort med det samme (**21 lyserøde** tabletter og så **7 hvide** tabletter). Der er altså **ingen tabletfri periode** (ingen pause) mellem to blisterkort.

Sammensætningen af tabletterne er forskellig. Derfor skal du starte med den første lyserøde tablet øverst til venstre og tage én tablet om dagen. For at hjælpe dig med at huske at tage tabletterne indeholder hver pakning med Levenova 28 et ark med 7 ugeklistermærker, som er påtrykt ugedagene. Vælg det ugeklistermærke, som starter med den dag, hvor du begynder at tage tabletterne. Hvis du eksempelvis starter på en onsdag, skal du vælge det ugeklistermærke, der begynder med "ONS". Anbring ugeklistermærket langs toppen af blisterkortets forside (over de lyserøde tabletter). Således er der angivet en ugedag for de første 7 tabletter, og du kan se, om du har taget en bestemt tablet. Pilene viser i hvilken rækkefølge, du skal tage tabletterne.

I løbet af de 7 dage, hvor du tager de **hvide** placebotabletter (placebo-dagene), bør din blødning begynde (såkaldt bortfaldsblødning). Den starter som regel 2 eller 3 dage, efter at du har taget den sidste **lyserøde**, aktive tablet. Når du har taget den sidste **hvide** tablet, skal du starte på næste blisterkort, uanset om din blødning er stoppet eller ej. Det betyder, at du skal starte alle blisterkort **på den samme ugedag**, og at du bør have bortfaldsblødning på de samme dage hver måned.

Hvis du bruger Levenova 28 på denne måde, er du også beskyttet mod graviditet i de 7 dage, hvor du tager en **hvid** placebotablet.

## Hvornår kan du starte på det første blisterkort

- *Hvis du ikke har brugt et hormonelt præventionsmiddel i den seneste måned*  
Start med at tage Levenova 28 på den første dag i din cyklus (dvs. den første menstruationsdag). Hvis du starter med at tage Levenova 28 på din første menstruationsdag, er du beskyttet mod graviditet med det samme. Du kan også begynde på dag 2-5 i din cyklus, men så skal du bruge ekstra prævention (f.eks. kondom) i de første 7 dage.
- *Hvis du skifter fra en anden p-pille af kombinationstypen, p-ring eller p-plaster af kombinationstypen*  
Du skal helst starte med at tage Levenova 28 dagen efter den sidste aktive tablet (den sidste tablet, der indeholder aktive stoffer) af dine tidligere p-piller og senest dagen efter de tabletfrie dage af dine tidligere p-piller (eller efter den sidste inaktive tablet af dine tidligere p-piller). Hvis du skifter fra p-ring eller p-plaster af kombinationstypen, skal du følge lægens anvisninger.
- *Skift fra en metode med progestogen alene (minipille, injektion, implantat eller spiral)*  
Du kan skifte fra minipillen på en hvilken som helst dag (fra et implantat eller en spiral på fjernelsesdagen, fra injektioner på dagen for næste planlagte injektion), men i alle tilfælde skal du bruge ekstra prævention (f.eks. kondom) i de første 7 dage med tabletdagtagelse.
- *Efter abort*  
Følg lægens anvisninger.
- *Efter fødsel*  
Du kan begynde på Levenova 28 mellem 21 og 28 dage efter fødslen. Hvis du starter mere end 28 dage efter fødslen, skal du bruge en såkaldt barrieremetode (for eksempel kondom) i de første syv dage, hvor du bruger Levenova 28.  
Hvis du har haft samleje efter fødslen, inden du begynder på Levenova 28 (igen), skal du sikre dig, at du ikke er gravid, eller vente til din næste menstruation.
- *Hvis du ammer eller ønsker at begynde på Levenova 28 (igen) efter en fødsel*  
Læs afsnittet "Amning".

Spørg lægen til råds, hvis du er i tvivl om, hvornår du skal starte.

## Hvis du har taget for mange Levenova 28

Der er ikke rapporteret om alvorlige skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Levenova 28-tabletter. Hvis du tager flere tabletter på én gang, kan du få symptomer såsom kvalme eller opkastning. Unge piger kan få blødning fra skeden.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Levenova 28, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis du opdager, at et barn har taget nogle af tabletterne.

## Hvis du har glemt at tage Levenova 28

Tabletterne i **fjerde** række i pakken er placebotabletter. Det har ikke nogen indvirkning på pålideligheden af Levenova 28, hvis du glemmer at tage en af disse tabletter. Bortskaf den glemte placebotablet.

Hvis du glemmer en lyserød, aktiv tablet (tabletterne i **første, anden eller tredje** række), skal du gøre følgende:

- Hvis det er **mindre end 12 timer siden**, at du skulle have taget tabletten, er den svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Tag tabletten, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt så med at tage de efterfølgende tabletter på det sædvanlige tidspunkt.

- Hvis det er **mere end 12 timer siden**, at du skulle have taget tabletten, kan den svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Jo flere tabletter du har glemt, jo større er risikoen for, at den svangerskabsforebyggende virkning er nedsat. Risikoen for, at du ikke er helt beskyttet mod graviditet, er størst, hvis du glemmer en lyserød tablet i begyndelsen (første række) eller slutningen af blisterkortet (tredje række). Derfor skal du overholde følgende regler (se også skemaet nedenfor):

- **Mere end 1 tablet glemt i dette blisterkort**

Kontakt lægen

- **Én tablet glemt mellem dag 1 og 7 (første række)**

Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanke om det, også selvom det betyder, at du skal tage to tabletter på samme tid. Fortsæt med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt, og brug **ekstra beskyttelse** i de næste 7 dage, for eksempel kondom. Hvis du havde samleje i ugen, inden du glemte tabletten, skal du være klar over, at der er en risiko for, at du er blevet gravid. I så fald skal du kontakte lægen.

- **Én tablet glemt mellem dag 8 og 14 (anden række)**

Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanke om det, også selvom det betyder, at du skal tage to tabletter på samme tid. Fortsæt med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Beskyttelsen mod graviditet er ikke nedsat, og du behøver ikke at tage ekstra forholdsregler.

- **Én tablet glemt mellem dag 15 og 21 (tredje række)**

Du kan vælge mellem følgende to muligheder:


1. Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanker om det, også selvom det betyder, at du skal tage to tabletter på samme tid. Fortsæt med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. I stedet for at tage de hvide placebotabletter i dette blisterkort, skal du kassere dem og starte på næste blisterkort (startdagen vil være anderledes). Du vil højst sandsynligt få menstruation ved slutningen af det andet blisterkort – mens du tager de hvide placebotabletter – men du kan få let eller menstruationslignende blødning i løbet af det andet blisterkort.
2. Du kan også stoppe med at tage de aktive lyserøde tabletter og gå direkte til de 7 hvide placebotabletter (**notér den dag, hvor du glemte din tablet, inden du tager placebotabletterne**). Fortsæt så med næste blisterkort. Hvis du ønsker at starte på et nyt blisterkort på samme ugedag, som du plejer, skal du tage placebotabletterne i mindre end 7 dage.

Hvis du følger en af disse anbefalinger, vil du fortsat være beskyttet mod graviditet.

- Hvis du har glemt en hvilken som helst tablet i et blisterkort, og du ikke får blødning i placebo-ugen, kan du være gravid. Du skal kontakte lægen, inden du begynder på det næste blisterkort.

### Hvad du skal gøre i tilfælde af opkastning eller kraftig diarré

Hvis du kaster op inden for 3-4 timer, efter at du har taget en aktiv lyserød tablet, eller du får kraftig diarré, er der en risiko for, at de aktive stoffer i p-pillen ikke er blevet fuldstændigt optaget i kroppen. Denne situation svarer næsten til, at du har glemt en tablet. Efter opkastning eller diarré skal du tage en ekstra lyserød tablet fra et reserveblisterkort så hurtigt som muligt. Hvis det er muligt, skal du tage tabletten senest 12 timer efter det tidspunkt, hvor du normalt tager din p-pille. Hvis det ikke er muligt, og der er gået mere end 12 timer, skal du følge rådene i afsnittet "Hvis du har glemt at tage Levenova 28".



### Udskydelse af din menstruation: Det skal du vide

Selvom det er frarådet, kan du forsinke din menstruation ved at lade være med at tage de hvide placebotabletter og i stedet gå direkte til et nyt blisterkort med Levenova 28. Du kan få let eller menstruationslignende blødning, mens du bruger det andet blisterkort. Færdiggør dette andet blisterkort ved at tage de 7 hvide tabletter i fjerde række. Start så på næste blisterkort

Du kan eventuelt spørge lægen til råds, før du beslutter at udskyde din menstruation.

### Ændring af første menstruationsdag: Det skal du vide

Hvis du tager tabletterne som anvist, vil din menstruation begynde i løbet af placebo-dagene. Hvis du vil ændre denne dag, skal du afkorte antallet af placebo-dage – hvor du tager de hvide placebotabletter (men aldrig øge antallet – 7 er det højeste!). Eksempel: Hvis du starter med at tage placebotabletterne om fredagen, og du ønsker at ændre dette til en tirsdag (3 dage tidligere), skal du starte på et nyt blisterkort 3 dage tidligere end sædvanligt. Det er ikke sikkert, at du får nogen blødning i denne periode.

Spørg lægen til råds, hvis du er usikker på, hvordan du skal gøre.

### Hvis du holder op med at tage Levenova 28

Du kan stoppe med at tage Levenova 28, når som helst du ønsker det. Spørg lægen til råds om andre pålidelige præventionsmetoder, hvis du ikke ønsker at blive gravid. Hvis du ønsker at blive gravid, skal du stoppe med at tage Levenova 28 og vente nogen tid, før du forsøger at blive gravid. Det gør det nemmere at regne den forventede fødselsdato ud.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

#### 4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

##### Alvorlige bivirkninger

Kontakt en læge øjeblikkeligt, hvis du oplever nogen af følgende symptomer på angioødem: hævelse i ansigt, tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær eller nældefeber muligvis med vejrtrækningsbesvær (se også punkt 2, "Advarsler og forsigtighedsregler").

Alle kvinder, der tager hormonelle præventionsmidler af kombinationstypen, har en øget risiko for blodpropper i venerne (venøs tromboemboli (VTE)) eller blodpropper i arterierne (arteriel tromboemboli (ATE)). Du finder yderligere oplysninger om de forskellige risici ved at tage hormonelle præventionsmidler af kombinationstypen i punkt 2, "Det skal du vide, før du begynder at tage Levenova 28".

Nedenstående liste indeholder de bivirkninger, der er blevet forbundet med brugen af Levenova 28.

**Almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

- Humørsvingninger, depression.
- Hovedpine.
- Kvalme, mavesmerter (mavepine).
- Smerter eller ømhed i brystet.
- Vægtøgning.
- Hududslæt.

**Ikke almindelige bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

- Nedsat seksuallyst.
- Migræne.
- Opkastning, diarré.
- Kløe eller knopper på huden.
- Hævede bryster.
- Væskeophobning.

**Sjældne bivirkninger** (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

- Intolerans over for kontaktlinser.
- Allergiske reaktioner.
- Øget seksuallyst.
- Udflåd fra brystet eller skeden.
- Ømme rødlige knuder i huden (erythema nodosum).
- Udslæt med skydeskiveformet rødme eller sår (erythema multiforme).
- Vægttab.

Følgende alvorlige bivirkninger er blevet indberettet en anelse hyppigere hos kvinder, der bruger p-piller (se punkt 2, "Det skal du vide, før du begynder at tage Levenova 28"):

- Blodpropper i vener eller arterier.
- Forhøjet blodtryk.
- Levertumorer eller brystkræft.
- Leverfunktionsforstyrrelser.
- Skadelige blodpropper i en vene eller arterie for eksempel:
  - i et ben eller en fod (DVT).
  - i en lunge (LE).
  - hjertetilfælde.
  - slagtilfælde.
  - mini-slagtilfælde eller forbigående slagtilfældelignende symptomer, også kaldet et transitorisk iskæmisk attack (TIA), eller blodpropper i leveren, maven/tarmen, nyrerne eller øjnene.

Risikoen for at få en blodprop kan være højere, hvis du har andre tilstande, der øger denne risiko (se yderligere oplysninger om forhold, der øger risikoen for blodpropper, og om symptomerne på en blodprop i punkt 2).

Følgende tilstande kan indtræde eller blive værre ved brug af p-piller af kombinationstypen: Crohns sygdom, ulcerøs colitis, epilepsi, migræne, endometriose, porfyri (stofskiftesygdom, der forårsager mavesmerter og mentale forstyrrelser), systemisk lupus erythematosus (hvor kroppen angriber og skader egne organer og væv), herpes i den sidste del af graviditeten, Sydenhams korea (hurtige ufrivillige spjæt eller vridende bevægelser), hæmolytisk uræmisk syndrom (en tilstand, der indtræder efter diarré forårsaget af E. coli), leverproblemer, der viser sig ved gulsot, galdeblæreforstyrrelser eller dannelse af galdesten.

##### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

#### 5. OPBEVARING

- Opbevar Levenova 28 utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Levenova 28 efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Levonorgestrel/ethinylestradiol udgør en risiko for vandmiljøet. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## **6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Levenova 28 indeholder:**

- Aktive stoffer: Levonorgestrel 100 mikrogram og ethinylestradiol 20 mikrogram.
- Øvrige indholdsstoffer:  
Levenova 28 tabletter findes i 2 farver:
  - Hver lyserød tablet (indeholder aktive stoffer):  
Vandfri lactose, povidon K-30 (E1201) og magnesiumstearat (E470b).  
Lyserødt overtræk: Delvist hydrolyseret polyvinylalkohol (E1203), talcum (E553b), titandioxid (E171), macrogol 3350, Allura Red AC (E129), sojalecithin (E322), rød jernoxid (E172) og indigocarmin (E132).
  - Hver hvid tablet (placebo, indeholder ikke aktive stoffer):  
Vandfri lactose, povidon K-30 (E1201) og magnesiumstearat (E470b).  
Hvidt overtræk: Delvist hydrolyseret polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), macrogol 3350 og talcum (E553b).

### **Udseende og pakningsstørrelser:**

De aktive tabletter er lyserøde, runde tabletter med en diameter på cirka 5,7 mm.

Placebotabletterne er hvide, runde tabletter med en diameter på cirka 5,7 mm.

Hvert blisterkort indeholder 21 lyserøde, aktive, filmovertrukne tabletter i første, anden og tredje række og 7 hvide, filmovertrukne placebotabletter i fjerde række.

Levenova 28 fås i pakninger med 3 blisterkort med 28 tabletter.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen:**

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

### **Frigivet af:**

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2. tv

DK-2730 Herlev

**Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2021**