

Indlægsseddel: Information til brugeren

Capiven® 500 mg filmoverttrukne tabletter Oprensat og mikroniseret fraktion flavonoider

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Capiven til Dem personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Capiven
3. Sådan skal De tage Capiven
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Capiven får udspilede blodårer til at trække sig sammen.

De kan bruge Capiven mod:

- tunge eller hævede ben, smerter, natlige kramper og uro i benene.
- hæmorroider.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Capiven

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Capiven

Hvis De er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Capiven (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De får et akut anfald af hæmorroider, bør De kun tage Capiven i kort tid. Hvis symptomerne bliver ved, skal De tale med lægen.

Børn og unge

Capiven er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Capiven

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

De kan tage Capiven samtidig med andre lægemidler.

Brug af Capiven sammen med mad og drikke

De skal tage Capiven i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

For en sikkerheds skyld bør Capiven undgås under graviditeten.

Amning

På grund af manglende sikkerhedsdata under amning, bør De undgå at tage Capiven under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Capiven påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller føre motorkøretøj.

Capiven indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal De tage Capiven

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Dosering

Den sædvanlige dosis for voksne er: 1 tablet morgen og aften i forbindelse med måltidet.

Hvis De har taget for meget Capiven

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har taget mere af Capiven, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

Der er begrænset erfaring med overdosering med Capiven, men indberettede symptomer omfatter diarré, kvalme, mavesmerter, kløe og udslæt.

Hvis De har glemt at tage Capiven

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men De skal fortsætte med deres sædvanlige dosering.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger, angivet med faldende hyppighed, kan forekomme:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Kvalme, opkastning, diaré, ubehag fra øvre del af mave-tarm-kanalen (dyspepsi).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Tyktarmsbetændelse (colitis).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Hovedpine, utilpashed, svimmelhed, udslæt, kløe, nældefeber.

Ikke kendt (kan ikke bestemmes ud fra foreliggende data): Mavesmerter, hævelser isoleret til ansigt, læber og øjenlåg. Undtagelsesvis Quincke's ødem (hastig svulmen af væv som ansigt, læber, mund, tunge eller hals, der kan føre til åndedrætsbesvær).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevar Capiven utilgængeligt for børn.

Tag ikke Capiven efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capiven 500 mg fillovertrukne tabletter indeholder:

- Aktivt stof: 500 mg flavonoider svarende til:
 - Diosmin 90 % 450 mg
 - Flavonoider som hesperidin 10 % 50 mg
- Øvrige indholdsstoffer: Glycerol; natriumlaurylsulfat; magnesiumstearat; macrogol 6000; mikrokrySTALLinsk cellulose; rød jernoxid (E 172) titandioxid (E 171); gul jernoxid (E 172); gelatine; hypromellose; natriumstivelsesglycolat; talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Capiven er ovale, laksefarvede, fillovertrukne tabletter.

Tabletterne fås i blisterpakninger á 30, 60 og 120 fillovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex

Frankrig

Fremstiller

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran – 45520 Gidy

Frankrig

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow – Co. Wicklow – Irland

Repræsentant

Servier Danmark A/S
Pederstrupvej 93
2750 Ballerup
Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2022