185 | 183

Vnr 09 95 79

Altresyn®
4 mg/ml

Oral opløsning til svin
Oral lösning för svin
Oraaliliuos sialle
Mikstur, oppløsning til gris

1080 ml

ceva

OBS! Læs indlægssedlen omhyggeligt før brug. (DK)
Efter anbrud, anvend inden 2 måneder; senest ___/___/___.
Tilbageholdelsestid: Slagtning: 9 dage.
Opbevares utilgængeligt for børn. Til dyr.

OBS! Läs bipacksedeln noga innan användning. (SE)
Öppnad förpackning ska användas inom 2 månader, senast ___/___/___.
Karenstid: Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. För djur.

Huom! Lue pakkausseloste ennen käyttöä. (FI)
Käytä avattu pakkaus 2 kuukauden kuluessa, __/__/__ mennessä.
Varoaika: Teurastus: 9 vrk.
Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Eläimille.

Advarsel! Les pakningsvedlegget nøye før bruk. (NO)
Etter åpning, brukes innen 2 måneder, senest ___/___/___.
Tilbakeholdelsestid: Slakt: 9 døgn.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Til dyr.

MTnr. 49832 (DK), 57802 (SE), 36020 (FI), 18-12237 (NO).

3 411112 991525

A2129.03

9

12

368

183 | 183

vertikalt opp ned. Doseringsenheten bør bli sittende på flasken under hele behandlingsperioden. Ved lagring mellom hver behandlingsdag bør låsesystemet være på.
Dyrene skal medisineres enkeltvis. Tilsett preparatet direkte på fôret umiddelbart før fôring og kontroller inntak av dosen. Alternativt kan preparatet gis direkte i dyrets munn ved å trykke på doseringsenheten med flasken opp ned.
Preparatet skal administreres til samme tid hver dag.

Oppbevaringsbetingelser
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette preparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Avfallshåndtering
Du må ikke kvitte deg med preparatet via avløpsvann eller husholdningsavfall.
Vann og vassdrag skal ikke kontamineres med virkestoff, da preparatet kan være farlig for fisk og andre vannlevende organismer.
Bruk returordninger for avhending av ubrukt preparat eller avfall fra bruken av slike preparater, i samsvar med lokale krav og egnede nasjonale innsamlingssystemer. Disse tiltakene skal bidra til å beskytte miljøet.
Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med preparater som ikke lenger er nødvendig.

Receptstatus
Preparat underlagt reseptplikt.
Detaljert informasjon om dette preparatet er tilgjengelig i Unionens preparatdatabase (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).
Pakningsstørrelser:
Eske av pappkartong med 1 beholder à 360 ml
Eske av pappkartong med 3 beholdere à 360 ml
Beholder med 540 ml
Beholder med 1080 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført

Dato for siste oppdatering av pakningsvedlegget:
06.01.2025

Kontaktinformasjon
Innehaver av markedsføringstillatelse og kontaktinformasjon for å rapportere mistenkte bivirkninger:
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière,
33500 Libourne, Frankrike
Tlf: +800 35 22 11 51
e-mail: pharmacovigilance@ceva.com
Tilsvarer ansvarlig for batchfrigivelse:
Ceva Santé Animale,
Z.I. Très le Bois,
22600 Loudéac, Frankrike
Bruk ikke dette preparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Exp. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

1

5 5

Se den nyeste indlægssedlen på www.indlaegsseddel.dk (DK)

Sammensætning
1 ml indeholder 4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroxyanisol (E320) og 0,07 mg butylhydroxytoluën (E321).
Klar, svagt gul, lugtfri opløsning.

Dyrearter
Til svin (kønsmodne polte og førstelægssøer).

Indikationer
Til synkronisering af brunst.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes til svin med betændelse i livmoderen.
Må ikke anvendes til orne.
Se afsnittet "Anvendelse under dræctighed og diegivning".

Særlige advarsler:
Særlige advarsler: Ingen.
Særlige forholdsregler vedrørende sikker brug hos de dyrearter, som veterinærlægemidlet er beregnet til:
Alt uspist medicineret foder kasseres.
Må kun bruges til kønsmodne polte, der allerede har vist brunst og til førstelægssøer efter fravænningstidspunktet.
Uspist foder skal destrueres på en sikker måde, og ikke videregives til andre dyr.
Særlige forholdsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet til dyr: Direkte kontakt med huden bør undgås.
Personligt beskyttelsesudstyr i form af handsker og overtræksdragt/kedeldragt bør anvendes ved håndtering af veterinærlægemidlet.
Porøse handsker kan lade dette veterinærlægemiddel passere igennem til huden. Hvis veterinærlægemidlet kommer i kontakt med huden under handsken, kan materialer, såsom latex eller gummi i handsker forøge absorption af veterinærlægemidlet gennem huden.
I tilfælde af utilsigtet kontakt med huden eller øjnene ved hændeligt uheld skal der straks vaskes med rigeligt vand.
Vask hænder efter behandling og før næste måltid.
Gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder bør undgå kontakt med lægemidlet eller bør udise ekstrem forsigtighed ved håndtering af dette veterinærlægemiddel.
Personer, der lider af progesteron afhængige tumorer (kendt eller mistænkt) eller af trombo-emboliske sygdomme (blodpropper) bør ikke håndtere veterinærlægemidlet.
Overeksponering: utilsigtet absorption kan føre til forstyrrelser af menstruationscyklus, livmoder- eller mavekramper, forøget eller nedsat blødning fra livmoderen, forlængelse af graviditet eller hovedpine. Direkte kontakt med huden bør derfor undgås.
I tilfælde af overeksponering skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
Dræctighed og diegivning: Må ikke anvendes til dræctige eller diegivende dyr.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Ingen kendte.
Overdosis: Ikke kendt.
Væsentlige uforligeligheder: Ingen kendte.

Bivirkninger
Svin: Ingen kendte.
Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også

2

368

183 | 183

bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægssedel, eller hvis du mener, at dette veterinærlægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægssedel eller via det nationale bivirkningssystem: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk.

Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde
Til oral anvendelse.
Kønsmodne polte: 20 mg altrenogest pr. dyr; dvs. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage.
Førstelægssøer: 20 mg altrenogest pr. dyr; dvs. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 3 til 14 på hinanden følgende dage.
Sørg for korrekt dosering hver dag i behandlingsperioden, da underdosering kan føre til dannelsen af cyster på æggestokkene.
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt administration
Veterinærlægemidlet skal administreres med en Altresyn doseringspumpe.
Indstilling af doseringspumpen:
1. Placér flasken i en vandret stilling, med mundstykket pegende opad.
2. Tryk langsomt på udløseren indtil en dråbe perler på spidsen af mundstykket.
Derefter giver doseringspumpen en dosis på 5 ml for hver fuldstændig aktivering af udløseren. Ved almindelig brug holdes beholderen lodret med toppen nedad.
Doseringspumpen bør forblive på flasken i hele anvendelsesperioden, og låsesystemet skal anvendes ved opbevaring mellem behandlingerne.
Dyrene skal doseres individuelt. Tilsæt produktet ved at strøe det ovenpå foderet umiddelbart før fodring og monitorér, at doseringen bliver indtaget. Alternativt kan produktet indgives direkte i dyrets mund ved at bruge en egnet doseringspumpe.
Veterinærlægemidlet bør indgives på samme tidspunkt hver dag i behandlingsperioden.

Særlige opbevaringsbetingelser
Opbevares utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.
Dette veterinærlægemiddel må ikke udledes i vandløb, da det aktive stof kan være farligt for fisk og andre vandorganismer.
Brug returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel.
Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.
Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

3

5 5

Väsk hendene efter behandling og før måltid.
Gravide kvinner og kvinner i fertil alder bør unngå kontakt med preparatet eller være ytterst forsiktige ved håndtering av preparatet.
Dette preparatet bør ikke håndteres av personer med kjent eller mistenkt progesteronavhengig tumor eller tromboembolisk lidelse.
Virkninger av overeksponering: Utilsiktet absorbsjon kan føre til forstyrrelse av menstruasjonssyklus, uterine- eller abdominale kramper, økt eller redusert uterin blødning, forlenget svangerskap eller hodepine.
Direkte kontakt med hud bør derfor unngås.
Ved overeksponering, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten.
Særlige forholdsregler for beskyttelse av miljøet:
Gjødsel etter behandlede dyr kan inneholde altrenogest, som kan ha en skadelig effekt i akvatisk miljø. Ved spredning av gjødsel etter behandlede dyr skal derfor minimum avstand til overflatevann, som definert i nasjonale eller lokale retningslinjer, overholdes.
Dræktighet og diegivning:
Skal ikke brukes hos dræktige eller diegivende dyr.
Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon: Ingen kjente.
Overdosering: Ingen kjente.
Relevante uforlikeligheter: Ingen kjente.

Bivirkninger
Gris: Ingen kjente.
Det er viktig å rapportere bivirkninger. Det muliggjør kontinuerlig sikkerhetsovervåking av et preparat. Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at preparatet ikke har virket, vennligst kontakt, i første omgang, din veterinær for rapportering av bivirkningen. Du kan også rapportere om enhver bivirkning til innehaveren av markedsføringstillatelsen ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av dette pakningsvedlegget, eller via det nasjonale rapporteringssystemet ditt:
Direktoratet for medisinske produkter:
www.dmp.no/bivirkningsmelding-vet.

Dosering for hver målart, tilførselsvei(er) og tilførselsmåte
Gis via munnen.
Kjønnsmodne ungpurker:
20 mg altrenogest / dyr; som tilsvarer 5 ml per dyr en gang daglig i 18 påfølgende dager.
Avvente årspurker:
20 mg altrenogest / dyr; som tilsvarer 5 ml per dyr en gang daglig i 3 til 14 påfølgende dager.
Påse hver dag at korrekt dose administreres ettersom underdosering kan føre til dannelse av cystiske follikler.

Opplysninger om korrekt bruk
Preparatet må kun administreres med Altresyn-doseringsenheten.
Innstilling og bruk av doseringsenheten:
1. Legg flasken horisontalt, med dysen pekende oppover
2. Trykk sakte på utløseren til en dråpe kommer til syne ytterst på dysen
Doseringsenheten vil avgi en dose på 5 ml for hvert fullstendig trykk på utløseren. Ved administrering holdes hetteglasset

10

183 | 183

unionin valmistetietokannassa:
(https://medicines.health.europa.eu/veterinary).
Pakkauskoot:
Kotelo, jossa yksi 360 mL:n painesäiliö.
Kotelo, jossa kolme 360 mL:n painesäiliötä
540 mL:n säiliö.
1 080 mL:n säiliö.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Päivämäärä, jolloin pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu
12.11.2024

Yhteystiedot
Myyntiluvan haltija ja yhteystiedot epäilyistä haittatapahtumista ilmoittamista varten:
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière,
33500 Libourne, Ranska
Puh: +800 35 22 11 51
Sähköposti: pharmacovigilance@ceva.com
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Ceva Santé Animale,
Z.I. Très le Bois,
22600 Loudéac, Ranska

Älä käytä tätä eläinlääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu säiliössä merkinnän Exp. jälkeen. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Innholdsstoffer (NO)
1 ml inneholder 4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroksyanisol (E320) og 0,07 mg butylhydroksytoluen (E321).
Klar, lys gul, luktfri opløsning

Målarter
Gris (kjønnsmodne ungpurker og avvente årspurker).

Indikasjoner
Til brunstsynkronisering.

Kontraindikasjoner
Skal ikke brukes på dyr som lider av livmorinfeksjon.
Skal ikke gis til hanndyr.
Se pkt. «Dræktighet og diegivning»

Særlige advarsler
Særlige advarsler: Ingen.
Særlige forholdsregler for sikker bruk hos målartene:
Fjern medisinliblandede fôrrester etter fôring.
Skal kun brukes hos kjønnsmodne ungpurker som har gjennomløpt minst én østrus, og hos urspurker ved avvenningstidspunktet.
Medisinliblandede fôrrester skal destrueres og ikke gis til andre dyr.
Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet:
Direkte kontakt med hud bør unngås. Personlig beskyttelsesutstyr: En hansker og overtrekkstøy bør brukes ved håndtering av preparatet. Dette preparatet kan gå igennom porøse hansker. Absorpsjon via huden kan øke når preparatet kommer i kontakt med hud som er dekket av tette materialer som lateks- eller gummihansker.
Utilsiktet søl på hud eller i øyne bør umiddelbart vaskes av med rikelig med vann.

4

5 5

Klassificering av veterinærlægemidler
Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.
Pakningsstørrelser:
Æske med 1 beholder med 360 ml
Æske med 3 beholdere med 360 ml
Beholder med 540 ml
Beholder med 1080 ml
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Dato for seneste ændring af indlægssedlen: 01.2025
Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen:
(https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Kontaktoplysninger
Indehaver af markedsføringstilladelse og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
Ceva Santé Animale,
10 avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, Frankrig
Tlf: +800 35 22 11 51, E-mail: pharmacovigilance@ceva.com
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Ceva Santé Animale,
Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Frankrig
Lokal repræsentant:
Ceva Animal Health A/S, Porschevej 12, 7100 Vejle
Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på beholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Sammansättning (SE)
1 ml innehåller:
4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroxianisol (E320) och 0,07 mg butylhydroxitoluen (E321)
Klar, blekgul luktfri lösning.

Djurslag
Svin (könsmogna gyltor och avvanda förstagrisare).

Användningsområden
För brunstsynkronisering

Kontraindikationer
Använd inte till djur med infektioner i livmodern.
Använd inte till handjur.
Se avsnitt: "Dräktighet och digivning"

Särskilda varningar
Särskilda varningar: Inga.
Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning hos det avsedda djurslaget:
Kvarblivet ej uppätet medicinerat foder kasseras.
Enbart för användning till könsmogna gyltor som har haft åtminstone en brunstcykel samt till förstagrisare, i samband med avvänning.
Kvarblivet medicinerat foder måste förvaras på ett säkert ställe och inte ges till andra djur.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Undvik direktkontakt med hud. Skyddskläder (handskar och overall) ska bäras vid hantering av läkemedlet. Porösa handskar kan släppa igenom läkemedlet till huden. Om läkemedlet kommer i

5

368

183 | 183

kontakt med huden under en handske, kan tätä ogenomträngliga handskmaterial såsom latex eller gummi förstärka upptag av läkemedlet genom huden.
Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter behandling och innan intag av måltid.
Gravida kvinnor och fertila kvinnor bör undvika kontakt med läkemedlet eller bör iaktta stor försiktighet när läkemedlet hanteras.
Personer som lider av tumörer som är beroende av gulkroppshormon (progesteron) (kända eller misstänkta) eller som lider av blodproppssjukdom bör inte hantera läkemedlet.
Effekter av överexponering: Oavsiktlig upptag genom huden kan leda till rubbningar i menstruationscykeln, kramper i buk eller livmoder, ökad eller minskad blödning från livmodern, förlängd graviditet eller huvudvärk. Direktkontakt med hud bör därför undvikas.
Vid överexponering, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.
Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljön:
Respektera nationella eller lokala regler för minimiavstånd till ytvatten vid spridning av gödsel från behandlade djur eftersom denna gödsel kan innehålla altrenogest som kan orsaka negativa effekter på den vattenmiljön.
Dräktighet och digivning:
Använd inte under dräktighet eller digivning.
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:
Inga kända.
Överdosering: Inga kända.
Viktiga blandbarhetsproblem: Inga kända.

Biverkningar
Svin: Inga kända.
Det är viktigt att rapportera biverkningar. Det möjliggör fortlöpande säkerhetsövervakning av ett läkemedel. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela i första hand din veterinär. Du kan också rapportera eventuella biverkningar till innehavaren av godkännande för försäljning genom att använda kontaktuppgifterna i slutet av denna bipacksedel, eller via ditt nationella rapporteringssystem:
SE: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala.
www.lakemedelsverket.se
FI: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. webbplats: www.fimea.fi/sv/veterinar.

Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg(ar)
Ges via munnen.
Könsmogna gyltor:
20 mg (5 ml) per djur en gång dagligen under 18 på varandra följande dagar.
Avvanda förstagrisare (suggor):
20 mg (5 ml) per djur en gång dagligen under 3 till 14 på varandra följande dagar.
Säkerställ att korrekt dos ges dagligen, underdosering kan leda till bildning av cystiska folliklar (äggblåsor).

Råd om korrekt administrering
Läkemedlet bör endast administreras med en Altresyn doseringspump.

6

5 5

haittatapahtumista ilmoittaminen on tärkeää. Se mahdollistaa eläinlääkkeen turvallisuuden jatkuvan seurannan. Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä, että lääke ei ole tehonnut, ilmoita ensisijaisesti asiasta eläinlääkärillesi. Voit ilmoittaa kaiksta haittavaikutuksista myös myyntiluvan haltijalle tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle käyttämällä tämän pakkausselosteen lopussa olevia yhteystietoja tai kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
www-sivusto: https://www.fimea.fi/elainlaakkeet/.

Annostus, antoreitit ja antotavat kohde-eläinlajeittain
Suun kautta.
Sukukypsät ensikot:
20 mg altrenogestia/eläin, eli 5 ml eläintä kohti kerran päivässä 18 peräkkäisen päivän ajan.
Kerran porsineet emakot porsaiden vieroituksen jälkeen:
20 mg altrenogestia/eläin, eli 5 ml eläintä kohti kerran päivässä 3-14 peräkkäisen päivän ajan.
Varmista, että eläin saa oikean annoksen joka päivä, sillä ainostelu voi johtaa follikkelikystojen muodostumiseen.

Annostusohjeet
Eläinlääkettä saa antaa vain Altresyn-annostelijalla.
Annostelijan esitäyttö:
1. Aseta pullo vaaka-asentoon siten, että annostelijan kärki on ylöspäin.
2. Paina laukaisinta hitaasti, kunnes annostelijan kärkeen ilmestyy pisara liuosta.
Annostelijasta saadaan 5 mL:n annos aina, kun laukaisin painetaan pohjaan.
Säännöllistä annostelua varten pidä pullo pystyasennossa ylösalaisin.
Annostelijan tulee olla kiinni pullossa valmisteen koko käyttöajan, ja luktusjärjestelmää tulee käyttää käyttökertojen välisen säilytyksen aikana.
Eläimet tulee lääkitä yksitellen. Lisää eläinlääke rehun päälle juuri ennen ruokintaa ja varmista että eläin syö annoksen.
Vaihtoehtoisesti eläinlääke voidaan annostella suoraan eläimen suuhun painamalla laukaisinta pullon ollessa ylösalaisin.
Eläinlääke tulee annostella joka päivä samaan aikaan.

Säilytystä koskevat erityiset varotoimet
Ei erityisiä säilytysohjeita.

Erityiset varotoimet hävittämiselle
Lääkettä ei saa kaataa viemärin eikä hävittää talousjätteiden mukana.
Eläinlääkettä ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieliöitä.
Eläinlääkkeiden tai niiden käytöstä syntyvien jätemateriaalien hävittämisessä käytetään paikalisia palauttamisjärjestelyjä sekä kyseessä olevaan eläinlääkkeeseen sovellettavia kansallisia keräysjärjestelmiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan suojella ympäristöä.
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista.

Eläinlääkkeiden luokittelu
Eläinlääkemääräys.
Tätä eläinlääkettä koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla

7

183 | 183

Koostumus (FI)
1 ml sisältää 4 mg altrenogestia, 0,07 mg butyylihydroksianisolia (E320) ja 0,07 mg butyylihydroksitoluee-nia (E321)
Kirkas, vaaleanekeltainen, hajuton liuos.

Kohde-eläinlaji(t)
Sika (sukukypsät ensikot ja kerran porsineet emakot porsaiden vieroituksen jälkeen).

Käyttöaiheet:
Kiiman synkronointiin.

Vasta-aiheet:
Ei saa antaa eläimille, joilla on kohtutulehdus.
Ei saa antaa urospuolisille eläimille.
Ks. kohta "Tiineys ja imetys".

Erityisvaroitukset
Erityisvaroitukset: Ei ole
Erityiset varotoimet, jotka liittyvät turvalliseen käyttöön kohde-eläinlajilla: Hävitä syömättä jäänyt lääkitty rehu.
Saa käyttää vain sukukypsille ensikoille, joilla on ollut jo ainakin yksi kiima, ja kerran porsineille emakoille vieroituksen yhteydessä.
Osittain syöty rehu on hävitettävä turvallisesti, eikä sitä saa antaa muille eläimille.
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkettä eläimille antavan henkilön on noudatettava: Suoraa ihokosketusta on vältettävä.
Eläinlääkettä käsiteltäessä on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineitä ja haalaria).
Huokoisia käsineitä käytettäessä eläinlääkettä voi päästä iholle. Jos eläinlääkettä pääsee iholle käsineen alle, käsineen sisältämät läpäisemättömät materiaalit, kuten lateksi tai kumi, voivat lisätä valmisteen imeytymistä ihon kautta.
Jos eläinlääkettä roiskuu vahingossa iholle tai silmiin, se on huuhdottava välittömästi pois runsaalla vedellä.
Pese kädet hoidon jälkeen ja ennen aterioita.
Raskaana olevien ja lisääntymisikäisten naisten tulee välttää kosketusta tämän valmisteen kanssa tai noudattaa äärimmäistä varovaisuutta käsitellessään tätä valmistetta.
Henkilöiden, joilla on (todettu tai epäilty) progestiininiippuvaisia kasvaimia tai jokin tromboembolinen häiriö, ei pidä käyttää tätä valmistetta.
Liallisen altistuksen vaikutukset: Vahingossa elimistöön imeytynyt lääke saattaa aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, kohdun tai vatsan kouristuksia, lisääntynyttä tai vähentynyttä kuukautisvuotoa, raskauden pitkittymistä tai päänsärkyä. Suoraa ihokosketusta on siksi välttettävä.
Liallisen altistuksen sattuessa ota yhteys lääkäriin.
Erityiset varotoimet, jotka liittyvät ympäristön suojeluun:
Hoidettujen eläinten lantaa levitettäessä on ehdottomasti noudatettava kansallisissa tai paikallisissa säädöksissä määritettyä vähimmäisetäisyyttä pintavesistöihin, sillä lanta voi sisältää altrenogestia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä.
Tiineys ja laktaatio: Ei saa käyttää tiineille tai imettäville eläimille.
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ei tunneta.
Yliannostus: Ei tunneta.
Merkittävät yhteensopimattomuudet: Ei tunneta.

Haittatapahtumat
Siat: Ei tunneta.

8

5 5

Installning av doseringspump:
1. Placera flaskan vågrätt med munstycket pekande uppåt.
2. Tryck långsamt på utlösaren tills en droppe kan ses på toppen av munstycket.
Doseringspumpen ger en 5 ml dos för varje fullständig aktivering av utlösaren. Håll flaskan upp och ner vid regelbunden användning.
Doseringspumpen bör sitta kvar på flaskan under hela användningsperioden och låssystemet bör användas vid förvaring mellan behandlingarna.
Djur bör doseras individuellt. Tillsätt läkemedlet ovanpå fodret omedelbart före utfodring och kontrollera att hela läkemedelsdosen konsumeras. Som ett alternativ kan läkemedlet ges direkt i djurets mun genom att trycka på doseringspumpen med flaskan vänd upp och ner.
Läkemedlet ska ges vid samma tidpunkt varje dag.

Särskilda förvaringsanvisningar
Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Detta läkemedel ska inte släppas ut i vattendrag på grund av att det kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.
Använd retursystem för kassering av ej använt läkemedel eller avfall från läkemedelsanvändningen i enlighet med lokala bestämmelser.
Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Fråga veterinär eller apotekspersonal hur man gör med läkemedel som inte längre används.

Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet
Receptbelagt läkemedel.
Utförlig information om detta läkemedel finns i unionens produktdatabas (https://medicines.health.europa.eu/veterinary)

Förpackningsstorlekar:
Kartong med 1 flaska (tryckbehållare) à 360 ml.
Kartong med 3 flaskor (tryckbehållare) à 360 ml.
Behållare med 540 ml.
Behållare med 1080 ml.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Datum då bipacksedeln senast ändrades
02/2025 (SE), 12.11.2024 (FI)

Kontaktuppgifter
Innehavare av godkännande för försäljning och kontaktuppgifter för att rapportera misstänkta biverkningar:
Ceva Santé Animale,
10, av. De La Ballastière,
33500 Libourne, Frankrike
Tel: +800 35 22 11 51
e-mail: pharmacovigilance@ceva.com
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Ceva Santé Animale,
Z.I. Très le Bois,
22600 Loudéac, Frankrike
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på behållaren efter Exp.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

9

368