Vnr 09 95 79

Altresyn® 4 mg/ml

Oral opløsning til svin
Oral lösning för svin
Oraaliliuos sioille
Mikstur, oppløsning til gris
altrenogest

1 ml: altrenogest. 4 mg, butylhydroxyanisol. (E320), butylhydroxytoluen. (E321)

1080 ml

OBS! Læs indlægssedlen omhyggeligt før brug.
Den indeholder information/advarsler vigtige for forbrugeren!
Efter anbrud, anvend inden 2 måneder, senest ___/___/___.
Tilbageholdelsestid: Slagtning: 9 døgn.
Opbevares utilgængeligt for børn. Til dyr. Kræver recept.

OBS! Läs bipacksedeln noga innan användning, denna innehåller information/varningar viktiga för användaren!
Öppnad förpackning ska användas inom 2 månader, senast ___/___/___.
Karenstid: Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. För djur. Receptbelagt.

Huom! Lue pakkausseloste ennen käyttöä.
Sisältää tärkeää tietoa ja varoituksia käyttäjälle!
Käytettävä avaamisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa, ___/___/___ mennessä.
Varoaika: Teurastus: 9 vrk.
Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Eläimille. Reseptivalmiste.

Advarsel! Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
Det inneholder informasjon/advarsler som er viktige for brukeren!
Etter åpning, brukes innen 2 måneder, senest ___/___/___.
Tilbakeholdelsestid: Slakt: 9 døgn.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Til dyr. Reseptpliktig.

Ceva Santé Animale,
Libourne, Frankrig/Frankrike/Ranska
MTnr. 49832 (DK), 57802 (SE), 36020 (FI), 18-12237 (NO).

7 046260 995796

A2/09

9

Vnr 09 95 79

Altresyn® 4 mg/ml

Oral opløsning til svin
Oral lösning för svin
Oraaliliuos sioille
Mikstur, oppløsning til gris
altrenogest

1 ml: altrenogest. 4 mg, butylhydroxyanisol. (E320), butylhydroxytoluen. (E321)

1080 ml

OBS! Læs indlægssedlen omhyggeligt før brug.
Den indeholder information/advarsler vigtige for forbrugeren!
Efter anbrud, anvend inden 2 måneder, senest ___/___/___.
Tilbageholdelsestid: Slagtning: 9 døgn.
Opbevares utilgængeligt for børn. Til dyr. Kræver recept.

OBS! Läs bipacksedeln noga innan användning, denna innehåller information/varningar viktiga för användaren!
Öppnad förpackning ska användas inom 2 månader, senast ___/___/___.
Karenstid: Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. För djur. Receptbelagt.

Huom! Lue pakkausseloste ennen käyttöä.
Sisältää tärkeää tietoa ja varoituksia käyttäjälle!
Käytettävä avaamisen jälkeen 2 kuukauden kuluessa, ___/___/___ mennessä.
Varoaika: Teurastus: 9 vrk.
Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Eläimille. Reseptivalmiste.

Advarsel! Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
Det inneholder informasjon/advarsler som er viktige for brukeren!
Etter åpning, brukes innen 2 måneder, senest ___/___/___.
Tilbakeholdelsestid: Slakt: 9 døgn.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Til dyr: Reseptpliktig.

Ceva Santé Animale,
Libourne, Frankrig/Frankrike/Ranska
MTnr. 49832 (DK), 57802 (SE), 36020 (FI), 18-12237 (NO).

7 046260 995796

A2/09

10

11

Indehaver af markedsføringstilladelse:
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrig.
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Ceva Santé Animale, Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Frankrig.

ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER
1 ml indeholder 4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroxyanisol (E320) og 0,07 mg butylhydroxytoluën (E321).

DYREARTER
Svin (kønsmodne polte).

INDIKATION(ER)
Til synkronisering af brunst hos kønsmodne polte.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)
Til oral anvendelse til at strø på foder. 20 mg altrenogest pr. dyr, dvs. 5 ml pr. dyr én gang dagligt i 18 på hinanden følgende dage.

Oplysninger om korrekt anvendelse
Produktet skal administreres med en Altresyn® doseringspumpe.
Indstilling af doseringspumpen:
- Placér flasken i en vandret stilling, med mundstykket pegende opad.
- Tryk langsomt på udløseren indtil en dråbe perler på spidsen af mundstykket.

Derefter giver doseringspumpen en dosis på 5 ml for hver fuldstændig aktivering af udløseren. Ved almindelig brug holdes beholderen lodret med toppen nedad. Doseringspumpen bør forblive på flasken i anvendelsesperioden, og låsesystemet skal anvendes ved opbevaring mellem behandlingerne. Dyrene skal holdes adskilt, og doseres individuelt. Tilføj produktet ved at strø det på foderet. Tilsættes overfladen af foderet umiddelbart før fodring ved hjælp af den medfølgende doseringspumpe.
Sørg for korrekt dosering hver dag i behandlingsperioden, da underdosering kan føre til dannelsen af ovariecyster.

TILBAGEHOLDELSESTID(ER)
Slagtning: 9 døgn.

SÆRLIGE ADVARSLER
Ved spredning af gødning fra behandlede dyr skal den minimumsafstand til overfladevand, som er fastsat i henhold til nationale eller lokale bestemmelser, nøje overholdes, idet gødningen kan indeholde altrenogest, som kan forårsage uønskede påvirkninger af vandmiljøet.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes til svin med urinvejsinfektioner. Må ikke anvendes til orner. Se afsnit om brug under diegivning og drægtighed.

Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.
Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk.
E-mail: dkma@dkma.dk

2

183 183 183 183

368

Print Space 2 mm

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Tilsæt det veterinære lægemiddel til foderet umiddelbart før fodring. Alt uspist medicineret foder kasseres, og destrueres på en sikker måde, og må ikke videregives til andre dyr.
Må kun bruges til kønsmodne polte, der allerede har vist brunst.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr
Direkte kontakt med huden bør undgås. Personligt beskyttelsesudstyr (handsker og overalls) skal benyttes ved håndtering af produktet. Porøse handsker kan lade dette produkt passere igennem til huden. Hvis produktet kommer i kontakt med huden under handsken kan materialer, såsom latex eller gummi i handsker, forøge absorption af produktet gennem huden. I tilfælde af kontakt med huden eller øjnene ved hændeligt uheld skal der straks vaskes med rigeligt vand. Vask hænder efter behandling og før næste måltid. Gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder bør undgå kontakt med lægemidlet eller bør udvise ekstrem forsigtighed ved håndtering af dette lægemiddel.
Personer der lider af progesteronafhængige tumorer (kendt eller mistænkt) eller af tromboemboliske sygdomme, bør ikke håndtere produktet. Overeksponering: utilsigtet absorption kan føre til forstyrrelser af menstruationscyklus, livmoder eller mavekramper, forøget eller nedsat uterin blødning, forlængelse af graviditet eller hovedpine. Direkte kontakt med huden bør derfor undgås. I tilfælde af overeksponering, søg lægehjælp.
Anvendelse under drægtighed og diegivning
Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.

Interaktioner, overdosering og uforenelighed
Ingen kendte.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på beholderen efter EXP. Datoen refererer til månedens sidste dag.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
Altresyn® må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.
Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

ØVRIG INFORMATION
Seneste reviderede indlægssedler findes på www.indlægssedler.dk.
Pakningsstørrelser:
Papæske med 1 beholder med 360 ml.
Papæske med 3 beholdere med 360 ml.
Beholder med 540 ml.
Beholder med 1080 ml.
Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.
MTnr. 49832
Dato for seneste revision af etiketten
08/2018.
TIL DYR

3

4

5

6

10

kjønnsmodne ungpurker som allerede har gjennomløpt én brunst (østrus).
Medisinblandede fôrrester skal destrueres og ikke gis til andre dyr.

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet
Direkte kontakt med hud bør unngås.
Personlig beskyttelsesutstyr som hansker og overtrekkstøy skal benyttes ved håndtering av preparatet. Dette preparatet kan gå igjennom porøse hansker. Absorpsjon via huden kan øke når preparatet kommer i kontakt med hud som er dekket av tette materialer som lateks- eller gummihansker.
Utilsiktet søl på hud eller i øyne bør umiddelbart vaskes av med rikelig med vann.
Vask hendene etter behandling og før måltid.
Gravide kvinner og kvinner i fertil alder bør unngå kontakt med preparatet eller være ytterst forsiktige ved håndtering av preparatet.
Dette preparatet ikke håndteres av personer med kjent eller mistenkt progesteronavhengig tumor eller tromboembolisk lidelse.
Virkninger av overeksponering: Utilsiktet absorbsjon kan føre til forstyrrelse av menstruasjonssyklus, livmor- eller magekramper, økt eller redusert blødning fra livmoren, forlenget svangerskap eller hodepine.
Direkte kontakt med hud bør derfor unngås.
I tilfelle av overeksponering bør lege oppsøkes.
Bruk under drektighet og laktasjon
Skal ikke brukes til drektige og diegivende dyr.

Interaksjoner, overdosering, uforlikeligheter
Ingen kjente.

OPPBEVARINGSBETINGELSER
Ingen bestemte krav til oppbevaring.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE
Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Altresyn®, da preparatet kan være skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.
Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav.

ANNEN INFORMASJON
Pakningsstørrelser:
1 beholder à 360 ml i en eske av pappkartong.
3 beholdere à 360 ml i en eske av pappkartong.
1 beholder à 540 ml.
1 beholder à 1080 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
MT-nr: 18-12237
Dato for siste godkjenning av etikett
28.11.2018
TIL DYR

7

8

9

Innehavare av godkännande för försäljning:
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrike.
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Ceva Santé Animale,
Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, France

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)
1 ml innehåller: 4 mg altrenogest, 0,07 mg butylhydroxyanisol (E320) och 0,07 mg butylhydroxytoluen (E321).

DJURSLAG
Svin (könsmogna gyltor).

INDIKATION(ER)
För brunstsynkronisering av könsmogna gyltor.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)
Ges via munnen genom att sprida läkemedlet över fodret.
20 mg (5 ml) per djur en gång dagligen under 18 på varandra följande dagar.

Anvisning för korrekt administrering
Produkten bör endast administreras med en Altresyn® doseringspump.
Inställning av doseringspump:
- Placera flaskan vågrätt med munstycket pekande uppåt.
- Tryck långsamt på utlösaren tills en droppe kan ses på toppen av munstycket.

Därefter ger doseringspumpen en 5 ml dos för varje fullständig aktivering av utlösaren. Håll flaskan upp och ner vid regelbunden användning.
Doseringspumpen bör sitta kvar på flaskan under hela användningsperioden och låssystemet bör användas vid förvaring mellan behandlingarna.
Djur bör hållas isär och doseras individuellt. Läkemedlet ges genom att sprida det över fodret omedelbart före utfodring.
Säkerställ att korrekt dos administreras dagligen, underdosering kan leda till bildning av cystiska äggblåsor (folliklar).

KARENSTID(ER)
Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT
Respektera nationella eller lokala regler för minimiavstånd till ytvatten vid spridning av gödsel från behandlade djur eftersom denna gödsel kan innehålla altrenogest som kan orsaka negativa effekter på den vattenmiljön.

Kontraindikationer: Använd inte till djur med infektion i livmodern. Använd inte till handjur.
Se avsnitt ”Dräktighet och digivning”.

Biverkningar: Inga kända.
Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.
Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet:
Sverige: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03, Uppsala.
www.lakemedelsverket.se
Finland: www.fimea.fi/web/sv/veterinar

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Tillsätt

11

12

13

14

läkemedlet i fodret omedelbart före utfodring. Kvarblivet, ej uppätet medicinerat foder kasseras. Skall endast användas till könsmogna gyltor som tidigare har uppvisat brunst.
Kvarblivet medicinerat foder måste förvaras på ett säkert ställe och inte ges till andra djur.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Undvik direktkontakt med hud. Skyddshandskar (handskar och overall) ska bäras vid hantering av produkten. Porösa handskar kan släppa igenom produkten till huden. Om produkten kommer i kontakt med huden under en handske, kan täta ogenomtränglliga handskmaterial såsom latex eller gummi förstärka upptag av läkemedlet genom huden.
Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj med rikligt med vatten. Tvätta händerna efter behandling och innan intag av måltid.
Gravida kvinnor och kvinnor i fruktsam ålder bör undvika kontakt med läkemedlet eller bör iaktta stor försiktighet när produkten hanteras.
Personer som lider av tumörer som är beroende av gulkroppshormon (progesteron) (kända eller misstänkta) eller som lider av blodproppssjukdom bör inte hantera produkten. Effekter av överexponering: Oavsiktligt upptag genom huden kan leda till rubbningar i menstruationscykeln, kramper i buk eller livmoder, ökad eller minskad blödning från livmodern, förlängd graviditet eller huvudvärk. Direktkontakt med hud bör därför undvikas.
Vid överexponering, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.
Dräktighet och digivning: Använd inte under dräktighet eller laktation.

Andra läkemedel och Altresyn®: Inga kända interaktioner.
Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift): Inga kända.
Blandbarhetsproblem: Inga kända

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL
Altresyn® får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

ÖVRIG INFORMATION
Förpackningsstorlekar: Kartong med 1 behållare à 360 ml.
Kartong med 3 behållare à 360 ml.
Behållare med 540 ml. Behållare med 1080 ml.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
MT nr: 57802 (SE), 36020 (FI).
Datum då bipacksedeln senast godkändes:
25.10.2018 (SE), 06.09.2018 (FI).
FÖR DJUR

15

16

17

18

sukupysille ensikoille, joilla on ollut jo yksi kiima.
Osittain syöty rehu on hävitettävä turvallisesti, eikä sitä saa antaa muille eläimille.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava
Suoraa ihokosketusta on vältettävä. Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineitä ja haalaria). Huokoisia käsineitä käytettäessä valmistetta voi päästä iholle. Jos valmistetta pääsee iholle käsineen alle, käsineen sisältämät läpäisemättömät materiaalit, kuten lateksi tai kumi, voivat lisätä valmisteen imeytymistä ihon kautta.
Jos valmistetta roiskuu vahingossa iholle tai silmiin, se on huuhdottava välittömästi pois runsaalla vedellä.
Pese kädet hoidon jälkeen ja ennen aterioita.
Raskaana olevien ja lisääntymisikäisten naisten tulee välttää kosketusta tämän valmisteen kanssa tai noudattaa äärimmäistä varovaisuutta käsitellessään tätä valmistetta.
Henkilöiden, joilla on (todettu tai epäilty) progestiiniriippuvaisia kasvaimia tai jokin tromboembolinen häiriö, ei pidä käyttää tätä valmistetta.
Liiallisen altistuksen vaikutukset: Vahingossa elimistöön imeytynyt lääke saattaa aiheuttaa kuukautiskierron häiriöitä, kohdun tai vatsan kouristuksia, lisääntynyttä tai vähentynyttä kuukautisvuotoa, raskauden pitkittymistä tai päänsärkyä. Suoraa ihokosketusta on siksi vältettävä.
Liiallisen altistuksen sattuessa ota yhteys lääkärin.

Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana
Ei saa käyttää tiineille tai imettäville eläimille.

Yhteisvaikutukset, yliannostus, yhteensopimattomuudet: Ei tunneta.

SÄILYTYSOLOSUHTEET
Ei erityisiä säilytysohjeita.
Ei lasten näkyville eikä ulottuville.
Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu pakkauksessa (EXP) jälkeen. Eräntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI
Altresyn® ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita vesieliöitä.
Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi tai apteekista.
Nämä toimenpiteen on tarkoitettu ympäristön suojelemiseksi.

MUUT TIEDOT
Pakkauskoot: Kotelo, jossa yksi 360 ml:n pakkaus.
Kotelo, jossa kolme 360 ml:n pakkausta
540 ml:n pakkaus.
1080 ml:n pakkaus.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.
MT nr: 36020
Päivämäärä, jolloin tuotetiedot on viimeksi hyväksytty
06.09.2018
ELÄIMILLE

19

20

21

22

Myyntiluvan haltija:
Ceva Santé Animale,
10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Ranska
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Ceva Santé Animale, Z.I. Très le Bois, 22600 Loudéac, Ranska

VAIKUTTAVA(T) AINE(ET) JA MUUT AINEET
1 ml sisältää 4 mg altrenogestia, 0,07 mg butyylihydroksianisolia (E320) ja 0,07 mg butyylihydroksitolueenia (E321).

KOHDE-ELÄINLAJI(T)
Sika (sukukypsät ensikot).

KÄYTTÖAIHEET
Kiiman synkronointiin sukukypsille ensikoille.

ANTOTAPA JA ANTOREITTI (ANTOREITIT)
Suun kautta rehun päällä annettuna.
20 mg altrenogestia/eläin, eli 5 ml eläintä kohti kerran päivässä 18 peräkkäisen päivän ajan.

Annostusohjeet
Valmistetta saa antaa vain Altresyn®-annostelijalla.
Annostelijan esitäyttö:
- Aseta pullo vaaka-asentoon siten, että annostelijan kärki on ylöspäin.
- Paina laukaisinta hitaasti, kunnes annostelijan kärkeen ilmestyy pisara liuosta.

Nyt annostelijasta saadaan 5 ml:n annos aina, kun laukaisin painetaan pohjaan. Säännöllistä annostelua varten pidä pullo pystyasennossa ylösalaisin.
Annostelijan tulee olla kiinni pullossa valmisteen koko käyttöajan, ja lukitusjärjestelmää tulee käyttää käyttökertojen välisen säilytyksen aikana.
Eläimet tulee erottaa toisistaan ja lääkitä erikseen. Lisää valmiste rehun päälle. Lisää valmiste rehun päälle juuri ennen ruokintaa. Varmista, että eläin saa oikean annoksen joka päivä, sillä aliannostelu voi johtaa follikkelikystojen muodostumiseen.

VAROAIKA (VAROAJAT)
Teurastus: 9 vrk.

TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS (ERITYISVAROITUKSET)
Hoidettujen eläinten lantaa levitettäessä on ehdottomasti noudatettava kansallisissa tai paikallisissa säädöksissä määritettyä vähimmäisetäisyyttä pintavesistöihin, sillä lanta voi sisältää altrenogestia, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä.

Vasta-aiheet
Ei saa antaa eläimille, joilla on kohtutulehdus.
Ei saa antaa urospuolisille eläimille.
Ks. kohta ”Käyttö tiineyden ja imetyksen aikana”.

Haittavaikutukset
Ei tunneta.
Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.
Vaihtoehtoisesti voit myös ilmoittaa kansallista raportointijärjestelmää käyttäen www.fimea.fi/elainlaakkeet.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet
Eläinlääkevalmiste lisätään rehuun välittömästi ennen ruokintaa. Hävitä syömättä jäänyt lääkitty rehu. Saa käyttää vain

23

24

25

26