INDLÆGSSEDDEL

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. Veterinærlægemidlets navn

Medrol Vet. 4 mg tabletter

2. Sammensætning

Aktivt stof:

Methylprednisolon 4 mg.

Tabletterne er konveks, ellipseformede og hvide med "Medrol 4" præget på den ene side og krydskærv på den anden side. Krydskærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at administrere, ikke for at kunne deles i lige store doser.

3. Dyrearter

Til hund og kat.

4. Indikation(er)

Behandling af aseptiske (frie for mikroorganismer) muskel-, sene- og bursalidelser samt allergiske lidelser hos hund og kat.

5. Kontraindikationer

Systemisk kortikosteroidbehandling er kontraindiceret til patienter med nyrelidelser, sukkersyge samt til patienter der har tuberkulose, mavesår og Cushings syndrom.
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6. Særlige advarsler

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:
I tilfælde af infektioner skal den steroide behandling kombineres med en korrekt antibiotikabehandling.
Ved tilstedeværelse af osteoporose, prædisponering for thrombophlebitis, forhøjet blodtryk, medfødt hjertefejl eller bakteriel infektion bør brug af kortikosteroider foretages under nøje observation.
Længere tids behandling med steroider i høj dosis kan kompromittere patientens immunologiske forsvarsmekanismer.
Behandlingsforløbet skal nøje følges af en dyrlæge.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Vask hænder efter brug. I tilfælde af utilsigtet indtagelse ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Drægtighed:
Må ikke anvendes.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Kombination af glukokortikoider med salicylater og ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer forøger risikoen for komplikationer i mave-tarmkanalen.
Kombination af glukokortikoider med diuretika af thiazidgruppen forøger risikoen for glukoseintolerance.
I tilfælde af diabetes kan glukokortikoider forstærke behovet for insulin eller oral hypoglukæmisk medicin.
Administration af barbiturater, phenylbutazon, phenytoin eller rifampicin forøger metaboliseringen og nedsætter kortikosteroidernes effekt. Kortikosteroider kan også nedsætte antikoagulanters effekt.

Overdosis:
De væsentlige tegn på akut toksicitet er hypertension, opkastning og ødem.

7. Bivirkninger

Hund og kat:

Meget almindelig (> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):	Overdreven urinproduktion Unormal stigning i væskeforbruget, abnorm voldsom appetit
Meget sjælden (< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):	Cushings syndrom[1], Diabetes mellitus[2] Gastrisk ulcerationus[3], Intestinal lidelse[3,4] Osteoporose Muskelatrofi Alopeci, Hududtynding Omlægning af kropsfedt Forsinket heling[3,5]

[1] Omfatter væsentlige ændringer i fedt, kulhydrat, protein- og mineral-metabolisering.
[3] Hos katte.
[4] Ved langtidsbehandling og kombination med NSAIDs.
[5] Intestinal ulceration.
[6] Forsinket sårheling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelse ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Til oral anvendelse. Tabletterne skal indgives gennem munden.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Dosering er individuel. Den anbefalede dosis til **hund og kat er: 0,1 - 1,0 mg/kg** legemsvægt.

Følgende dosisanbefalinger er retningsgivende:

Legemsvægt	Gennemsnitlig daglig dosis
< 9 kg	2 mg
9-18 kg	2-4 mg
18-36 kg	4-8 mg

Dosis bør i begyndelsen fordeles over to daglige doser.

Så snart et tilfredsstillende svar på behandlingen er nået, bør den daglige dosis gradvis nedsættes; ved kroniske lidelser til den mindst effektive vedligeholdelsesdosis. Der kan evt. behandles hver anden dag.

9. Oplysninger om korrekt administration

Det tilrådes at behandle katte om aftenen og hunde om morgenen.

10. Tilbageholdelsestid(er)

Ikke relevant.

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

13. Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

MTnr 15509

30 tabletter
100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen

8. oktober 2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelse og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Tlf: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Pfizer Italia S.r.l.
63100 Marino del Tronto
Ascoli Piceno
Italien