

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Telfast® til dig personligt. Lad derfor være med at give Telfast® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Overzicht over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telfast®.
3. Sådan skal du tage Telfast®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Telfast®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Telfast® er et antihistamin. Antihistaminer lindrer symptomerne ved høfeber og nældefeber. Telfast® lindrer symptomer som nysen, rindende øjne og løbende næse, som optræder ved høfeber (sæsonbettinget allergisk rhinitis). Telfast® lindrer symptomer som kløe, rødme og hævelse af huden ved nældefeber (urticaria)

Læge kan have foreskrevet anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Telfast®

Tag ikke Telfast® hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Særlige forholdsregler

Ældre patienter samt patienter med nedsat nyre- og leverfunktion bør rådføre sig med lægen før behandlingen startes. Patienter med tidligere tilfælde af eller med vedvarende hjertekarsygdom, bør advares om at lægemiddelgruppen antihistaminer er blevet associeret med bivirkningerne unormalt øget hjerterytme og hjertebanken.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Der er kun begrænset erfaring med anvendelse under graviditet. Derfor bør Telfast® ikke anvendes under graviditet.

Amning: Telfast® kan genfindes i modermælk. Derfor bør Telfast® ikke anvendes, hvis du ammer.

Forsigtighed ved anden samtidig indtagelse af lægemidler eller andet

Behandlingens effekt kan påvirkes, såfremt Telfast® anvendes samtidig med visse andre lægemidler. Lægen skal derfor informeres, såfremt du også tager andre typer medicin. Virkningen af Telfast® kan nedsættes, hvis det indtages sammen med visse syreneutraliserende lægemidler, der indeholder aluminium- og magnesiumhydroxid. Telfast® og disse syreneutraliserende lægemidler skal derfor indtages med 2 timers mellemrum.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Telfast® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Telfast®

Dosis fastsættes af lægen.

Anbefalet dosis for voksne og børn på 12 år og derover:

Høfeber: 1 filmovertrukken tablet på 120 mg daglig før et måltid

Nældefeber: 1 filmovertrukken tablet på 180 mg daglig før et måltid.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Telfast®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Telfast®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Svimmelhed, døsigthed, træthed og mundtørhed er rapporteret ved overdosering af Telfast®.

Har du glemt at tage Telfast®?

Hvis du har glemt at tage din dosis til tiden, tag den næste dosis som din læge har fortalt dig. Du må ikke tage dobbeltdosis.

4. Bivirkninger

Telfast® kan som al anden medicin give bivirkninger. Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

Almindelige bivirkninger:

(det sker hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine, døsigthed, svimmelhed, kvalme

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Træthed, søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser eller mareridt, unormalt øget hjerterytme, hjertebanken og diarré.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Kløe, nældefeber og udslæt samt overfølsomhedsreaktioner med symptomer som angioødem (lokale hævelser af hud og slimhinder og andre dele af kroppen), trykken for brystet, åndenød, anfaldsvis rødme af huden i ansigtet og systemisk anafylaksi (kraftig allergisk reaktion)

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

5. Sådan opbevarer du Telfast®

Medicinen skal opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den anvendelsesdato, som er angivet på emballagen.

6. Yderligere oplysninger

1 filmovertrukken tablet indeholder:

Aktivt indholdsstof: Fexofenadinhydrochlorid 120 mg (svarende til fexofenadin 112mg) eller fexofenadinhydrochlorid 180 mg (svarende til fexofenadin 168 mg).

Hjælpestoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylmethylcellulose, povidon, titandioxid (E 171), jernoxid (E172), silica, kolloid vandfri, macrogol 400.

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Udseende og pakningsstørrelse

Telfast® 120 mg: Filmovertrukne tabletter, præget på 1. side med "012" og et stregmønster på 2. side.

Telfast® 120 mg findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 filmovertrukne tabletter.

Telfast® 180 mg: Filmovertrukne tabletter, præget på 1. side med "018" og et stregmønster på 2. side.

Telfast® 180 mg findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 filmovertrukne tabletter.

Import og ompakning: 2care4, 6710 Esbjerg.

Telfast® er et registreret varemærke, der tilhører SanofiAventis.