

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lomudal 20 mg/ml øjendråber, enkeltdosisbeholder Natriumcromoglicat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Lomudal øjendråber nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal
3. Sådan skal du bruge Lomudal
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lomudal indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.

Du kan bruge Lomudal øjendråber til behandling af:

- Allergisk øjenbetændelse.
- Betændelse i øjets bindehinde og hornhinde.
- Betændelse i øjet med små sår i øjets hornhinde.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Lomudal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Vær opmærksom på, at betændelse i øjets hornhinde kan være alvorligt. Tal med lægen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lomudal

Brug ikke Lomudal øjendråber:

- hvis du er allergisk over for natriumcromoglicat eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lomudal øjendråber er sterile, indeholder ikke konserveringsmiddel og er pakket i enkelt-dosisbeholdere. Opløsningen skal anvendes straks efter åbning af enkelt-dosisbeholderen, og det resterende indhold skal kasseres efter brug.

Brug af anden medicin sammen med Lomudal

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Lomudal og det andet præparat.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Lomudal øjendråber, hvis du er gravid.

Amning

Du kan bruge Lomudal øjendråber, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomudal kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Lomudal kan medføre sløret syn efter drypning, hvilket kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3. Sådan skal du bruge Lomudal

Brug altid Lomudal øjendråber nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn over 7 år: 1 dråbe i hvert øje 4 gange daglig.

Børn under 7 år: Du må kun bruge Lomudal øjendråber til børn under 7 år efter aftale med lægen.

Sådan bruges øjendråberne

- Træk det nederste øjenlåg lidt ned, og dryp en dråbe i mellemrummet mellem øjet og øjenlåget.
- Pas på, at spidsen af flasken ikke rører øjet.
- Slip øjenlåget og blink nogle gange, så dråben fordeles over hele øjet.

Gentag dette i det andet øje.

Hvis du har brugt for meget Lomudal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Lomudal øjendråber, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Lomudal

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter)

- Forbigående svien.
- Lokal irritation i øjet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

- Overfølsomhedsreaktioner.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Brændende eller stikkende følelse efter drypning af øjet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Lomudal øjendråber utilgængeligt for børn.

Inden åbning kan du opbevare Lomudal øjendråber ved almindelig temperatur.

Enkeltdosisbeholderne skal opbevares i den originale pose. De kan anvendes i 28 dage efter at posen er åbnet første gang. Ubrugte enkeltdosisbeholdere skal bortskaffes efter dette tidspunkt. Opbevar ikke en åbnet enkeltdosisbeholder.

Brug ikke Lomudal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lomudal 20 mg/ml øjendråber indeholder:

Aktivt stof: Natriumcromoglicat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Lomudal øjendråber i enkeltdosisbeholdere findes i pakninger med 20 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Fremstiller

Laboratoire Unither

Espace Industriel Nord

151 rue A. Durouchez

CS 28028

80084 Amiens Cedex 2

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2023