

Fucithalmic® 10 mg/g 5 g øjendråber, suspension fusidinsyre

06-2014
P075660-6

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®
3. Sådan skal du bruge Fucithalmic®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucithalmic® er et antibiotikum til brug i øjnene. Fucithalmic® virker i starten bakterie-hæmmende, men efterhånden også bakterie-dræbende.

Du skal bruge Fucithalmic® til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fucithalmic® er virksomt på.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fucithalmic®

- hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic® (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fucithalmic®.

Vær opmærksom på følgende:

- Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic® øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde.
- Hvis du bruger Fucithalmic® for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin sammen med Fucithalmic®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fucithalmic® og det andet præparat.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Fucithalmic® under graviditet.

Amning

Du kan bruge Fucithalmic®, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucithalmic® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Fucithalmic® indeholder benzalkoniumchlorid

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet.

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic®

Brug altid lægemidlet nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt.

Brugsanvisning

1. Skru hættten af tuben. Læg hovedet tilbage og se op i loftet.
2. Træk forsigtigt det underste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
3. Tryk 1 dråbe ud i lommen. Undgå at tubens spids rører øjet eller dets omgivelser.
4. Børns øjne kan dryppes, mens barnet ligger ned eller sover.

For at lette inddrypningen er Fucithalmic® øjendråber lidt tyktflydende, men bliver i løbet af få øjeblikke klare og tyndtflydende.

Hvis du har brugt for meget Fucithalmic®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucithalmic®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag emballagen med.

Hvis du har glemt at bruge Fucithalmic®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Sviende øjne, brændende øjne og øjenirritation.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Rindende øjne, forbigående sløret syn.
- Hudkløe, hævelse omkring øjnene samt allergisk reaktion.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Forværret øjenbetændelse.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fucithalmic® utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Fucithalmic® ved almindelig temperatur. Brug ikke Fucithalmic® mere end 4 uger efter åbning. Brug ikke Fucithalmic® efter den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den foregående måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucithalmic® indeholder:

Aktivt stof: Fusidinsyre.
Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumedetat, carbomer, mannitol, natriumhydroxid og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Tube med tyktflydende øjendråber.

Pakningsstørrelse

Fucithalmic® fås i en pakningsstørrelse á 5 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Fucithalmic® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2014