

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Primperan® 20 mg, suppositorier

Metoclopramid

01-2013
P080797-5

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Primperan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primperan®
3. Sådan skal du tage Primperan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Primperan® dæmper kvalme og fremskynder madens passage gennem maven, så du ikke kaster op. Du kan tage Primperan® ved kvalme og opkastning.

Lægen kan have givet dig Primperan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PRIMPERAN®

Tag ikke Primperan®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for metoclopramid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Primperan®.
- hvis du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom).
- hvis du lider af blødninger, forsnævring eller perforering i mave-tarmkanalen.
- hvis du lider af ufrivillige bevægelser.
- hvis du tager medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa).
- hvis du er under 18 år.

Vær ekstra forsigtig med at tage Primperan®

- Tal med lægen, inden du tager Primperan®, hvis du:
- er epileptiker.
 - får feber, ufrivillige bevægelser eller kraftige muskelspændinger.
 - hvis du har Parkinsons sygdom eller tidligere har haft en depression.
 - hvis din lever eller dine nyrer ikke virker normalt.

Ældre, konfuse mennesker bør bruge Primperan® med forsigtighed.

Behandlingen bør ikke overstige 3 måneder p.g.a. øget risiko for langsomme, ufrivillige bevægelser. Kan også forekomme ved anvendelse af høje doser.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- Medicin mod Parkinsons sygdom (levodopa, bromocriptin).
- Stærke smertestillende lægemidler (morfin og lignende).
- Medicin mod spasmer i mave eller tarm (antikolinergika).
- Nervemedicin.
- Sovemidler og beroligende midler.
- Medicin mod psykiske lidelser (f.eks. lithium).
- Digoxin (hjertemedicin).
- Ciclosporin (bruges ved transplantationer).
- Lette smertestillende midler (acetylsalicylsyre og paracetamol).
- Medicin til afbrydelse af mælkeproduktion (f.eks. cabergolin).
- Atovaquon (mod malaria).
- Medicin mod allergi (antihistaminer).
- Muskelafslappende medicin (suxamethonium, mivaconium).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Primperan®, og Primperan® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Primperan® sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke alkohol så længe, du er i behandling med Primperan®.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Primperan® efter aftale med lægen.

Du må ikke tage Primperan® i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Primperan®, da Primperan® går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Primperan® kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Primperan® kan give døsighed, som forstærkes af nervemedicin, stærke smertestillende lægemidler og alkohol.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PRIMPERAN®

Tag altid Primperan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Primperan® suppositorier skal indføres i endetarmen.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 suppositorie (20 mg) 3 gange dagligt, evt. stigende til 6 suppositorier dagligt. Tal med lægen. Ved migræneanfald: 1 suppositorie (20 mg) så tidligt som muligt ved anfaldets start.

Børn

Børn må ikke få Primperan® suppositorier.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Primperan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Primperan®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er døsighed, forvirring, hallucinationer, ufrivillige bevægelser, kramper, langsom puls, bevidsthedstab, hjerteblok eller unormal hjerterytme.

Hvis du har glemt at tage Primperan®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Primperan®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Primperan® er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Primperan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt. Brystmerter. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Forstyrrelser i blodet (specielt hos nyfødte eller ved samtidig brug af sulfurfrigivende midler i høje doser).
- Kramper, høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens - søg straks læge.
- Stærke smerter ved hjertet eller i brystkassen, hjerteblok og hjertestop - kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Overfølsomhedsreaktioner (f.eks. hududslæt, kløe og hævelser).
- Udeblivende menstruation og mælkeflåd.
- Udvikling af brystkirtlen hos mænd.
- Døsighed, kraftige muskelspændinger, ufrivillige bevægelser og parkinsonlignende symptomer.
- Uro i benene, selv efter en enkelt dosis, specielt hos børn og unge.
- Diarré.
- Bevisthedstab, forvirring.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Almen svækkelse.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Depression.
- Bevægelsesforstyrrelser (specielt hos ældre).
- Mundtørhed.
- Udslæt, (nældefeber).

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- For lavt eller forhøjet blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Primperan® ved almindelig temperatur.

Tag ikke Primperan® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Primperan®, 20 mg, suppositorier indeholder:

Aktivt stof: Metoclopramid.

Øvrige indholdsstoffer: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Primperan® suppositorier er hvide, aflange stikpiller, der er spidse i den ende.

Pakningsstørrelse

Primperan® fås i pakningsstørrelser á 5 stk. og 30 stk. suppositorier.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

Zcare4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Primperan® er et registreret varemærke, der tilhører Sanofi-Aventis.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2013.