

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vilan 5 mg tabletter

Nicomorphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Vilan tabletter til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Vilans virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vilan
3. Sådan skal du tage Vilan
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Vilan
6. Yderligere oplysninger

1. VILANS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Vilan er et stærkt smertestillende middel, som virker på de områder i hjernen, der registrerer smerter.

Du kan bruge Vilan til behandling af stærke smerter. Vilan virker hurtigt og har en virkning på 3-5 timer.

Lægen kan have givet dig Vilan til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VILAN

Tag ikke Vilan, hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for nicomorphin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- har vejrtrækningsproblemer.
- har manglende slimafsondring i luftvejene.
- har tarmslyng (tarmfunktionen er ophørt).
- har akutte mavesmerter eller tarmproblemer.
- har akut leversygdom.
- har forstoppelse.
- har kramper.
- har kvæstet hovedet.
- samtidig er i behandling med andre smertestillende midler (morphin-agonister/antagonister).
- er beruset af alkohol eller har taget sovemedicin.
- er i eller har været i behandling med medicin mod depression (MAO-hæmmere) inden for de sidste 14 dage.

Vær ekstra forsigtig med at tage Vilan, hvis du har:

- forhøjet tryk i hjernen på grund af slag i hovedet eller af anden årsag har stærk hovedpine og opkastninger.
- tendens til at blive svimmel og besvime på grund af for lavt blodtryk.

- galdevejssygdomme.
- betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.
- alvorlige lever- og nyresygdomme.
- tarmsygdomme med betændelse og nedsat tarmpassage.
- for lavt stofskifte (myxødem).
- forstørret blærehalskirtel.
- nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom).
- epilepsi, da Vilan øger risikoen for anfald.

Tal med lægen, hvis du er afhængig af smertestillende medicin (opioider).

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Vilan, og at virkningen af Vilan kan være nedsat efter lang tids brug.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vilan. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt vitaminer og mineraler.

Tal med lægen, hvis du tager:

- anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (morphin-agonister/antagonister som buprenorphin, nalbuphin, pentazocin), da det nedsætter den smertestillende virkning af Vilan.
- beroligende midler.
- narkosemidler.
- sovemedicin.
- muskelafslappende medicin.
- blodtryksnedsættende medicin.
- medicin mod for meget mavesyre (cimetidin), da det kan øge virkning af Vilan.
- medicin mod depression (MAO-hæmmere, clomipramin, amitriptylin).
- medicin mod infektion (rifampicin). Kontakt lægen. Det er nødvendigt at ændre dosis.

Du må ikke tage Vilan sammen med alkohol, da det forstærker Vilans virkning.

Brug af Vilan sammen med mad og drikke

Du kan tage Vilan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Vilan sammen med et glas vand.

Du må ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Vilan.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Vilan efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Vilan, da Vilan går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Vilan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis virker sløvende. Det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vilan

Vilan tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VILAN

Tag altid Vilan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

2-6 tabletter (dvs. 10-30 mg) hver 4.-6. time eller efter behov.

Hvis du har taget for mange Vilan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få meget små pupiller, svækket vejrtrækning, svimmelhed pga. for lavt blodtryk, hurtig puls, nedsat kropstemperatur, slappe arme og ben og hos børn kramper. Ved alvorlig overdosering kan du få kredsløbssvigt og dyb koma.

Hvis du har glemt at tage Vilan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Vilan

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Vilan. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Vilan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk/anafylaktoide reaktioner som kan være livsfarlige). Ring 112.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet på grund af vand i lungerne, selvom du ikke tidligere har haft hjertelidelse.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Døsighed.
- Små pupiller.
- Kvalme, opkastning, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Hallucinationer. Kan være alvorlig. Kontakt evt. læge eller skadestue.

- Hjerterbanken.
- Kraftig sveden, svimmelhed, hovedpine.
- Ansigtsrødme.
- Humørsvingninger, forvirring.
- Mundtørhed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Fald og stigning i blodtrykket. Tal med lægen.
- Kraftsløshed og svaghed, besvimelse og hjertesvigt med åndenød og brystmerter. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
- Afhængighed af smertestillende medicin. Kan være alvorlig. Tal med lægen.
- Rykvis ufrivillige øjenbevægelser, dobbeltsyn, sløret syn.
- Astmaanfald, hvis du har astma.
- Nældefeber, kløe.
- Årebetændelse.
- Kulderystelser.
- Hævede fødder, ankler og hænder, som forsvinder ved behandlingsophør.
- Søvnløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU VILAN

Opbevares utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Vilan ved almindelig temperatur.

Tag ikke Vilan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vilan 5 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: nicomorphinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat, gelatine, mikrokrySTALLINSK cellulose, magnesiumstearat.

Vilans udseende og pakningsstørrelse

Vilan 5 mg er hvide, runde, bikonvekse tabletter uden delekærv.
Pakningen indeholder 10, 50 eller 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Østrig

Repræsentant

Nordic Drugs Danmark, Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv., 1850 Frederiksberg C

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2012