

Aquacycline® Vet.

180 mg/ml

KVALITATIV OG KVANTITATIV ANGIVELSE AF AKTIVE INDHOLDSTOFFER

1 ml indeholder: Oxytetracyclin dihydrat 112 mg og Oxytetracyclinhydrochlorid
72 mg svarende til 180 mg Oxytetracyclinhydrochlorid, Methylparahydroxybenzoat (E 218) 1 mg.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Ceva Santé Animale - 10, av. de la Ballastière - 33500 Libourne - Frankrig

ANVENDELSESOMRÅDE

Mod infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier.

KONTRAINDIKATIONER

Overfølsomhed over for oxytetracyclin. Nedsat nyre- eller leverfunktion.

BIVIRKNINGER

Gastrointestinale bivirkninger kan forekomme. Kredsløbsskollaps kan forekomme ved hurtig intravenøs administration. Dette kan forhindres ved langsom infusion af oxytetracyclin (> 5 min.) eller forbehandling med intravenøs calciumgluconat. Kan give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Hvis der iagttages alvorlige bivirkninger, skal den ordinerende dyrlæge orienteres. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemedelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemedelstyrelsens netsted.

SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER ELLER ADVARSLER

Tetracycliner bør kun med forsigtighed anvendes til dyr med nedsat nyre- eller leverfunktion. Undgå overdosering til dyr med lever- eller nyreinsufficiens. Ved anvendelse af bredspektrede antibiotika - som tetracycliner - er der altid risiko for superinfektion. Da tetracycliner interfererer med proteinsyntese i både bakterier og værtsceller; kan en forøgelse af blod-urin-kvælstof (BUN) forventes. Vægttab, især i anoretiske dyr, kan forekomme ved samtidig behandling med tetracyclin og glucocortikoider. Bemærk antagonisme over for antibiotika/kemoterapeutika med overvejende baktericid effekt f.eks. penicilliner, cefalosporiner og aminoglykosider

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆGT

Indsprøjtes intravenøst (i.v.) til kvæg eller intramuskulært (i.m.) til kvæg, svin og får. Ved injektion med Aquacycline Vet. 180 mg/ml og lignende produkter kan optræde vævsbeskadigelse. Da størrelsen af disse beskadigelser er afhængig af det injicerede volumen, er det vigtigt, at den fastsatte volumenbegrænsning respekteres, og at der tilstræbes et så lille volumen pr. injektionssted som muligt.

DYREARTER

Kvæg, svin, får.

DOSERING

Kvæg, svin, får: 5-10 mg pr. kg legemsvægt (1 ml pr. 18-36 kg legemsvægt).

Maksimalt 13 ml pr. injektion.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

BRUG UNDER DRÆGTIGHED OG LAKTATION

Kan anvendes.

TILBAGEHOLDELSESTIDER

For mælk efter i.v. og i.m. injektion:	3 døgn
Slagtning efter i.m. administration: Kvæg:	15 døgn
Svin og får:	14 døgn
Slagtning efter i.v. administration: Kvæg:	6 døgn

OPBEVARING

Ved 2 - 8°C. Opbevaringstid efter anbrud: 14 dage.

Opbevares utilgængeligt for børn.

FORHOLDSREGLER FOR BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE PRODUKTER ELLER AFFALD

Kan indleveres på apotek eller til kommunal modtageordning.

REVISION AF INDLÆGSSEDDEL

11/2021

61-i-DK-05/01.2004