

AKTIVT INDHOLD

1 ml indeholder:
101,2 mg Tiamulin svarende til 125 mg Tiamulin
hydrogenfumarat
15 mg benzylalkohol
Klar, farveløs til lysegul opløsning.

INDIKATIONER

Kyllinger og kalkuner:

Behandling og forebyggelse af kroniske
respirationsvejslidelser, forårsaget af tiamulinfølsomme
stammer: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
meleagris.

Svin:

Behandling af smitsom lungebetændelse forårsaget
af tiamulinfølsomme stammer: Mycoplasma
hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis.
Behandling af blodig tarmbetændelse forårsaget af
eller kompliceret af tiamulinfølsomme stammer:
Brachyspira hyodysenteriae.

KONTRAINDIKATIONER

Præparatet må ikke anvendes sammen med
monensin, salinomycin og narasin eller andre
monovalente ionophor antibiotika
7 dage før, under og 7 dage efter behandling af dyr.

BIVIRKNINGER

I sjældne tilfælde er der efter oral behandling
observeret overfølsomhed overfor tiamulin,
bestående af akut hudbetændelse med rødme
og intens kløe. Bivirkningerne er oftest milde
og forbigående, men kan i sjældne tilfælde være
alvorlige. Hvis denne type bivirkninger iagttages,
stoppes behandlingen omgående og både dyrene og
stien vaskes med vand.

Normalt vil dyrene herefter hurtigt bedres.
Symptomatisk behandling som f.eks. elektrolyt
behandling og antiinflammatorisk behandling kan
være gavnlig.

Hvis der iagttages alvorlige bivirkninger, skal den
ordinerende dyrlæge orienteres.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til
Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan
blive bedre.

Dyrets ejer kan også selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De/du finder skema og vejledning under
Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

DYREARTER: Kyllinger, kalkuner og svin.

DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE

Oral anvendelse.

Kyllinger og kalkuner: 20 mg tiamulinbase pr.
kg legemsvægt pr. dag (svarende til 24,7 mg
tiamulinhydrogenfumarat/kg legemsvægt/dag), ved
oral indgivelse via drikkevand, svarende til 19,75 ml
opløsning pr. 100 kg legemsvægt pr. dag i 3-5 dage,
afhængig af graden af sygdom.

Svin: 6,48-8,1 mg tiamulinbase pr. kg legemsvægt pr.
dag (svarende til 8 til 10 mg tiamulinhydrogenfumarat/
kg legemsvægt/dag), i 5 dage ved oral indgivelse via
drikkevand, svarende til 6,40 til 8 ml opløsning pr.
100 kg legemsvægt pr. dag i 5 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet
anden anvendelse eller dosering end angivet
i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og
oplysningerne på doseringsetiketten.

TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning:

Svin: 6 dage

Kyllinger: 6 dage

Kalkuner: 6 dage

Æg: 0 dage

SÆRLIGE

OPBEVARINGSFORHOLD

Ubrugt produkt kasseres 3 måneder efter anbrud.

Ubrugt produkt kasseres 24 timer efter fortynding
i drikkevand.

Veterinærlægemidlet bør ikke anvendes efter den
angivne udløbsdato.

Ingen særlige opbevaringsforhold.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Vnr 06 70 34

TIAMVET

oral opløsning
Tiamulin hydrogenfumarat
125 mg/ml

5 liter



SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anvendelse af produktet bør baseres på
resistensundersøgelse.

Strategisk behandling bør begrænses til
dyr i besætninger, hvor tiamulinfølsomme
patogener er isoleret. Længerevarende eller
gentagen anvendelse bør undgås via forbedring
af management samt grundig rengøring og
desinfektion.

Anvendelsen af dette præparat til drægtige
eller diegivende søer er ikke undersøgt. Bør
kun anvendes i overensstemmelse med den
ordinerende dyrlæges vurdering.

Uforligelighed med bestemte ionophor antibiotika
(se Kontraindikationer) kan forekomme.
Symptomer på forgiftning, som f.eks.
vækstnedsættelse, paralysse og død er mulige ved
samtidig administrering.

Særlige forsigtighedsregler for personer,
der administrerer lægemidlet

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af
kontakt, vask grundigt med vand og søg om
nødvendigt læge.

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse
af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres
til apotek/leverandør eller til kommunal
modtageordning.

ØVRIGE INFORMATIONER

Information til dyrlægen

Farmakologiske egenskaber.

Tiamulin er et semisyntetisk derivat af
et antibiotikum tilhørende klassen af
pleuromutiliner.

Tiamulin er et bakteriostatisk antibiotikum
og virker ved at inhibere proteinsyntesen ved
reversibel binding til 50S ribosom subunit.

Tiamulin er aktivt over for Brachyspira
(Brachyspira hyodysenteriaa, Brachyspira
pilosicoli), Mycoplasmer (Mycoplasma

hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis,
Mycoplasma Gallisepticum, Mycoplasma
synoviae), Lawsonia intracellularis, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Clostridium perfringens.
Resistensmekanismen er kromosomal. Udvikling
af resistens sker langsomt og progressivt.
Der er ingen krydsresistens til makrolider eller
relaterede substanser.

MT nr. 39138

Til dyr - kræver recept.

INDEHAVER AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSE:

Ceva Santé Animale - Libourne - Frankrig

FREMSTILLER:

Ceva Santé Animale - ZI Très le Bois
22600 Loudéac - Frankrig

