

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Risperidon HEXAL 0,5 mg filmovertrukne tabletter

Risperidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Risperidon HEXAL til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Risperidon HEXAL
3. Sådan skal du tage Risperidon HEXAL
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Risperidon HEXAL tilhører den gruppe medicin, der kaldes antipsykotika.

Risperidon HEXAL anvendes til behandling af følgende:

- Skizofreni, en tilstand, hvor du ser, hører eller føler ting, som ikke er der i virkeligheden, tror ting, der ikke er sande, eller føler dig overdreven mistænksom eller forvirret.
- Mani, en tilstand, hvor du føler sig meget urolig, opstemt, oprevet, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i en sygdom, der hedder bipolar lidelse.
- Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos mennesker med Alzheimers demens, der gør skade på sig selv eller andre. Alternative behandlinger (uden lægemidler) bør have været afprøvet forud.
- Kortvarig behandling (op til 6 uger) af vedvarende aggression hos børn med indlæringsvanskeligheder (mindst 5 år gamle) og unge med adfærdsvanskeligheder.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE RISPERIDON HEXAL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Risperidon HEXAL

- Hvis du er overfølsom (allergisk) over for risperidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Risperidon HEXAL (anført i pkt. 6 nedenfor).

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon HEXAL, hvis du ikke er sikker på, om ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Vær ekstra forsigtig med at tage Risperidon HEXAL

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon HEXAL, hvis et eller flere af følgende gælder for dig:

- Hvis du har hjerteproblemer. Det gælder f.eks. uregelmæssig hjerterytme, eller hvis du har tendens til lavt blodtryk eller tager blodtryksmedicin. Risperidon HEXAL kan forårsage lavt blodtryk. Dosis skal muligvis justeres.

- Hvis du kender til nogle faktorer, som kan gøre dig disponeret for slagtilfælde, f.eks. forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme eller problemer med tilstoppede blodkar i hjernen.
- Hvis du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
- Hvis du har Parkinsons sygdom eller demens
- Hvis du har sukkersyge (diabetes)
- Hvis du har epilepsi
- Hvis du har oplevet at have en langvarig eller smertefuld rejsning. Hvis du oplever dette, mens du tager Risperidon HEXAL, skal du straks kontakte lægen
- Hvis du har vanskeligt ved at kontrollere legemstemperaturen eller får hedeure
- Hvis du har nyreproblemer
- Hvis du har leverproblemer
- Hvis test har vist, at du har et unormalt højt indhold af hormonet prolaktin i blodet eller, hvis du har en svulst, der muligvis er afhængig af prolaktin

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du oplever

- Ufrivillige rytmiske bevægelser af tungen, munden eller ansigtet. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med risperidon.
 - Feber, alvorlig muskelstivhed, svedudbrud eller nedsat bevidsthed (en tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom). Det kan være nødvendigt med øjeblikkelig medicinsk behandling.
- Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon HEXAL, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Risperidon HEXAL kan forårsage vægtøgning.

Ældre med demens

Der er en øget risiko for slagtilfælde hos ældre patienter med demens. Du bør ikke tage risperidon, hvis du har demens, der er forårsaget af et slagtilfælde.

Du bør jævnligt se din læge under behandling med risperidon.

Søg straks læge, hvis du eller din pårørende bemærker en pludselig ændring i din psykiske tilstand eller pludselig svaghed eller følelsesløshed i dit ansigt, arme eller ben, især i den ene side, eller sløret tale, også selv om det blot er i en kort periode. Dette kan være tegn på et slagtilfælde.

Børn og unge

Andre årsager til aggressiv opførsel skal være udelukket inden behandling af adfærdsvanskeligheder påbegyndes.

Hvis der opstår træthed under behandling med risperidon, kan en ændring i indtagelsestidspunktet mindske opmærksomhedsproblemer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept samt naturmedicin.

Det er især vigtigt at tale med lægen eller apoteket, hvis du tager et eller flere af følgende:

- Beroligende medicin, som virker i hjernen, f.eks. for at hjælpe dig med at slappe af (benzodiazepiner), eller visse smertestillende midler (opioider), midler mod allergi (nogle antihistaminer), da risperidon kan øge den sløvende effekt af disse midler.
- Medicin, som kan ændre hjertets elektriske aktivitet, f.eks. malariamidler, medicin mod forstyrrelser af hjerterytmen (f.eks. kinidin), allergimidler (antihistaminer), visse depressionsmidler (antidepressiva) eller andre lægemidler mod psykiske problemer.
- Medicin, som sænker hjerterytmen
- Medicin, som kan medføre lavt indhold af kalium i blodet (f.eks. bestemte vanddrivende midler)
- Medicin mod forhøjet blodtryk. Risperidon HEXAL kan forårsage lavt blodtryk.
- Medicin mod Parkinsons sygdom, f.eks. levodopa.

- Vanddrivende midler (diuretika), som anvendes mod hjerteproblemer eller hævelser i kroppen på grund af væskeansamlinger (f.eks. furosemid eller chlorthiazid). Risperidon HEXAL indgivet alene eller sammen med furosemid kan øge risikoen for slagtilfælde eller død hos ældre med demens.

Følgende lægemidler kan nedsætte virkningen af risperidon

- Rifampicin (et middel til behandling af visse infektioner)
- Carbamazepin, fenytoin (midler mod epilepsi)
- Phenobarbital

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon.

Følgende medicin kan øge virkningen af risperidon

- Kinidin (bruges til behandling af forskellige typer af hjertesygdomme)
- Midler mod depression, såsom paroxetin, fluoxetin, tricykliske antidepressiva
- Medicin som benævnes beta-blokkere (bruges til behandling af højt blodtryk)
- Phenothiaziner (bruges f.eks. til behandling af psykoser eller til at slappe af)
- Cimetidin, ranitidin (blokerer syreproduktionen i maven)

Hvis du begynder eller ophører behandling med disse midler, skal du muligvis have en anden dosis af risperidon.

Tal med lægen eller apoteket, før du tager Risperidon HEXAL, hvis du ikke er sikker på, om nogle af ovenstående tilfælde er relevante for dig.

Brug af Risperidon HEXAL sammen med mad og drikke

Risperidon HEXAL kan tages med eller uden mad. Drik ikke alkohol, når du tager Risperidon HEXAL.

Graviditet og amning

- Tal med lægen, før du bruger Risperidon HEXAL, hvis du er gravid eller prøver at blive gravid, eller hvis du ammer. Lægen vil afgøre, om du kan tage Risperidon HEXAL.
- Rystelser, muskelstivhed og sutteproblemer er set hos nyfødte, når Risperidon HEXAL blev anvendt i de sidste tre måneder af graviditeten. Alle problemer forsvandt dog igen.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandlingen med Risperidon HEXAL kan medføre svimmelhed, træthed og synsproblemer. Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før du har talt med lægen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Risperidon HEXAL

Risperidon HEXAL indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse typer sukker, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE RISPERIDON HEXAL

Hvor meget

Til behandling af skizofreni

Voksne

- Den normale startdosis vil typisk være på 2 mg på den første dag og kan forøges til 4 mg på den anden dag.

- Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen
- De fleste opnår god effekt med daglige doser på mellem 4 til 6 mg
- Denne samlede daglige dosis kan opdeles i én eller to doser. Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

Ældre

- Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt.
- Det er muligt, at lægen øger din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt.
- Lægen vil fortælle dig, hvad der er bedst for dig.

Børn og unge

- Børn under 18 år må ikke behandles med Risperidon HEXAL for skizofreni.

Til behandling af mani

Voksne

- Startdosis er normalt 2 mg én gang dagligt.
- Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.
- De fleste opnår god effekt med 1 til 6 mg en gang dagligt.

Ældre

- Startdosis er normalt 0,5 mg to gange dagligt.
- Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist til 1-2 mg to gange dagligt, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen.

Børn

- Børn under 18 år må ikke behandles med Risperidon HEXAL for bipolar mani.

Til behandling af svær aggression hos mennesker med demens

Voksne (herunder ældre)

- Startdosis er normalt 0,25 mg to gange dagligt.
- Det er herefter muligt, at lægen vil justere din dosis gradvist alt efter, hvordan du reagerer på behandlingen.
- De fleste opnår god effekt med 0,5 mg to gange dagligt. Nogle patienter behøver 1 mg to gange dagligt.
- Behandlingsvarighed af patienter med Alzheimers demens, bør ikke være længere end 6 uger.

Til behandling af destruktiv adfærd hos børn og unge

Dosis afhænger af barnets vægt:

Til børn, som vejer under 50 kg

- Startdosis er normalt 0,25 mg én gang dagligt
- Dosis kan herefter justeres gradvist hver anden dag med 0,25 mg pr. dag
- Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,25 mg til 0,75 mg én gang dagligt

Til børn, som vejer 50 kg eller derover

- Startdosis er normalt 0,5 mg én gang dagligt
- Dosis kan herefter justere dosis gradvist hver anden dag med 0,50 mg pr. dag
- Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 0,5 mg til 1,5 mg én gang dagligt

Behandlingen af patienter med destruktiv adfærd bør ikke strække sig over mere end 6 uger.

Børn under 5 år må ikke behandles med Risperidon HEXAL for destruktiv adfærd.

Patienter med nyre- eller leverproblemer

Alle startdoser og efterfølgende doser af risperidon bør halveres uanset hvilken lidelse, der skal behandles. Øgning af dosis bør foregå langsommere hos disse patienter. Risperidon HEXAL bør bruges med forsigtighed til denne patientgruppe.

Sådan skal du tage Risperidon HEXAL

Tag altid Risperidon HEXAL nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget medicin du skal tage og hvor længe. Det afhænger af din tilstand, og er forskelligt fra person til person. Den mængde medicin, du skal tage, er forklaret i underafsnittet "Hvor meget" ovenfor.

Risperidon HEXAL er til oral brug.

Tag medicinen med et glas vand. Risperidon HEXAL kan tages sammen med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Risperidon HEXAL

- Søg straks læge. Medbring medicinpakningen.
- Du kan få symptomer som døsighed, træthed, unormale kropsbevægelser, problemer med at stå og gå, svimmelhed på grund af lavt blodtryk, unormalt hjerteslag eller krampeanfald.

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Risperidon HEXAL, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Vis dem denne indlægsseddel og/eller pakningen.

Hvis du har glemt at tage Risperidon HEXAL

- Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Kontakt lægen, hvis du glemmer at tage to eller flere doser.
- **Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på én gang) som erstatning for den glemte dosis.**

Hvis du holder op med at tage Risperidon HEXAL

Du bør ikke holde op med at tage Risperidon HEXAL, medmindre du får besked på det af lægen, da dine symptomer ellers kan vende tilbage. Hvis din læge beslutter at stoppe din behandling med Risperidon HEXAL, kan dosis nedsættes gradvist over flere dage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Risperidon HEXAL kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger:	forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter
Almindelige bivirkninger:	forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter
Ikke almindelige bivirkninger:	forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter
Sjældne bivirkninger:	forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter
Meget sjældne bivirkninger:	forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter
Bivirkninger med ukendt frekvens:	frekvensen kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data

Følgende bivirkninger kan forekomme:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter):

- Parkinsonisme. Dette er et medicinsk udtryk, som omfatter mange symptomer. Hvert symptom kan forekomme sjældnere end hos 1 ud af 10 personer. Parkinsonisme omfatter: Øgning af

spytproduktionen, stivhed i musklerne og skelettet, savlen, spjæt når arme og ben bøjes, langsomme, nedsatte eller hæmmede bevægelser, manglende ansigtsudtryk, muskelhårdhed, stivhed i nakken, muskelstivhed, små trippende fodtrin og mangel på normale armbevægelser under gang, vedvarende blinken ved slag (stimulering) af panden (en unormal refleks).

- Hovedpine, søvnproblemer.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter):

- Døsighed, træthed, rastløshed, manglende evne til at sidde stille, irritabilitet, angst, søvnighed, svimmelhed, nedsat opmærksomhed, udmattelse, søvnforstyrrelser.
- Opkastning, diarré, forstoppelse, kvalme, øget appetit, mavesmerter eller mavegener, ondt i halsen, mundtørhed.
- Vægtøgning, forhøjet legemstemperatur, nedsat appetit.
- Åndedrætsbesvær, lungebetændelse (pneumoni), influenza, luftvejsinfektion, sløret syn, tilstoppet næse, næseblod, hoste.
- Urinvejsinfektion, sengevædning.
- Muskelkramper, ufrivillige bevægelser i ansigt eller i arme og ben, ledsmerter, rygsmerter, hævelser i arme og ben, smerter i arme og ben.
- Hududslæt, rødme på huden.
- Hurtigt hjerteslag, smerter i brystet.
- Stigning i blodets indhold af hormonet prolaktin.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter, men mindre end 1 ud af 100 patienter):

- Forhøjet indtagelse af væske, problemer med at holde på afføringen, tørst, meget hård afføring, hæshed eller stemmeforstyrrelser.
- Lungebetændelse forårsaget af indånding af fødevarer, blærebetændelse, røde øjne, bihulebetændelse, virusinfektion, ørebetændelse, halsbetændelse, betændelse under huden, øjenbetændelse, maveinfektion, løbende øjne, svampeinfektion i neglene.
- Ledningsforstyrrelser i hjertet, blodtryksfald, når du rejser dig, lavt blodtryk, svimmelhed efter ændring af kroppens stilling, registrering af unormale elektriske impulser i hjertet (EKG), unormal hjerterytme, opmærksomhed på hjerteslaget, hurtigt eller langsomt hjerteslag.
- Problemer med at holde på vandet, smerter ved vandladning, hyppig vandladning.
- Forvirring, opmærksomhedsforstyrrelser, bevidsthedssvækkelse, stort søvnbehov, nervøsitet, opstemthed (mani), manglende energi og interesse.
- Stigning i blodsukker, stigning i leverenzymmer, fald i antallet af hvide blodlegemer, fald i hæmoglobin eller antallet af røde blodlegemer (blodmangel), forhøjet eosinofiltal (særlig type hvide blodlegemer), forhøjet indhold i blodet af kreatinfosfokinase, fald i antallet af blodplader (blodlegemer, som får blodet til at størkne).
- Muskelsvaghed, muskelsmerter, ørepine, nakkesmerter, hævede led, unormal holdning, stivhed i leddene, , muskel- og skeletmerter i brystet, ubehag i brystet.
- Hudlæsioner, hudlidelser, tør hud, intens hudkløe, bumser, hårtab, betændelse i huden forårsaget af mider, misfarvning af huden, fortykkelse af huden, blussen, nedsat følsomhed i huden for smerte eller berøring, olieagtig hudbetændelse.
- Manglende menstruation, seksuelle forstyrrelser, rejsningsproblemer, sædafgangsforstyrrelser, mælkeflåd, forstørrelse af brysterne hos mænd, nedsat seksualdrift, uregelmæssig menstruation, udflåd fra skeden.
- Besvimelse, gangforstyrrelser, sløvhed, nedsat appetit og deraf følgende underernæring og lav legemsvægt, utilpashed, balanceforstyrrelser, allergi, væskeansamling, taleforstyrrelser, kulderystelser, unormal koordination.
- Smertefuld lysoverfølsomhed, øget blodforsyning til øjet, hævede øjne, øjentørhed, øget tåreflåd,.
- Luftvejsforstyrrelser, tilstoppelse af lungerne, knitrende lyd i lungerne, tilstoppelse af luftvejene, talebesvær, synkebesvær, hoste med opspyt, hæs/hvæsende vejtrækning, influenzalignende sygdom, blokerede bihuler.
- Manglende reaktion på stimulation, bevidstløshed, pludselig hævelse af løber og øjne samt åndedrætsbesvær, pludselig svaghed eller følelsesløshed i ansigt, arme eller ben, især i den ene

side, eller tilfælde af sløret tale, som varer mindre end 24 timer (mindre slagtilfælde eller slagtilfælde), ufrivillige bevægelser af ansigt, arme og ben, ringen for ørerne, hævelse i ansigtet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter):

- Manglende evne til at opnå orgasme, menstruationsforstyrrelser.
- Skæl.
- Lægemiddelallergi, kulde i arme og ben, hævede læber, betændelse i læberne.
- Grøn stær, nedsat synsstyrke, skorper på øjenlåg, øjenrulning.
- Mangel på følelser.
- Bevidsthedsændringer med forhøjet legemstemperatur og muskeltrækninger, hævelser overalt i kroppen, seponeringssyndrom (som optræder, når man holder op med at tage et lægemiddel), nedsat legemstemperatur.
- Hurtigt overfladisk åndedræt, åndedrætsbesvær under søvn, kronisk mellemørebetændelse.
- Tilstopning af tarmene.
- Nedsat blodforsyning til hjernen.
- Fald i antallet af hvide blodlegemer, utilstrækkelig produktion af det hormon, som styrer urinudskillelsen.
- Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rhabdomyolyse), bevægelsesforstyrrelser.
- Koma på grund af ukontrolleret diabetes.
- Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot).
- Betændelse i bugspytkirtlen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Livstruende komplikationer ved ukontrolleret diabetes.

Bivirkninger med ukendt frekvens (frekvensen kan ikke bestemmes ud fra de foreliggende data):

- Svær allergisk reaktion, som medfører åndedrætsbesvær og shock.
- Ingen granulocytter (en form for hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner).
- Langvarig og smertefuld rejsning.
- Indtagelse af sundhedsskadelige mængder væske.
- Blodpropper i venerne, særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsnes og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.

Risperidon injektion

Nedenstående bivirkninger er set ved brug af risperidon injektion, et langtidsvirkende middel, som indgives ved injektion. Tal med lægen, hvis du får en eller flere af nedenstående bivirkninger, selv om du ikke bliver behandlet med langtidsvirkende injektioner med risperidon.

- Tarminfektion.
- Byld under huden, prikken eller følelsesløshed i huden, betændelse i huden.
- Fald i antallet af hvide blodlegemer, der bekæmper bakterieinfektioner.
- Depression.
- Kramper.
- Blinken med øjnene.
- Fornemmelse af, at alt kører rundt, eller at du svajer.
- Langsomt hjerteslag, højt blodtryk.
- Tandpine, krampe i tungen.
- Smerter i endeballen.
- Vægttab.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Risperidon HEXAL efter den udløbsdato, der står på pakningen, på blisterne og på HDPE-beholderens etiket. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Ingen særlige opbevaringsforhold.

HDPE-beholder: Efter åbning er holdbarheden 6 måneder. Tag ikke resterende Risperidon HEXAL efter denne dato.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Risperidon HEXAL indeholder:

Aktivt stof: risperidon.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,5 mg risperidon.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; croscarmellose natriu; lactosemonohydrat; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri.

Tabletovertræk: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; hypromellose; stearinsyre; rød jernoxid (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er røde og ovale med delekærv.

De kan deles i to lige store dele.

Risperidon HEXAL kan fås i blisterpakninger med 6, 10, 20, 30, 50, 60 eller 100 filmovertrukne tabletter og i HDPE-beholdere, som indeholder 500 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 23. juni 2010