



**DK**

#### INDLÆGSSEDEL:

**Rivalgin® vet., 500 mg/ml, injektionsvæske, opløsning**

Se den nyeste indlægsseddel på:

[www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Østrig

#### Repræsentant:

Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding

### 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Rivalgin® vet., 500 mg/ml, injektionsvæske, opløsning

Metamizolnatriummonohydrat

### 3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSTOFFER

1 ml indeholder:

#### Aktivt stof:

Metamizolnatriummonohydrat 500 mg  
(svarende til metamizol 443,1 mg)

#### Hjælpstoff:

Benzylalkohol (E1519) 30 mg

Klar, gullig opløsning stort set fri for partikelformigt materiale.

### 4. INDIKATIONER

Sygdomme hos heste, kvæg, svin og hunde, hvor der kan forventes en positiv effekt af den centrale analgetiske, spasmolytiske, antipyretiske eller antiinflammatoriske virkning af lægemidlet, såsom:

Generel smertelindring til suppression af nervøsitet og defensiva reaktioner forårsaget af smerte.

Dæmpning af smerter ved koliktilstande af forskellig oprindelse eller spastiske tilstande i de indre organer hos heste og kvæg. Okklusion af øsofagus med fremmedlegemer hos heste, kvæg og svin.

Febersygdomme, såsom svær mastitis, MMA-syndrom, svineinfluenza.

Lumbago, tetanus (i kombination med tetanus-antiserum).

Akut og kronisk arthrit, reumatiske tilstande i muskler og led, nerveinflammation, neuralgi, tendovaginitis.

### 5. KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til katte.

Lægemidlet bør ikke anvendes til dyr med hæmatopoietiske forstyrrelser.

Bør ikke administreres subkutant på grund af mulig lokal irriteration.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes i tilfælde af hjerte-, lever- eller nyresvigt eller ulceration i mave-tarm-kanalen.

### 6. BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

### 7. DYREARTER

Heste, kvæg, svin, hunde.

### 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSMÅDE OG INDGIVELSEVEJ(E)

Heste: Langsom intravenøs anvendelse.

Kvæg, svin, hunde: Langsom intravenøs anvendelse (ved akutte tilstande) eller dyb intramuskulær anvendelse.

Heste: 20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (4-10 ml præparat/100 kg kropsvægt)

Kvæg: 20-40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (4-8 ml præparat/100 kg kropsvægt)

Svin: 15-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (3-10 ml præparat/100 kg kropsvægt)

Hunde: 20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (0,4-1 ml præparat/10 kg kropsvægt)

Ved anvendelse intramuskulært til kvæg bør det maksimale volumen, der administreres på ét sted, ikke overstige 29 ml. Hvis der administreres mere end 20 ml til svin, skal det fordeles mellem mindst to injektionssteder.

Gummiproppen kan maksimalt punkteres 25 gange. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

### 9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Se punkt 8.

### 10. TILBAGEHOLDESESTID

Heste: Slagtning (intravenøs administration): 5 dage

Kvæg: Slagtning: 12 dage

Mælk: 48 timer

Svin: Slagtning: 12 dage

Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

### 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og den ydre emballage efter "EXP". Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage:

28 dage.

### 12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart:

Ingen.

#### Særlige forsigtighedsregler for dyret:

På grund af risikoen for anafylaktisk shock skal metamizolindeholdende opløsninger administreres langsomt, når de gives intravenøst.

Undgå samtidig administration med potentielt nefrotoksiske lægemidler.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som administrerer lægemidlet:

Ved overfølsomhed over for metamizol bør kontakt med lægemidlet undgås. Undgå brug af lægemidlet, hvis du ved, du er følsom over for pyrazoloner eller over for acetylsalicylsyre. Gravide og ammende kvinder skal håndtere dette lægemiddel med forsigtighed.

Dette lægemiddel kan være irriterende for hud og øjne. Undgå kontakt med hud og øjne. Afvask straks eventuelle sprøjt på huden eller i øjnene med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis irriterationen varer ved.

Metamizol kan forårsage reversibel, men potentielt alvorlig agranulocytose. Vær omhyggelig med at undgå selvinjektion. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Vask hænder efter brug.

#### Anvendelse under drægtighed og laktation:

Kan anvendes under drægtighed og laktation.

#### Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Phenobarbital og andre barbiturater samt glutethimid eller phenylbutazon kan accelerere udskillelsen af metamizol som følge af hepatisk mikrosomal enzyminduktion.

Samtidig brug af phenothiazinderivater kan føre til svær hypotermi.

#### Overdosis:

Der er rapporteret virkninger på centralnervesystemet, såsom sedation og kramper, hos alle dyrearter, som lægemidlet er beregnet til, ved doser fra 1000 til 4000 mg/kg kropsvægt.

I tilfælde af overdosering følges standardprocedurerne, og diazepam administreres om nødvendigt intravenøst til kontrol af kramperne.

#### Uforlideligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforlideligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

### 13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

### 14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLER

01. april 2023

### 15. ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.

## NO

#### PAKNINGSVEDLEGG:

**Rivalgin® vet. 500 mg/ml injektionsvæske, opløsning**

### 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLTELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Østerrike

### 2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Rivalgin® vet. 500 mg/ml injektionsvæske, oppløsning

metamizolnatriummonohydrat

### 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

1 ml inneholder:

#### Virkestoff:

Metamizolnatriummonohydrat 500 mg

(tilsvarende metamizol 443,1 mg)

#### Hjelpetoffer:

Benzylalkohol (E1519) 30 mg

Klar, gulaktig oppløsning, hovedsakelig uten partikler.

### 4. INDIKASJON(ER)

Sykdommer hos hest, storfe, gris og hund hvor det kan forventes en positiv effekt av de sentralt smertelindrende, spasmolytiske, antipyretiske eller mildt antiinflammatoriske effektene av veterinærpreparatet, f.eks.:

Generell smertelindring for å undertrykke nervøsitet og forsvarsreaksjoner forårsaket av smerter.

Smertelindring ved ulike koliktilstander eller spasmer i indre organer hos hest og storfe.

Okklusjon av spiserøret med fremmedlegeme hos hest, storfe og gris.

Febertilstander som alvorlig mastitt, MMA-syndrom, svineinfluenza.

Lumbago, stivkrampe (i kombinasjon med stivkrampe-antiserum).

Akutt og kronisk artritt, revmatiske tilstander i muskler og ledd, nervebetennelse, nevrergi, tendovaginit.

### 5. KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes til katt.

Veterinærpreparat skal ikke brukes til dyr med hematopoetiske lidelser.

Skal ikke gis subkutant på grunn av mulig lokalirritasjon.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene, eller noen av hjælpestoffene.

Skal ikke brukes ved hjerte-, lever- eller nyresvikt eller gastrointestinalt sår.

### 6. BIVIRKNINGER

Ingen kjente.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

### 7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Hest, storfe, gris, hund.

### 8. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE

Hest: Langsom intravenøs administrasjon.

Storfe, gris, hund: Langsom intravenøs administrasjon (ved akutte tilstander) eller dyp intramuskulær injeksjon.

Hest: 20-50 mg metamizolnatrium-monohydrat/kg kroppsvekt (4-10 ml veterinærpreparat/100 kg kroppsvekt)

Storfe: 20-40 mg metamizolnatrium-monohydrat/kg kroppsvekt (4-8 ml veterinærpreparat/100 kg kroppsvekt)

Gris: 15-50 mg metamizolnatrium-monohydrat/kg kroppsvekt (3-10 ml veterinærpreparat/100 kg kroppsvekt)

Hund: 20-50 mg metamizolnatrium-monohydrat/kg kroppsvekt (0,4-1 ml veterinærpreparat/10 kg kroppsvekt)

Veð intramuskulær bruk hos storfe skal maksimalt 29 ml settes på ett sted. Hos gris bør injeksjonene fordeles på minst to injeksjonssteder når det skal gis mer enn 20 ml.

Gummiproppen kan punkteres maksimalt 25 ganger.

## 9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Se avsnitt 8.

## 10. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Hester: Kjøtt og innmat (intravenøs bruk): 5 dager

Storfe: Kjøtt og innmat: 12 dager

Melk: 48 timer.

Gris: Kjøtt og innmat: 12 dager

Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.

## 11. SPEIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 28 dager

## 12. SPEIELLE ADVARSLER

Spesielle advarsler for de enkelte målarter:

Ingen.

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

På grunn av faren for anafylaktisk sjokk bør metamizol-holdige oppløsninger administreres langsamt når det gis intravenøst. Unngå samtidig administrasjon med potensielt nefrotoksiske legemidler.

Spesielle forholdsregler for personen som håndterer veterinærpreparatet:

Personer med kjent hypersensitivitet overfor metamizol bør unngå kontakt med veterinærpreparatet. Unngå bruk av veterinærpreparatet hvis du er sensitiv overfor pyrazoloner eller acetylsalisylsyre. Gravide og ammende kvinner skal håndtere dette veterinærpreparatet med forsiktighet.

Dette veterinærpreparatet kan virke irriterende på hud og øyne. Unngå kontakt med hud og øyne. Søl på hud eller i øyne skylles bort øyeblikkelig med rikelige mengder vann. Søk legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

Metamizol kan forårsake reversibel, men potensielt alvorlig agranulocytose. Utvis forsiktighet for å unngå selvinjeksjon. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Vask hendene etter bruk.

Drektighet og diegiving:

Kan brukes til drektige og diegivende dyr.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Fenobarbital og andre barbiturater, samt glutetimid eller fenylbutazon, kan fremskynde utskillelsen av metamizol på grunn av hepatisk mikrosomal enzyminduksjon. Samtidig bruk av fenotiazinderivater kan føre til alvorlig hypotermi.

Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Effekter på sentralnervesystemet som sedasjon og krampeanfallet er rapportert hos alle mållartene ved doser fra 1000 til 4000 mg/kg kroppsvekt.

Ved overdosering skal standard prosedyrer følges.

Diazepam kan administreres intravenøst ved behov for å kontrollere krampeanfallet.

Uforlideligheter:

Da det ikke foreligger forlidelighetsstudier, bør dette veterinærpreparatet ikke blandes med andre veterinærpreparater.

## 13. SPEIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overensstemmelse med lokale krav.

## 14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

01.04.2023

## 15. YTTERLIGERE INFORMASJON

Pakningsstørrelser: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

For ytterligere opplysninger om dette veterinærpreparatet, ta kontakt med lokal representant for inneholder av markedsføringstillatelsen.

Salfarm Scandinavia AS

Fridtjof Nansens Plass 4

NO-0160 Oslo

Tlf: +47 902 97 102

E-post: norge@salfarm.com

**IS**

### FYLGISEÐILL:

**Rivalgin® vet. 500 mg/ml stungulyf, lausn**

### 1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi og framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt:

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austurríki

### 2. HEITI DÝRALYFS

Rivalgin® vet. 500 mg/ml stungulyf, lausn

Metamísól natriúm einhydrat

### 3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

1 ml inniheldur:

**Virk innihaldsefni:**  
Metamísól natriúm einhydrat 500 mg  
(jafngildir metamísóli 443,1 mg)

### Hjálprefni:

Bensýlalkóhól (E1519) 30 mg

Tær, gulleit lausn, nánast laus við agnir.

### 4. ÁBENDING(AR)

Sjúkdómar hjá hrossum, nautgripum, svinum og hundum þegar búast má við jákvæðum áhrifum lyfsins hvað varðar miðlæga verkjastillingu, krampaleyсандi, hitalækkandi eða væg bólgueyðandi áhrif, svo sem:

Almenn verkjastilling til þess að bæla taugaóstyrk og varnarviðbrögð vegna verkja.

Til þess að draga úr verkjum vegna kveisu eða krampa í innri líffærum hjá hrossum og nautgripum.

Stífla í vélinda vegna aðskotahlutar hjá hrossum, nautgripum og svinum.

Hitasjúkdómar á borð við verulega spenabólgu, gohita, svínaffensu.

Pursabit, stífkrampi (í tengslum við mótsermi gegn stífkrampa).

Bráð og langvinn liðagigt, gigt í vöðvum og liðum, taugabólga, taugapína, sínaskeiðarbólga.

### 5. FRÁBENDINGAR

Gefið ekki köttum.

Notið ekki lyfið handa dýrum með blóðmyndunarraskanir.

Gefið ekki undir húð vegna hugsanlegrar hættu á staðbundinni ertingu.

Gefið dýralækni viðvarandi ef vart verður einhverra aukaverkana, jafnvel hjálparefnanna.

Gefið ekki dýrum með hjarta-, lifrar- eða nýrnabilun eða sár í meltingarvegi.

### 6. AUKAVERKANIR

Engar þekktar.

Geríð dýralækni viðvart ef vart verður einhverra aukaverkana, jafnvel aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum eða ef svo virðist sem lyfið hafi ekki tilætluð áhrif.

### 7. DÝRATEGUND(IR)

Hross, nautgripir, svin, hundar.

### 8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Hross: Til hæggar notkunar í bláæð.

Nautgripir, svin, hundar: Til hæggar notkunar í bláæð (við bráðum sjúkdómum) eða djúprar notkunar í vöðva.

Hross: 20-50 mg af metamísól natriúm einhydrati/kg líkamsþyngdar (4-10 ml af lyfi/100 kg)

Nautgripir: 20-40 mg af metamísól natriúm einhydrati/kg líkamsþyngdar (4-8 ml af lyfi/100 kg)

Svin: 15-50 mg af metamísól natriúm einhydrati/kg líkamsþyngdar (3-10 ml af lyfi/100 kg)

Hundar: 20-50 mg af metamísól natriúm einhydrati/kg líkamsþyngdar (0,4-1 ml af lyfi/10 kg)

Við notkun í vöðva hjá nautgripum skal það hámarks rúmmál sem notað er á einum stað ekki vera meira en sem nemur 29 ml. Þegar svinum er gefið meira rúmmál lyfs en 20 ml skal skipta skammtinum þannig að hann sé gefinn á a.m.k. tvo inndælingarstaði.

Stinga má í gúmmítappann að hámarki 25 sinnum.

### 9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Sjá kafla 8.

### 10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Hross: Kjöt og innmatur (notkun í bláæð): 5 sólarhringar

Nautgripir: Kjöt og innmatur: 12 sólarhringar

Mjólk: 48 klukkustundir

Svin: Kjöt og innmatur: 12 sólarhringar

Dýralyfið er ekki viðurkennt til notkunar handa merum sem gefa af sér mjólk til máneldis.

### 11. GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Má ekki geyma í kæli. Má ekki frjósa.

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Geymsluþol eftir að umbúðir hafa verið rofnar: 28 sólarhringar

### 12. SÉRSTÖK VARNADARORÐ

Sérstök varnaðarorð fyrir hverja dýrategund:

Engin.

Sérstakar varúðarreglur við notkun hjá dýrum:

Vegna hættu á bráðaofnæmislosti skal gefa lausnir sem innihalda metamísól hægt þegar þær eru gefnar í bláæð.

Forðast skal samhliða gjöf með lyfjum sem geta hugsanlega valdið eiturverkunum í nýrum.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Þeir sem hafa ofnæmi fyrir metamísóli skulu forðast sneringu við dýralyfið. Forðast skal notkun lyfsins ef þekkt næmi fyrir pýrasólunum eða asetýlsalisýlsýru er fyrir hendi. Konur skulu meðhöndla lyfið af varúð á meðgöngu og við brjóstagjöf. Lyfið getur haft ertandi áhrif á húð og augu. Forðast skal sneringu við húð og augu. Ef lyfið skvettist á húð eða í augu skal skola tafarlaust með miklu magni af vatni. Leita skal lækni- saðstoðar ef ertingin er viðvarandi.

Metamísól getur valdið afturkræfu en hugsanlega alvarlegu kyrringaleyfi. Gæta skal þess að sprautu sig ekki með dýralyfinu fyrir slysi. Ef sá sem annast lyfjagjöf sprautar sig með dýralyfinu fyrir slysi skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins.

Þvo skal hendur eftir notkun.

Meðganga og mjólkurgjöf:

Dýralyfið má nota á meðgöngu og við mjólkurgjöf.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Fenóbarbítal og önnur barbitúröt, auk glútetímíðs eða fenýlbútasóns, geta hraðað á útskilnaði metamísóls vegna örvarnar ensíma í frýmýsögnum í lifur. Samhliða notkun fenótíásín afleiða getur leitt til verulega lághita.

Ofskömmtun (einkenni, bráðameðferð, móteitur):

Tilkynnt hefur verið um áhrif á miðtaugakerfi á borð við slævingu og krampa hjá öllum dýrategundum sem fá lyfið við skammta á bilinu 1.000 til 4.000 mg/kg líkamsþyngdar. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgja stöðluðum ferlum og ef á þarf að halda skal gefa diasepam í bláæð til þess að ná stjórn á flogum.

Ósamrýmanleiki:

Ekki má blanda þessu dýralyfi saman við önnur dýralyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

### 13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÖNOTAÐRA LYFJA EDA ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Farga skal ónotuðu dýralyfi eða úrgangi vegna dýralyfs í samræmi við gildandi reglur.

### 14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

1. apríl 2023.

### 15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Pakkningastærðir: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml

Ekki er víst að báðar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

Salfarm Danmark A/S

Nordager 19,

DK-6000 Kolding

Simi: 0045 75508080,

Netfang: info@salfarm.com