

## **Indlægsseddel: Information til brugeren**

### **Samarin brusepulver, enkeltdosisbeholdere**

natriumhydrogencarbonat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

Brug altid Samarin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med Samarin.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Samarin
3. Sådan skal du bruge Samarin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Samarin er et hvidt pulver, som opløses i vand og drikkes for neutralisering af for meget mavesyre. Drikkes ved sure opstød og halsbrand.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med Samarin.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Samarin**

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### **Brug ikke Samarin**

- hvis du er allergisk over for natriumhydrogencarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Samarin (angivet i afsnit 6).

#### **Advarsler og forsigtighedsregler**

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Samarin

- hvis du har nedsat hjerte- eller nyrefunktion.
- hvis du er på saltfattig kost da Samarin indeholder 639 mg natrium per dosis (4 g).

#### **Børn og unge**

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

#### **Brug af andre lægemidler sammen med Samarin**

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Samarin bør ikke indtages samtidig med andre lægemidler som indeholder tetracykliner, ketokonazol eller gabapentin. Ved kontakt med lægen fortæl derfor altid at du bruger Samarin.

### **Brug af Samarin sammen med mad og drikke**

Du kan tage Samarin i forbindelse med et måltid.

### **Graviditet og amning**

Samarin kan anvendes af gravide og i ammeperioden.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Samarin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Samarin indeholder natrium**

Dette lægemiddel indeholder 639 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brev. Dette svarer til 32 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage Samarin dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.

## **3. Sådan skal du bruge Samarin**

Brug altid Samarin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

### **Den sædvanlige dosis**

Voksne: Et brev (4 g) ved behov, dog højst 4 gange dagligt. Opløses i et glas vand og drikkes. Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter behandling med Samarin.

### **Brug til børn og unge**

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

### **Hvis du har brugt for meget Samarin**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Samarin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10 000 behandlede patienter):

- Indholdet af tartrat kan virke mildt afførende.
- Ved hjerte- eller nyreinsufficiens er der en risiko for et forhøjet koncentrationsniveau af natrium, såkaldt hypernatriæmi.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. Opbevaring**

Opbevares i original emballage, da Samarin er følsomt over for fugt.

Opbevar Samarin utilgængeligt for børn.

Brug ikke Samarin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger**

### **1 brev (4 g) Samarin indeholder:**

- Aktivt stof: Natriumhydrogencarbonat 2,13 g.  
Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumcarbonat, kaliumnatriumtartrat, kolloid vandfri silica.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Samarin Brusepulver er et hvidt pulver.

Samarin er pakket i papæsker med 6, 18 og 36 enkelt dosisbeholdere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

#### **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Orkla Care A/S

Industrigrenen 10

2635 Ishøj

Tlf.: 43 56 56 56

E-mail: [medinfo@orkla.com](mailto:medinfo@orkla.com)

#### **Fremstiller**

Orkla Care A/S

Vassingerødvej 3 - 7

3540 Lyngby

**Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2024**

### **Andre informationskilder**

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>