

INDLÆGSSEDDEL

Rimadyl Vet. 20 mg, 50 mg og 100 mg tyggetabletter

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B – 1348 Louvain-la-Neuve
Belgien

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Rimadyl Vet. 20 mg, tyggetabletter
Rimadyl Vet. 50 mg, tyggetabletter
Rimadyl Vet 100 mg, tyggetabletter

carprofen

3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Aktive stof:

1 Rimadyl Vet. tyggetablet 20 mg indeholder 20 mg carprofen
1 Rimadyl Vet. tyggetablet 50 mg indeholder 50 mg carprofen
1 Rimadyl Vet. tyggetablet 100 mg indeholder 100 mg carprofen

4. INDIKATIONER

Rimadyl tilhører gruppen non-steroid anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID).
Til behandling af smerter i knogler, led og muskler samt for smerter efter operation.
Hvis dyrlægen angivet anden anvendelse følges dyrlægens forskrift.

5. KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende dyr.
Må ikke anvendes til kat.

6. BIVIRKNINGER

Bivirkninger ved brug af NSAID-produkter omfatter opkastning, diarré, blødning i mave-tarmkanalen, appetitløshed, sløvhed samt lever- og nyrelidelser. Disse bivirkninger er sædvanligvis forbigående, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige og i få tilfælde dødelige. Risiko for opkast forøges, hvis hunden har fastet før indtagelse.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Hund

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVej

Gives i munden.

Rimadyl tyggetabletter er tilsat leversmag og tages villigt af de fleste hunde.

Normal dosis er 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. døgn.

20 mg tabletter: 1 tablet daglig pr. 5 kg hund

50 mg tabletter: 1 tablet daglig pr. 12,5 kg hund

100 mg tabletter: 1 tablet daglig pr. 25 kg hund

Ved behandling i længere tid end 14 dage, bør hunden regelmæssigt undersøges af en dyrlæge.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

-

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke opbevares over 25°C.

Opbevares i original beholder.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.

Da de fleste hunde synes at Rimadyl vet tyggetabletter smager godt, bør de opbevares sikkert og udenfor hundens rækkevidde. Alvorlige bivirkninger kan opstå ved indtagelse af store doser. Ved mistanke om indtagelse af store doser Rimadyl Vet. tyggetabletter anbefales det at kontakte dyrlægen.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Anbefalet dosis bør ikke overskrides.

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse til dyr under 6 uger eller meget gamle hunde.

Man skal være særlig opmærksom ved behandling af hunde med hjerte-, lever- eller nyresygdomme samt hvis de har infektioner.

Samtidig behandling med nyretoksiske lægemidler eller andre NSAID-præparater bør undgås.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

17. december 2021