INDLÆGSSEDDEL
Baytril® vet., 25 mg/ml, oral opløsning

Navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen samt på den indehaver af virksomhedsgodkendelse, som er ansvarlig for batchfrigivelse, hvis forskellig herfra

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Tyskland

Repræsentant:
Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1.
2750 Ballerup

Veterinærlægemidlets navn
Baytril® vet., 25 mg/ml, oral opløsning.
Enrofloxacin

Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer
Aktivt stof: Enrofloxacin 25 mg/ml
Andre indholdsstoffer: kaliumhydroxid, benzylalkohol, methylhydroxypropylcellulose og renset vand.

Indikationer
Infektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme bakterier.

Kontraindikationer
Må ikke anvendes til lakterende køer, æglæggende fjerkræ og til heste.

Bivirkninger
Sjældent: mave-tarmforstyrrelser.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. www.lmst.dk

Dyrearter
Til kalve

Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej
Vær opmærksom på at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Anbefalet dosis:
Oral opløsning 25 mg/ml:
Kalve: 2,5-5 mg/kg svarende til 1-2 ml/10kg legemsvægt dagligt i 3-10 dage.

Oplysninger om korrekt anvendelse
Opløsningen blandes i mælken eller foderet eller gives direkte i munden.

Tilbageholdelsestid
Slagtning: 10 døgn

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn
Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen efter ”EXP”.

Særlige advarsler
Bør ikke anvendes til dyr med nedsat nyrefunktion.
Bør ikke anvendes til hunde med epilepsi.
Samtidig behandling med theofyllin bør undgås.

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne, om nødvendigt
Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier

Dato for seneste revision af indlægssedlen
December 2023