

**Catophos Vet 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, hest, hund og kat**

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH  
Ostlandring 13  
31303 Burgdorf  
Tyskland

Repræsentant:

Salfarm Danmark A/S  
Nordager 19  
6000 Kolding  
Tlf: +45 7550 8080  
E-mail: [info@salfarm.com](mailto:info@salfarm.com)

**2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN**

Catophos Vet 100 mg/ml + 0,05 mg/ml injektionsvæske, opløsning.

**3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER**

Hver ml indeholder:

**Aktive stoffer:**

Butafosfan: 100,00 mg  
Cyanocobalamin (B12-vitamin): 0,05 mg

**Hjælpestof:**

Benzylalkohol (E 1519), 20,00 mg

Klar, lyserød opløsning.

**4. INDIKATIONER**

Som understøttende behandling af metaboliske eller reproduktionsrelaterede lidelser, når tilskud af fosfor og cyanocobalamin er nødvendigt.

I tilfælde af metaboliske lidelser under peripartum (omkring fødslen), tetani (periodiske muskelskramper) og parese (mælkefeber) bør produktet tilføres sammen med henholdsvis magnesium og calcium.

Understøttelse af muskelfunktionen ved tilstedeværelse af mangel på fosfor og/eller cyanocobalamin.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

**6. BIVIRKNINGER**

Hos katte kan der observeres reaktioner på injektionsstedet (hævelse, ødem, erytem (rødme i huden) og induration (forhærdelse af væv ved dannelse af bindevæv)) efter subkutan injektion i det interscapulære område (mellem skulderbladene).

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

**7. DYREARTER**

Til kvæg, hest, hund og kat

**8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJE**

Kvæg og heste: Til intravenøs anvendelse

Hunde og katte: Til intravenøs, intramuskulær og subkutan anvendelse

Dyrearter / underkategori	Butafosfan (mg/kg)	B12-vitamin (mikrog/kg)	Præparat (ml/kg)	Anvendelsesmåde
Kvæg	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	i.v.
Kalve	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	i.v.
Heste	2,0 - 5,0	1,0 - 2,5	0,02 - 0,05	i.v.
Føl	3,3 - 5,6	1,65 - 2,8	0,033 - 0,056	i.v.
Hunde	2,5 - 25	1,25 - 12,5	0,025 - 0,25	i.v./i.m./s.c.
Katte	10 - 50	5,0 - 25	0,1 - 0,5	i.v./i.m./s.c.

Gentag behandlingen én gang dagligt, hvis det er nødvendigt.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE**

Proppen kan punkteres sikkert op til 40 gange. Hvis det er nødvendigt med mere end 40 anbrud, anbefales det at bruge en optrækningskanyle.

Det anbefales at bruge en pakning med 100 ml til behandling af hunde og katte.

**10. TILBAGEHOLDESESTIDER**

Kvæg og heste:

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 timer

**11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.

**12. SÆRLIGE ADVARSLER**

Særlige advarsler for hver dyreart:

Det anbefales at bestemme årsagen/årsagerne til de metaboliske eller reproduktionsrelaterede lidelser for at definere de mest hensigtsmæssige forebyggelses- og behandlingsforanstaltninger samt behovet for behandling med supplerende fosfor og B12-vitamin.

På grund af kattes mangel på glucuroniderende metaboliseringsveje, der er involveret i metabolisering af benzylalkohol, bør dette veterinærlægemiddel anvendes med forsigtighed, og den anbefalede dosis bør nøje overholdes hos denne dyreart.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Dette veterinærlægemiddel indeholder benzylalkohol, som kan medføre overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Personer med kendt overfølsomhed over for benzylalkohol bør undgå kontakt med lægemidlet.

Lægemidlet kan forårsage irritation af hud, øjne og slimhinder. Kontakt med disse områder og lægemidlet bør derfor undgås. I tilfælde af utilsigtet eksponering skylles det berørte område grundigt med vand.

Undlad at spise, drikke eller ryge under håndtering af dette lægemiddel.

Vask hænderne efter brug.

Drægtighed og laktation:

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt hos køer, hopper, tæver og kønsmodne hunkatte. Anvendelse heraf under drægtighed og laktation hos disse dyrearter bør dog ikke give anledning til særlige problemer.

Uforlideligheder:

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforlideligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

**13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

**14. DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF INDLÆGSSEDLEN**

20-11-2023

**15. ANDRE OPLYSNINGER**

Ravfarvet hætteglas af glas type II med en brombutyl-gummiprop og et aluminiumslåg.

Pakningsstørrelser:

Kartonæske med 1 hætteglas med 100 ml  
Kartonæske med 1 hætteglas med 250 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.