

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Avirox[®], creme 50 mg/g Aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Avirox til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den seneste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Avirox
3. Sådan skal du bruge Avirox
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Avirox er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus. Du kan bruge Avirox både ved første herpes udbrud og ved tilbagevendende udbrud.

Du kan bruge Avirox mod forkølelsessår på mund, læber og i ansigtet samt ved herpes på kønsorganerne.

Lægen kan have givet dig Avirox for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE AVIROX

Brug ikke Avirox, hvis:

- Du er overfølsom (allergisk) over for aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir, propylenglycol eller et af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at bruge Avirox.

- Hvis du har herpes på kønsorganerne. På grund af risiko for smittefare skal du undgå seksuel kontakt, så længe der er synlige læsioner.
- Hvis du har stærkt nedsat immunforsvar. Kontakt lægen om behandling af enhver infektion.

Undgå at få cremen i øjne, mund eller i skeden. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er uskadelig, hvis du får lidt af den i munden og synker den.

Kontakt lægen, hvis såret er eller bliver alvorligt.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Avirox sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Avirox under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Avirox.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Avirox påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Avirox

Avirox indeholder cetylalkohol, som kan give udslæt (f.eks. kontakteksem) og propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE AVIROX

Tag altid Avirox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug cremen 5 gange dagligt i 5-10 dage. Begynd behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen. Du bør altid have Avirox creme med, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning skal du undgå at berøre det angrebne område unødigt. Ved herpes på kønsorganerne bør du også undgå at have samleje eller anden intim kontakt.

Hvis du har brugt for meget Avirox

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Avirox, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Avirox.

Hvis du har glemt at bruge Avirox

Smør straks creme på og fortsæt behandlingen som hidtil.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNING

Avirox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Mild udtørring og afskalning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Forbigående svie eller brændende fornemmelse, kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Rødme i huden, kontakteksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Avirox utilgængeligt for børn.

Di kan opbevare Avirox ved almindelig temperatur.

Brug ikke Avirox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Avirox creme indeholder:

Aktivt stof: aciclovir.

Øvrige indholdsstoffer: PEG-5-glycerol-stearat, dimeticon, cetylalkohol, paraffinolie, hvid blød paraffin, propylenglycol, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvis creme

Pakningsstørrelser

Tube: 10 g, 12 g, 15 g og 20 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2011