INDLÆGSSEDDEL
MULTIMIN Vet, injektionsvæske, opløsning til kvæg

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Warburton Technology Limited
36 Fitzwilliam Square
Dublin 2
IRLAND

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

LABORATOIRES BIOVE
Rue de Lorraine
BP 45
62510 ARQUES
FRANKRIG

2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MULTIMIN Vet, injektionsvæske, opløsning til kvæg

3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver ml indeholder:

Aktive stoffer

Zink:	60 mg (svarende til zinkoxid 74,68 mg)
Mangan:	10 mg (svarende til 20,92 mg mangankarbonat)
Kobber:	15 mg (svarende til kobbercarbonat 26,09 mg)
Selen:	5 mg (svarende til 10,95 mg natriumselenit)

Hjælpestoffer
Benzylalkohol (E1519) 10,4 mg

Produktet er en klar blå opløsning til injektion

4. INDIKATIONER

Tilførsel af sporminerale for at korrigere samtidige kliniske eller subkliniske mangler ved selen, kobber, mangan og zink, som kan opstå i kritiske faser af livscyklussen for produktion eller avl.

5. KONTRAINDIKATIONER

Må ikke administreres intramuskulært.

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6. BIVIRKNINGER

Mild smerte observeres almindeligvis under injektionen og kan vedvare i op til otte timer efter injektionen.
Lokale reaktioner på injektionsstedet er meget almindelige og består af forbigående moderat til svær hævelse, der kan vare ved i ca. 7 dage og udvikler sig til induration estimeret til mindre end 5 cm ved palpation efter 14 dage.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.
Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem, Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk.

7. DYREARTER

Kvæg

8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Udelukkende til subkutan administration.

Doser:
- Kvæg - Op til 1 år: 1 ml pr. 50 kg
- Kvæg - Fra 1-2 år: 1 ml pr. 75 kg
- Kvæg - Over 2 år: 1 ml pr. 100 kg

Tidsplan for administration
Gives som en enkelt administration under eller forud for perioder med stress i livscyklussen for produktion og avl, der sandsynligvis vil resultere i samtidige kliniske eller subkliniske mangler ved de fire spormineraler (for f.eks. transport / forsendelse, kælvning, avl).

Maksimalt volumen pr. injektionssted: 7 ml

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Brug standard aseptiske procedurer under administration af injektioner.
Streng overholdelse af korrekt subkutan injektionsteknik er nødvendig.
500 ml hætteglasset kan punkteres maksimalt 90 gange.

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 28 dage
Mælk: 0 timer

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen henviser til den sidste dag i den pågældende måned.

Når beholderen anbrydes (åbnes) første gang, skal man finde frem til den opbevaringstid under brug, som er angivet i indlægssedlen, og beregne den dato, hvor eventuelt resterende produkt i kartonen skal kasseres. Denne kassationsdato skal skrives det angivne sted.

Efter første åbning af beholderen: 28 dage

12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret
Yderligere administration af kobber, zink, mangan eller selen bør ikke ske på samme tid.

Drægtighed og laktation
Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Dette lægemiddel har en HØJ koncentration af selen.
På grund af en potentiel risiko for selentoksicitet skal der udvises forsigtighed ved håndtering af lægemidlet for at undgå utilsigtet selvinjektion.
De mest almindelige manifestationer af utilsigtet eksponering for selen hos mennesker er gastrointestinale og neurologiske symptomer, såsom kvalme, opkastning, ømhed, træthed og irritabilitet.
Ved behandling af et stort antal dyr skal der anvendes et sikkert injektionssystem.
Arbejd ikke alene, når du bruger lægemidlet.
Sørg for, at dyr holdes ordentligt tilbage, også dyr som opholder sig i nærheden.
I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld SKAL DER STRAKS SØGES LÆGEHJÆLP, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
Vask hænder efter brug.

Uforligeligheder:
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

Overdosis:
Ingen systemiske bivirkninger blev observeret efter gentagen overdosering (3 på hinanden følgende daglige indgivelser) ved en til tre gange den anbefalede dosis (dvs. 3 - 9 gange den anbefalede dosis).

I en undersøgelse er gentagen overdosering (3 på hinanden følgende daglige administrationer) ved 5,6 gange den anbefalede dosis (dvs. 16,7 gange anbefalet dosis) forbundet med forhøjelse af leverenzymer og hepatisk centrilobulær nekrose hos seks dyr ud af otte med dødelighed hos ét dyr.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ubrugt veterinærlægemiddel eller affald fra sådanne veterinærlægemidler skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.
Kontakt din dyrlæge eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

10. december 2024

15. ANDRE OPLYSNINGER

Primær emballage: Flaske i klar polyethylenterephthalat (PET) lukket med grå brombutylgummiprop forseglet med aluminiumshætte (hætteglas).

Pakningsstørrelser:
Papæske med et hætteglas a 100 ml
Papæske med et hætteglas a 500 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.
Salfarm Danmark A/S
Nordager 19
6000 Kolding
Tlf. 75 50 80 80
info@salfarm.com