

INDLÆGSSEDDEL

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. Veterinærlægemidlets navn

Advantage vet. 40 mg kutanopløsning til hunde (< 4 kg)

Advantage vet. 100 mg kutanopløsning til hunde (≥ 4 - <10 kg)

Advantage vet. 250 mg kutanopløsning til hunde (≥ 10 - <25 kg)

Advantage vet. 400 mg kutanopløsning til hunde (≥ 25 kg)

2. Sammensætning

Hver dosisenhed (pipette) indeholder:

	Dosisenhed	Imidacloprid
Advantage vet. 40 mg til hunde (< 4 kg)	0,4 ml	40 mg
Advantage vet. 100 mg til hunde (≥ 4 - <10 kg)	1,0 ml	100 mg
Advantage vet. 250 mg til hunde (≥ 10 - <25 kg)	2,5 ml	250 mg
Advantage vet. 400 mg til hunde (≥ 25 kg)	4,0 ml	400 mg

Hjælpestoffer:

1,0 mg/ml butylhydroxytoluen (E321)

Klar gul til svagt brun opløsning.

3. Dyrearter

Til hund.



4. Indikationer

Til forebyggelse og bekæmpelse af loppeangreb, samt til behandling af pelslus (*Trichodectes canis*).

Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Veterinærlægemidlet kan anvendes som en del af behandlingsstrategien til kontrol af loppeallergi, hvor diagnosen er stillet af dyrlægen.

5. Kontraindikationer

Må ikke anvendes til behandling af diende hvalpe under 8 uger.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6. Særlige advarsler

Særlige advarsler:

Unødvendig brug af midler mod parasitter eller brug, der afviger fra instruktionerne i indlægssedlen, kan øge risikoen for resistens og føre til nedsat effekt. Beslutningen om at bruge veterinærlægemidlet bør baseres på konstatering af den parasitære art og belastning eller af risikoen for infektion baseret på parasittens egenskaber, for hvert enkelt dyr.

Muligheden for, at andre dyr i samme husstand kan være en kilde til gensmitte med lopper og pelslus bør overvejes, og disse bør behandles efter behov med et passende produkt.

Nye loppeangreb fra omgivelserne kan forekomme i 6 uger eller længere efter start af behandlingen. Mere end én behandling kan derfor være nødvendig afhængig af antallet af lopper i omgivelserne. For at nedsætte gensmitte fra omgivelserne anbefales det i tillæg at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel mod voksne lopper og deres udviklingsstadier i omgivelserne, især i dyrets kurv, sengetøj og hvileområder såsom tæpper og bløde møbler. For yderligere at reducere reinfestation fra miljøet, anbefales det, at alle hunde i husstanden behandles. Behandling af diegivende tæver kontrollerer loppeangreb både på moderen og hvalpene.

Effekten af veterinærlægemidlet holder også selvom dyret bliver vådt f. eks. efter svømning eller heftig regn. Genbehandling kan imidlertid blive nødvendig ved hyppig svømning eller vask, afhængig af mængden af lopper i omgivelserne. Der må dog ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen.

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:

Dette veterinærlægemiddel er kun til udvortes brug, og må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med dyrets øjne eller mund. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Dette veterinærlægemiddel indeholder benzylalkohol og kan i sjældne tilfælde forårsage hudsensibilisering eller forbigående hudreaktioner (f.eks. irritation, prikken). Personer med kendt overfølsomhed over for imidacloprid og benzylalkohol bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet. Undgå at hud, øjne eller mund kommer i kontakt med veterinærlægemidlet.

Der må ikke masseres på påføringsstedet.

Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Ved spild af veterinærlægemidlet på huden afvaskes denne med sæbe og vand.

Hvis veterinærlægemidlet kommer i øjnene ved et uheld, skylles de grundigt med vand. Hvis hud- eller øjenirritation varer ved, eller hvis veterinærlægemidlet ved et uheld synkes, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Efter påføring, må dyrene ikke kæles eller børstes før påføringsstedet er tørt.

Vask hænderne grundigt efter behandling af dyret.

Særlige forholdsregler vedrørende beskyttelse af miljøet:

Imidacloprid er toksisk for vandlevende organismer. For at undgå bivirkninger på vandlevende organismer bør behandlede hunde ikke komme i kontakt med overfladevand de første 48 timer efter behandling. Se også afsnit 'Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse'.

Andre forholdsregler:

Opløsningsmidlet i dette produkt kan forårsage pletter på visse materialer såsom læder, tekstiler, plast og polerede overflader. Lad derfor behandlingsstedet tørre, inden der bliver mulighed for kontakt med sådanne materialer.

Drægtighed og laktation:

Der er ikke set fosterskader, teratogene skader i forbindelse med drægtighed i studier med imidacloprid hos rotter og kaniner.

Undersøgelser på drægtige og diegivende tæver samt deres afkom er begrænsede. Indtil videre er der ikke tegn på at bivirkninger kan forventes hos disse dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der er ikke set interaktioner mellem dette veterinærlægemiddel i den dobbelt anbefalede dosis og følgende almindelige anvendte veterinærlægemidler: fenthion, lufenuron, milbemycin, febantel, pyrantel og praziquantel. Der er heller ikke set interaktioner i forbindelse med en bred vifte af rutinebehandlinger, herunder vaccinationer.

Overdosis:

Ingen kliniske bivirkninger blev set, hverken efter brug af enkelte doser på op til 200 mg/kg legemsvægt (5-8 gange anbefalet dosis) eller ved daglig behandling med 100 mg/kg legemsvægt i 5 på hinanden følgende dage, eller ved ugentlige behandlinger på 5 gange maximum dosis i 8 på hinanden følgende uger.

Ved overdosering, eller ved indtagelse ved at slikke på applikationsstedet, kan der i sjældne tilfælde opstå forstyrrelser af nervesystemet (så som kramper, tremor, ataxi, mydriasis, miosis, sløvhed).

Forgiftningstegn er usandsynlige hos dyr ved fejlagtig oral indtagelse. Behandlingen bør være symptomatisk under opsyn af en dyrlæge. Ingen specifik antidot kendes, men brug af aktivt kul kan lindre symptomerne.

7. Bivirkninger

Hunde:

Meget sjælden (< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):
Agitation (hyperaktivitet)
Hypersalivering ¹ (øget salivering)
Desorientering (forvirring), neurologiske tegn (f.eks. depression (sløvhed), ataxi, tremor)
Reaktion på applikationsstedet (f.eks. hårtab, kløen, rødmen af huden, hudlæsioner)

¹Kan forekomme på grund af den bitre smag, hvis hunden slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at medicinen ikke har virket. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelsen ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Til anvendelse på huden. Kun til udvortes brug.

Underdosering kan resultere i ineffektiv brug og kan fremme resistensudvikling. For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Dosering og behandlingsskema:

Den anbefalede minimumsdosis er 10 mg imidacloprid pr. kg legemsvægt (lgv), svarende til 0,1 ml/kg lgv af veterinærlægemidlet.

Hundens vægt (kg)	Anvendt pipetestørrelse	Pipettevolumen (ml)	Imidacloprid (mg/kg lgm.)
< 4 kg	Advantage vet. 40 mg til hunde	0,4	minimum 10
≥4 - <10 kg	Advantage vet. 100 mg til hunde	1,0	minimum 10
≥10 - <25 kg	Advantage vet. 250 mg til hunde	2,5	minimum 10
≥25 - <40 kg	Advantage vet. 400 mg til hunde	4,0	minimum 10
≥40 kg	Bruges en passende kombination af pipetter		minimum 10

Vælg den korrekte pipetestørrelse i henhold til hundens vægt.

Til behandling eller forebyggelse af angreb af de parasitter, dette veterinærlægemiddel er beregnet til, bør behovet for og hyppigheden af genbehandling(er) være baseret på professionel rådgivning og tage hensyn til den lokale situation og dyrets levevis.

I tilfælde af angreb med pelslus, anbefales en yderligere undersøgelse hos dyrlægen 30 dage efter behandling, da nogle dyr kræver en 2. behandling.

9. Oplysninger om korrekt administration

Tag en pipette ud af pakningen. Til hunde på 40 kg eller derover bruges en passende kombination af pipetter. Hold pipetten opret, drej og træk hættten af. Vend hættten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hættten af igen for derved at bryde forseglingen som vist i figur 1.

Hunde under 25 kg:

Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Placer spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden som vist i figur 2.

Hunde på 25 kg eller derover:

Hunden skal stå op under påføringen. Pipettens indhold påføres 3 eller 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod som vist i figur 3.


På hvert påføringssted deles pelsen indtil huden er synlig. Placer spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden.

For alle hunde:


Påfør ikke for stor mængde af opløsningen på ét sted, da opløsningen dermed kan løbe ned ad siden på hunden. Korrekt påføring vil mindske risikoen for at hunden kan slikke produktet i sig. Anvendes kun på uskadt hud. Lad ikke dyr, der lige er behandlet, slikke på hinanden.

Kun til enkeltsprogede pakninger:


Figureerne er vist nedenfor.



Figur 1



Figur 2



Figur 3

10. Tilbageholdelsestid(er)

Ikke relevant.

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel. Opbevar blisterkortet i den ydre kartonæske.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på den ydre kartonæske, blister og pipette efter Exp. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i den pågældende måned.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Dette veterinærlægemiddel må ikke udledes i vandløb, da imidacloprid kan være farligt for fisk og andre vandorganismer.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

13. Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet er ikke receptpligtigt.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

MTnr:

0,4 ml (hunde under 4 kg): 18911

1,0 ml (hunde 4-10 kg): 38494

2,5 ml (hunde 10-25 kg): 38495

4 ml (hunde på 25 kg og derover): 30478

Kartonæske indeholdende i alt 1, 2, 3, 4, eller 6 enkeltdosispipetter i blisterkort. Hver enkeltdosispipette indeholder 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, eller 4,0 ml opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen

20. maj 2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelsen og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Tyskland

Tlf: +45 78775477

PV.DNK@elancoah.com

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str.324

D-24106 Kiel

Tyskland

Lokal repræsentant:
Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1.
2750 Ballerup

17. Andre oplysninger

I videregående undersøgelser har imidacloprid, udover effekt på voksne lopper, også vist effekt på loppelarver i omgivelserne af det behandlede dyr. Larvestadier i dyrets omgivelser dør efter kontakt med det behandlede dyr.