

## Indlægsseddel: Information til brugeren

### Fucidin® 20 mg/g (2 %) salve natriumfusidat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin
3. Sådan skal du bruge Fucidin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### 1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.

Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

#### 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Brug ikke Fucidin

- hvis du er allergisk over for natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke salven omkring øjnene, da det kan irritere øjet.

#### Brug af andre lægemidler sammen med Fucidin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Du kan bruge Fucidin sammen med anden medicin.

#### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

#### Graviditet

Du må kun bruge Fucidin efter lægens anvisning.

## **Amning**

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin, men du bør dog ikke smøre det på brystet.

## **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

## **Fucidin indeholder butylhydroxytoluen, cetylalkohol og lanolin**

Indeholdt af cetylalkohol og butylhydroxytoluen E321 kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem)

Lanolin kan give lokalt hududslæt hos personer med allergi over for lanolin.

Butylhydroxytoluen E321 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.

## **3. Sådan skal du bruge Fucidin**

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

### Børn og voksne:

Påsmør salven 2-3 gange dagligt.

## **Hvis du har brugt for meget Fucidin**

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Fucidin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin.

## **Hvis du har glemt at bruge Fucidin**

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den anbefalede dosis.

## **4. Bivirkninger**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

### **Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):**

- Eksem
- Udslæt
- Kløe
- Rødmen af huden
- Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
- Irritation på påføringsstedet

### **Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):**

- Overfølsomhed
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nældefeber
- Blærer

## **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tuben efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### Fucidin indeholder:

- Aktivt stof: Natriumfusidat.
- Øvrige indholdsstoffer: Cetylalkohol, vandfrit lanolin, paraffinolie, hvid blød paraffin, butylhydroxytoluen E321 og all-*rac*- $\alpha$ -tocopherol.

### Udseende og pakningsstørrelser

Fucidin er en hvid til gullig hvid, gennemskinnelig salve. Pakningsstørrelser:

1x15 g og 2x15 g

### Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona, Sverige

### Producent

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l., Via E. Schering 21, I-20054 Segrate (MI), Italien

### Ompakket og frigivet af

UAB Actiofarma, Gaižiūnų g. 5b, LT-50129, Kaunas, Litauen

Fucidin<sup>®</sup> er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

**Denne indlægsseddel blev senest ændret  
01/2025**