Neomay

Vnr 41 02 08

Pulver til anvendelse i drikkevand/mælkeerstatning

MTnr: 54739

PAKNINGSSTØRRELSER
Poser af 100 g og 1 kg.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Dato for seneste ændring af mærkningen: 11. juni 2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

KONTAKTOPLYSNINGER
Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Laboratorios MAYMÓ, S.A.U.
Vía Augusta, 302
08017 Barcelona (Spain)

Kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
ScanVet Animal Health A/S
Kongevejen 66
DK-3480 Fredensborg
Tlf: +45 48484317

MILJØEGENSKABER
Det aktive indholdsstof neomycinsulfat er persistent i miljøet.

7 046264 102084

MAYMO

SAMMENSÆTNING
1 gram indeholder:
Aktivt stof:
500.000 IE neomycin (som neomycinsulfat).
Hvidt eller næsten hvidt pulver.

DYREARTER
Kvæg (kalv), svin (fravænnede svin og slagtesvin), høns (inklusive æglæggende høne), and, kalkun (inklusive kalkunhøns), gås, vagtel og agerhøne.

INDIKATIONER
Alle dyrearter: Til behandling af infektioner i mave-/tarmkanalen forårsaget af *E. coli* modtagelige for neomycin.

KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, aminoglykosider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Må ikke anvendes i tilfælde af tarmobstruktion.

SÆRLIGE ADVARSLER
Indtagelsen af vand med medicin kan påvirkes alt efter sygdommens alvorlighedsgrad. I tilfælde af utilstrækkelig indtagelse af vand/mælkeerstatning, bør kvæg og svin behandles parenteralt.
Særlige forholdsregler vedrørende sikker brug hos de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til:
Pulver til opløsning i vand og oral indføring. Kan ikke benyttes som pulver i sig selv.
Hvis du overvejer at anvende veterinærlægemidlet på en nyfødt kalv, skal du være særligt forsigtig, da der er konstateret øget optagelse af neomycin i tarmene hos nyfødte. Den øgede optagelse kan medføre øget risiko for oto- og nefrotoksicitet. Brug af veterinærlægemidlet på nyfødte skal være baseret på en dyrlægefaglig vurdering af forholdet mellem fordele og risici.
Brug af veterinærlægemidlet bør være baseret på test af modtagelighed over for bakterier, som er isoleret fra dyret. Hvis det ikke er muligt, skal behandlingen være baseret på lokale (regionale, produktionsniveau) epidemiologiske oplysninger om modtagelighed over for den pågældende bakterie. Officiel, national og regional antimikrobiel lovgivning skal overholdes ved brug af veterinærlægemidlet.

Brug af veterinærlægemidlet, der afviger fra anvisningerne i SPC'et, kan øge udbredelsen af de bakterier, der er resistente over for neomycin. Det kan reducere effektiviteten af behandlingen med aminoglycosider grundet risikoen for krydsresistens.
Særlige forholdsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet til dyr:
Ved overfølsomhed over for aminoglycosider bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås.
Vask hænder efter brug.
I tilfælde af utilsigtet spild på huden eller eksponering ved indånding eller indtagelse, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Hævelse i ansigt, læber eller øjne samt åndedrætsbesvær er blandt de mere alvorlige symptomer og kræver straks lægehjælp.
Drægtighed, laktation og æglæggende fugle:
Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed, laktation, diegivning og æglægning er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk-forholdet.
Laboratorieundersøgelser af dyr har ikke afsløret teratogene virkninger.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Fuld narkose og muskelafslappende medicin øger aminoglycosiders nerveblokerende virkning. Det kan medføre lammelse og apnø.
Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug i kombination med stærk diuretikum og potentielt ototoksiske eller nefrotoksiske substanser.
Overdosis:
Nefrotoksiske og/eller ototoksiske effekter kan opstå i tilfælde af utilsigtet overdosering.
Væsentlige uforligeligheder:
Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.
Der er ingen oplysninger om mulige interaktioner eller uforligeligheder for dette veterinærlægemiddel, når det administreres oralt i drikkevand, der indeholder biocider foderadditiver eller andre stoffer, der bruges i drikkevand.

BIVIRKNINGER
Ingen kendte.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at medicinen ikke har virket. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelsen ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægssedel eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk

DOSERING FOR HVER DYREART, ADMINISTRATIONSVEJE OG ADMINISTRATIONSMÅDE
Anvendelse i drikkevand/mælkeerstatning.
25.000 IE neomycin pr. kg kropsvægt pr. dag i 3 - 4 på hinanden følgende dage, svarende til 5 g af veterinærlægemidlet pr. 100 kg kropsvægt pr. dag i 3 - 4 dage.
Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

$$\frac{\text{g af veterinærlægemidlet / kg kropsvægt / dag} \times \text{gennemsnitlig kropsvægt (kg) af dyr, der skal behandles}}{\text{Gennemsnitlig daglig vand/mælkeerstatningsindtag (l) pr. dyr}} = \text{g af veterinærlægemidlet pr. l drikkevand / mælkeerstatning}$$

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

OPLYSNINGER OM KORREKT ADMINISTRATION
For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Det anbefales at anvende passende kalibreret måleudstyr.
Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen af neomycin i overensstemmelse hermed.
Den maksimale opløsning for pulveret er 255.000 IE neomycin/ml (510 g veterinærlægemidlet/l) vand.
Ved brug af veterinærlægemidlet kan der benyttes almindeligt tilgængelige doseringspumper.

TILBAGEHOLDELSESTIDER
Kvæg (kalv): Slagtning: 14 dage.
Svin (fravænnede svin og slagtesvin): Slagtning: 3 dage.
Høns (inklusive æglæggende høne), and, kalkun (inklusive kalkunhøns), gås, vagtel og agerhøne. Slagtning: 14 dage.
Æg: 0 dage.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER
Opbevares utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel.
Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 6 måneder.
Opbevaringstid efter fortynding i drikkevand ifølge anvisning: 24 timer.
Opbevaringstid efter fortynding i mælkeerstatning ifølge anvisning: Anvendes straks.
Efter åbning anvendes veterinærlægemidlet inden:

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.
Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.
Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER
Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

Lot
Exp.

DK2006

1 Kg

KUN TIL DYR

MAYMO

+505.
+310.
15.mm
6.
7,5 7,5 111,25mm 237,5mm 111,25mm 7,5 7,5 15mm