

FORTEKOR® Vet. med smag 5mg

benazepril. hydrochlorid.

FORTEKOR® Vet. med smag 20mg

benazepril. hydrochlorid.



NOVARTIS
ANIMAL HEALTH
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Healthcare A/S
Animal Health
Lyngbyvej 172
DK-2100 København Ø

Fremstiller:

Novartis Santé Animale S.A.S.
Usine de Huningue
26, rue de la Chapelle
F-68332 Huningue Cedex

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Benazepril hydrochlorid 5 mg/20 mg

INDIKATIONER

Hjertelidelser hos hund.

KONTRAINDIKATIONER

For lavt blodtryk, forsnævring af aorta eller lungearterien.

BIVIRKNINGER

Et mindre antal hunde kan udvise forbigående tegn på træthed eller svimmelhed.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemedelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemedelstyrelsens netsted <http://www.laegemedelstyrelsen.dk>**DYREARTER**

Hund

DOSERING

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Den anbefalede mindstedosering er 0,25 mg/kg legemsvægt i henhold til følgende skema:

Vægt	Fortekor 5 mg	Fortekor 20 mg
5 – 10 kg	½ tablet	
11 - 20 kg	1 tablet	
21 - 40 kg		½ tablet
41 - 80 kg		1 tablet

Fortekor Vet. med smag skal gives en gang dagligt. Tabletten kan gives med eller uden foder.

Dosis kan fordobles, stadigt givet en gang dagligt, hvis det anbefales af dyrlægen.

SÆRLIGE ADVARSLER

Tal med dyrlægen, hvis hunden har nedsat nyrefunktion.

Drægtighed og diegivning

Fortekor Vet. med smag bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver og avlshanner.

Interaktioner

Behandlingseffekten kan påvirkes, hvis Fortekor Vet. med smag gives samtidig med visse andre lægemid-

ler (f.eks. kaliumbesparende diuretika). Fortæl dyrlægen, hvis hunden er i behandling med anden medicin.

OPBEVARING

Halve tabletter bør opbevares i blisterkortet i kartonen og bør anvendes inden 24 timer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller kommunal modtageordning.

DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF INDLÆGSSEDLEN.

Juni 2007

ANDRE OPLYSNINGER

For oplysninger om dette produkt kontakt venligst Novartis Healthcare A/S på ovenstående adresse.

