



## 101255-8

[illegible]



Symptomer på overdosering kan være døsighed, sløret tale, lavt blodtryk, forvirring, kramper, usikre bevægelser, svækket vejtrækning og tab af bevidsthed evt. dyb bevidstløshed.

**Hvis du har glemt at tage Alprox**

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, medmindre det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

**Hvis du holder op med at tage Alprox**

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Hvis du pludselig holder op med at tage Alprox, kan du få abstinenser. Symptomerne kan være:

- Hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd (se også "Bivirkninger").

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som **Alprox** dæmpede, kan blive forstærkede, når du holder op med at tage medicinen.

Din læge vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage **Alprox**.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

**4. BIVIRKNINGER**

Alprox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger:**

**Meget almindelige bivirkninger** (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Følelse af uvirkelighed i forhold til omverdenen. Kontakt læge.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Gulsot (gulfarvning af hud og det hvide i øjnene). Kontakt læge.

**Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svækket vejtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.
- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Almen sløghed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
- Følelse af uvirkelighed i forhold til sig selv. Kontakt læge.

**Ikke alvorlige bivirkninger**

**Meget almindelige bivirkninger** (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Smerter i brystet.
- Døsighed, svimmelhed.
- Unormale, usikre bevægelser.
- Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Hovedpine, nedsat hukommelse, svækket indlæring og opmærksomhed.
- Taleforstyrrelser, sløret tale.
- Sløret syn.
- Næsetilstopning.
- Nedsat spytdannelse.
- Forstoppelse.
- Mavebesvær som kvalme, opkastning, diaré.
- Vandladningsbesvær.
- Øget sveden.
- Udslæt.
- Udmattethed, træthed, irritabel adfærd.
- Vægtøgning eller vægttab.
- Menstruationsforstyrrelser.
- Søvnløshed, angst, nedsat seksuel aktivitet eller formåen, forvirring
- Øget appetit eller nedsat appetit.

**Almindelige bivirkninger** (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Besvimelse.
- Rokkende, vridende bevægelser især med benene.
- Abstinenser ved ophør af behandlingen, som rastløs uro, drømmeforstyrrelser, frygt, nervøsitet, impulsivitet, snakkesalighed. Tal med lægen.
- Rysten.
- Muskeltrækninger, muskelspændinger, muskelkramper, muskelstivhed.

- Susen for ørerne (tinnitus).
- Hurtig vejtrækning.
- Betændelse i næse, bihuler, svælg og hals med hoste, snue og feber.
- Allergiske hudreaktioner.
- Ufrivillig vandladning.
- Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
- Svaghed, varmefølelse.
- Hævede fødder, ankler og hænder.
- Øget sexlyst.
- Øget spytdannelse.

**Ikke almindelige bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hæmmet tankevirksomhed, manglende initiativ, langsomme bevægelser. Kontakt læge. Kan være tegn på depression (selvmordsrisiko).
- Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Hukommelsestab.
- Øget følsomhed over for smerte og berøring.
- Ufrivillige bevægelser af kroppen.
- Appetitløshed.
- Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.
- Koncentrationsbesvær.
- Vanskelighed med at holde balancen
- Dobbeltsyn.

**Sjældne bivirkninger** (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Rastløshed, ophidselse, irritabel adfærd, truende evt. voldelig adfærd, vrangforestillinger, mareridt, hallucinationer, sindssygdom, upassende opførsel og en fornemmelse af ændringer i omverdenen. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
- Øget slimdannelse i bronkierne.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.

**Hyppigheden er ikke kendt:**

- Tilvænning til medicinen.

Tal med læge eller apoteket, hvis en bivirkning generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

**5. SÅDAN OPBEVARER DU ALPROX**

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevar ikke Alprox ved temperaturer over 25 °C. Opbevar Alprox i original emballage. Tag ikke Alprox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

**Alprox 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg tabletter indeholder:**

Aktivt stof: alprazolam.  
Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, gelatine, magnesiumstearat.

**Alproxs udseende og pakningsstørrelser**

**Udseende**

Alprox er runde og hvide tabletter med delekærv.

**Pakningsstørrelser**

Alprox 0,25 mg, 0,50 mg og 1,0 mg fås i pakningsstørrelser på 20, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:**

Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI 02200 Espoo  
Finland

**Repræsentant for Danmark:**

Orion Pharma A/S  
Møllevej 9  
2990 Nivå  
Tlf. 4912 6600  
[opdk@orionpharma.com](mailto:opdk@orionpharma.com)

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2007**