

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

**SÆRLIGE ADVARSLER:** Særlige forsigtighedsregler for dyret: Øjnene skal beskyttes, såfremt der sprayes i nærheden af ansigtet. Det angrebne område renses omhyggeligt for sprayning. Efter administration på klov/hoven skal dyret holdes på tørt underlag i mindst én time. Brug af produktet bør ske på baggrund af en følsomhedstest af den bakterie, der er isoleret fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokale (regionale, på gårdniveau) epidemiologiske oplysninger om mælkebakteries følsomhed. Anvendelse af dette produkt på måder, der afviger fra instruktionerne i dette produktresumé kan øge forekomsten af bakterier, der er resistente over for chlortetracyclin, og kan reducere effekten af behandling med andre tetracycliner på grund af potentialet for krydsresistens. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: På grund af risikoen for sensibilisering og kontakt-dermatitis skal hudkontakt undgås. Benyt egnede, impermeable handsker under håndtering af lægemidlet. På grund af risikoen for øjenirritation skal kontakt med øjnene undgås. Beskyt øjne og ansigt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå inhalering af dampe. Anvend lægemidlet i fri luft eller i tilstrækkeligt ventileret område. Vask hænder efter brug. Der må ikke indtages madvarer eller ryges under administration af lægemidlet.

**Anvendelse under drægtighed, laktation eller eglægning:** Efter kutan administration af produktet absorberes chlortetracyclin ikke og udskilles ej heller med mælken. Derfor er produktet sikkert ved brug under drægtighed og laktation.

**Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:**

Efter kutan administration af Chlortetracyclin Spray absorberes chlortetracyclin ikke. Parenteralt eller oralt indgivet antibiotika penetrerer ikke dermis. Derfor forventes ingen interaktioner. Ingen data om vekselvirkninger med andre lokale behandlinger er tilgængelige. **EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE:** Ubrugte veterinærlægemidler eller affald fra sådanne veterinærlægemidler skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

**DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN:** Oktober 2021  
**ANDRE OPLYSNINGER:** MT nr. 34117

Til dyr - kræver recept.

Batch/EXP: Se beholderens bund.



GTIN: 08714225165926 618514

Fare

Vnr 40 08 73

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)  
**INDEHAFER AF MARKEDSFØRINGSTILDELSEN OG FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCH/FORGLIVELSE:** Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holland  
**REPRÆSENTANT:** Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark

**ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER:**

Per beholder af 270 ml: Aktivt stof: Chlortetracyclin HCl. Indholdet af aktivt stof er 2,45% vægt/vægt (svarende til 3,210 g)

Hjælpestoffer: Patent Blue V (E131) 0,15% vægt/vægt (svarende til 0,196 g); Butan 100 68,77% vægt/vægt (svarende til 89,920 g).

**INDIKATIONER:** Behandling af overfladiske, traumatiske sår eller operationssår kontamineret med klortetracyclinfølsomme mikroorganismer. Lægemidlet kan anvendes som del af en behandling af overfladiske hud- og klov/hov-infektioner, især klovsplatte-dermatitis og klov-dermatitis, forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for chlortetracyclin.  
**KONTRAIKATIONER:** Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes på mælkeydende dyrs yvere, såfremt mælken er beregnet til human ernæring.

**BIVIRKNINGER:** Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde indtræffe. Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne. Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem. Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S. Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk); E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)  
**DYREARTER:** Kvæg, får og svin.

**DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ:**

Produktet er beregnet til kutan administration. Omryst beholderen grundigt før sprayning. Beholderen holdes i en afstand af ca. 15-20 cm fra det område, der skal sprayes; spray i 3 sekunder, indtil behandlingsområdet er jævnt farvet. I tilfælde af klov/hov-infektioner bør denne behandling gentages efter 30 sekunder.

- Til behandling af overfladiske, traumatiske sår eller operationssår kontamineret med klortetracyclinfølsomme mikroorganismer, anbefales en enkelt administration.
- Til behandling af Dermatitis Digitalis anbefales administration to gange med 30 sekunders interval én eller to gange dagligt i tre på hinanden følgende dage.
- Til behandling af andre klov/hov-infektioner (klovsyge og fodsyge) anbefales administration to gange med 30 sekunders interval én eller to gange dagligt. Afhængigt af skadens omfang og helingshastigheden gentages behandlingen i 1-3 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Folg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

**TILBAGEHOLDELTID:** Kød: 0 dage; Mælk: 0 dage.

Se også "Kontraindikationer".

**EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING:** Opbevares utilgængeligt for børn. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.

# Cyclo Spray® Vet.

## 2,45% vægt/vægt Til kvæg, får og svin Chlortetracyclin HCl



200 ml e  
270 3

  
Dechra