OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE
- KOMBINERET ETTIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Tindåse med belægning 130,76 g; 261,52 g

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Cyclo Spray Vet., 2,45 % vægt/vægt kutanspray, suspension til kvæg, får og svin

2. SAMMENSÆTNING

Hvert gram indeholder:

Aktivt stof:

Chlortetracyclin HCl	78,6 mg
(svarende til chlortetracyclin	73,0 mg)

Hjælpestoffer:

Patent Blue V (E131), farvestof	4,8 mg

Blåfarvet spray

3. PAKNINGSSTØRRELSE

130,76 g;
261,52 g.

4. DYREARTER

Til kvæg, får og svin.

5. INDIKATION(ER)

Indikationer

- Behandling af overfladiske, traumatiske sår (fra en skade) eller operationssår kontamineret (forurenet) med klortetracyklinfølsomme mikroorganismer.
- Veterinærlægemidlet kan anvendes som del af en behandling af overfladiske hud- og klov/hov-infektioner, især klovspalte-dermatitis (hudbetændelse) og klov-dermatitis (hudbetændelse), forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for chlortetracyclin.

6. KONTRAINDIKATIONER

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Må ikke anvendes på mælkeydende dyrs yvere, såfremt mælken er beregnet til human ernæring.

7. SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler

Særlige advarsler:
Der er påvist krydsresistens mellem chlortetracyclin og andre tetracyclinantibiotika (modstandsdygtighed over for andre tetracycliner end det tetracyclin, som oprindeligt var kilden til modstandsdygtighed). Anvendelse af produktet skal overvejes nøje, når følsomhedstestning har påvist resistens over for tetracyclinantibiotika, da dets virkning kan være nedsat.

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse i den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:
Øjnene skal beskyttes, såfremt der sprayes i nærheden af ansigtet. Det angrebne område renses omhyggeligt før sprayning. Efter administration på kloven/hoven skal dyret holdes på tørt underlag i mindst én time. Anvendelse af veterinærlægemidlet skal være baseret på identifikation og følsomhedstestning af målpatogenet/-patogenerne(sygdomsforårsagende mikroorganisme(r). Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen være baseret på epidemiologiske oplysninger og kendskab til følsomheden af målpatogenerne (de sygdomsforårsagende mikroorganismer) på bedriftsniveau eller på lokalt/regionalt niveau. Anvendelsen af veterinærlægemidlet skal være i overensstemmelse med officielle, nationale og regionale antimikrobielle politikker.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:
På grund af risikoen for sensibilisering (fremkaldelse af følsomhed) og kontakt-dermatitis (hudbetændelse) skal hudkontakt undgås.
Benyt egnede, impermeable (uigennemtrængelige) handsker under håndtering af veterinærlægemidlet.
På grund af risikoen for øjenirritation skal kontakt med øjnene undgås. Beskyt øjne og ansigt.
Undgå inhalering (indånding) af dampe. Anvend veterinærlægemidlet i fri luft eller i tilstrækkeligt ventileret område.
Vask hænder efter brug.
Der må ikke indtages madvarer eller ryges under administration af veterinærlægemidlet.

Drægtighed og diegivning:
Efter kutan administration af veterinærlægemidlet absorberes chlortetracyclin ikke og udskilles ej heller med mælken. Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Efter kutan (på huden) administration af Chlortetracyclin Spray absorberes chlortetracyclin ikke. Parenteralt eller oralt indgivet antibiotika penetrerer (gennemtrænger) ikke dermis (hudlaget under overhuden). Derfor forventes ingen interaktioner.
Ingen data om vekselvirkninger med andre lokale behandlinger er tilgængelige.

8. BIVIRKNINGER

Bivirkninger
Kvæg, får og svin:
Sjælden (1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr): Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne etikettering, eller hvis du mener, at medicinen ikke har virket. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller den lokale repræsentant ved hjælp af kontaktoplysningerne på denne etiket eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

9. DOSERING FOR HVER DYREART, ADMINISTRATIONSVEJE OG ADMINISTRATIONSMÅDE

Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde
Kutan anvendelse.
Omryst beholderen grundigt før sprayning. Beholderen holdes i en afstand af ca. 15-20 cm fra det område, der skal sprayes; spray i 3 sekunder, indtil behandlingsområdet er jævnt farvet.
I tilfælde af klov/hov-infektioner bør denne behandling gentages efter 30 sekunder.

- Til behandling af overfladiske, traumatiske sår (fra en skade) eller operationssår kontamineret (forurenet) med klortetracyklinfølsomme mikroorganismer, anbefales en enkelt administration.
- Til behandling af Dermatitis Digitalis (også kaldet Mortellaro, en klovsygdom) anbefales administration to gange med 30 sekunders interval én eller to gange dagligt i tre på hinanden følgende dage.
- Til behandling af andre klov/hov-infektioner (klovsyge og fodsyge) anbefales administration to gange med 30 sekunders interval én eller to gange dagligt. Afhængigt af skadens omfang og helingshastigheden gentages behandlingen i 1-3 dage.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

10. OPLYSNINGER OM KORREKT ADMINISTRATION

11. TILBAGEHOLDELSESTID(ER)

Tilbageholdelsestider
Slagtning: 0 dage.
Mælk: 0 dage.
Se også 'Kontraindikationer'.

12. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Særlige opbevaringsbetingelser
Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

13. SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse
Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.
Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

14. KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER

Klassificering af veterinærlægemidler
Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

15. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE OG PAKNINGSSTØRRELSER

MT nr.: 34117

Pakningsstørrelser
Dåse 130,76 g; 261,52 g.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

16. DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF MÆRKNINGEN

Dato for seneste ændring af mærkningen
13. november 2025

BP

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

17. KONTAKTOPLYSNINGER

Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelse:
Eurovet Animal Health BV
Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Eurovet Animal Health BV
Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holland

IGS Aerosols GmbH
Im Hemmet 1 und 2
79664 Wehr
Tyskland

Lokale repræsentanter og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
Dechra Veterinary Products A/S,
Mekuvej 9, 7171 Uldum, Danmark
+45 76 90 11 00

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.

18. ANDRE OPLYSNINGER

BP

19. TEKSTEN ”KUN TIL DYR”

Kun til dyr.

20. UDLØBSDATO

Exp {mm/åååå}

21. BATCHNUMMER

Lot {nummer}

Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 ºC.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.



Symboler sættes på etiketteringsteksten vist på dåsen