

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 20 mg/g (2%), salve natriumfusidat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin
3. Sådan skal du bruge Fucidin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden. Du kan bruge Fucidin mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin virker på.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Fucidin

- hvis du er allergisk over for natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug ikke salven omkring øjnene, da det kan irritere øjet.

Brug af andre lægemidler sammen med Fucidin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Du kan bruge Fucidin sammen med andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Fucidin efter lægens anvisning.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin, men du bør dog ikke smøre det på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fucidin indeholder butylhydroxytoluen, cetylalkohol og lanolin

Indholdet af cetylalkohol og butylhydroxytoluen (E321) kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Butylhydroxytoluen (E321) kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.

Lanolin kan give lokalt hududslæt hos personer med allergi over for lanolin.

3. Sådan skal du bruge Fucidin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis for børn og voksne er: Påsmør salven 2-3 gange dagligt.

Hvis du har brugt for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Fucidin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin.

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du har glemt at bruge Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

- Eksem
- Udslæt
- Kløe
- Rødmen af huden
- Smerter på påføringsstedet (herunder brændende eller stikkende fornemmelse på huden)
- Irritation på påføringsstedet

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

- Overfølsomhed
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Udslæt (nældefeber) og hævelse: Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Blærer

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller tuben efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin indeholder:

- Aktivt stof: natriumfusidat.
- Øvrige indholdsstoffer: vandfrit lanolin; cetylalkohol; paraffinolie; hvid blød paraffin; all-rac- α -Tocopherol; butylhydroxytoluen (E321).

Udseende og pakningsstørrelser

Fucidin er en hvid til gullig hvid, gennemskinnelig salve.

Pakningsstørrelser: 15 g og 30 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Epione Medicine ApS
Kanalholmen 14L
2650 Hvidovre

Fremstiller

Epione Medicine ApS
Kanalholmen 14L
2650 Hvidovre

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Epione Medicine ApS.

Fucidin® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 11/2025.