



Livostin[®] 0,5 mg/ml øjendråber, suspension

Levocabastin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Livostin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Livostin.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Livostin
3. Sådan skal du bruge Livostin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Livostin indeholder et stof (antihistamin), der lindrer symptomer på overfølsomhed (allergi) i øjnene.

Du kan bruge Livostin øjendråber

- til behandling af allergisk øjenbetændelse, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede.
- når øjnene løber på grund af anden form for overfølsomhed (allergi).

Livostin virker næsten øjeblikkeligt og virkningen kan vare ved i adskillige timer.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Livostin øjendråber for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE LIVOSTIN

Brug ikke Livostin

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for levocabastin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Livostin

Tal med lægen, inden du tager Livostin, hvis du

- har dårlige nyrer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Livostin og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Livostin efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Livostin, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Livostin kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Livostin

Livostin øjendråber indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Livostin øjendråber, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LIVOSTIN

Hvis din læge har ordineret Livostin til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er


Voksne og børn over 2 år: 1 dråbe i hvert øje 2 gange daglig. Hvis denne dosis ikke hjælper, kan din læge øge doseringen til 3-4 gange dagligt. Tal med lægen.

Børn under 2 år:


Du må kun bruge Livostin til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Sådan bruger du Livostin

1. Ryst beholderen godt og fjern beskyttelseshætten.
2. Bøj hovedet bagover og træk forsigtigt det nederste øjenlåg lidt nedad.
3. Dryp én dråbe i den inderste øjenkrog, så dråben bliver fordelt mellem øjet og øjenlåget. Du kommer automatisk til at blinke, så øjendråben bliver fordelt over hele øjet.



4. Dryp det andet øje på samme måde.



Pas på ikke at røre øjet med øjendråbeflasken, da du ellers kan risikere at resten af øjendråberne bliver forurenet og senere kan give infektion i øjet.

Hvis der er gået mere end en måned, efter du har åbnet en flaske Livostin øjendråber, må du ikke bruge eventuelle rester.

Hvis du har brugt for meget Livostin øjendråber

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Livostin, end der står i her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du ved et uheld kommer til at drikke Livostin, skal du drikke rigeligt med vand og kontakte lægen.

Hvis du har glemt at bruge Livostin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Livostin

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Livostin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga. overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter):

- Lokal irritation af øjnene.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Lokal overfølsomhedsreaktion (allergisk reaktion).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Livostin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Livostin ved temperaturer over 25 °C.

Holdbarhed efter åbning er 1 måned.

Brug ikke Livostin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Livostin 0,5 mg/ml øjendråber, suspension indeholder:

- Aktivt stof: levocabastin
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, vandfrit dinatriumfosfat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, methylhydroxypropylcellulose, Polysorbat 80, benzalkoniumchlorid opløsning 50 %, dinatriumedetat, sterilt vand

Udseende og pakningsstørrelse Pakningsstørrelse

Livostin øjendråber fås i pakning med 4 ml.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

JANSSEN-CILAG A/S
Hammerbakken 19
3460 Birkerød
E-mail: info@janssen-cilag.dk

Fremstiller:

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
B-2340 Beerse
Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008.



JANSSEN-CILAG

JANSSEN-CILAG

Graphic Services

Tel. Inge Vermeiren: +32 14606915 - E-mail: ivermei1@gpsbe.jnj.com

Tel. François Vermeylen: +32 14606865 - E-mail: fvermeyl@gpsbe.jnj.com

INSERT LIVOSTIN

Market: DK

Article Number: 970660

Mat. ID Code: 1030

Format Name: B/I/001/V1 (100x204)

Operator: Marleen

Technical Info/Spec: NA

Pointsize: 6,3 pt

File Name : 970660.indd (CS2 - MAC)

L A B

■ Black

Date: 1.16-10-2008

2.

3.

4.

5.