

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Megace 160 mg tabletter

Megestrolacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Megace til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Megace
3. Sådan skal du tage Megace
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Megace er et hormonelt middel, som hæmmer væksten af visse typer af kræftsvulster.

Du kan bruge Megace til behandling af tilbagevendende brystkræft eller brystkræft, der har spredt sig.

Lægen kan give dig Megace for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MEGACE

Tag ikke Megace

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for megestrolacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Megace

Tal med lægen, inden du tager Megace, hvis du

- har en sygdom med tendens til dannelse af blodpropper
- hvis du har en leversygdom.

Du bør kun tage Megace, når behandlingen forestås af en læge med særlig kendskab til kræftsygdomme og deres behandling.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Megace sammen med mad og drikke

Du skal tage Megace med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Megace efter aftale med lægen.

I de første 4 måneder af graviditeten skal du normalt ikke tage Megace. Tal med lægen.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Megace. Tal med lægen.

Amning

Du skal normalt stoppe med at amme, hvis behandling med Megace er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Megace påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Megace

Megace indholder 227 mg lactosemonohydrat pr. tablet. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MEGACE

Tag altid Megace nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Du skal synke tabletterne hele.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet på 160 mg daglig. Dosis er individuel. Følg altid lægens anvisning.

Børn

Børn må normalt ikke få Megace, 160 mg tabletter.

Hvis du har taget for mange Megace, tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Megace tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Megace

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Megace

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Megace kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Åndenød, trykken i brystet, hurtig puls og vand i fødder og ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Tilbagevenden af kræftlidelsen evt. ledsaget af kvalme, opkastninger og forstoppelse pga. for højt kalkindhold i blodet. Kontakt lægen.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

- Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungerne. Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Måneansigt, ændret fedtfordeling med rund krop og tynde arme og ben, tyrenakke, blårøde striber på bryst og mave, blå mærker og spontane blødninger i hud og slimhinder, tynd og tør hud, bumser og skægvækst (Cushing-lignende symptomer). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter.

- Vægtøgning.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Kvalme, opkastning, diarré, luft i maven.
- Udslæt.
- Kraftesløshed og svaghed, smerter.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.
- Uregelmæssig, kraftig blødning.
- Impotens.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Åndenød. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Forstoppelse.

- Hyppig vandladning.
- Hårtab.
- Hedeture, humørændringer.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

- Smerter og snurrende fornemmelser i en eller begge hænder pga. tryk på nerve i håndleddet.
- Rysten.
- Øget hårvækst.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Træthed, svaghed og svækket reaktion ved svære skader, infektioner og operationer pga. nedsat binyrebarkfunktion. Kontakt lægen.
- Tendens til for højt blodsukker (blodglukose). Kan udvikle sig til en alvorlig sygdom (diabetes, sukkersyge).
- Søvnliggende sløvhedstilstand.
- Akne, skællende og fedtet hud.
- Øget appetit.
- Tørhed i skeden, nedsat seksuallyst.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Du kan opbevare Megace ved almindelig temperatur.
- Brug ikke Megace efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Megace, 160 mg tabletter indeholder

- Aktivt stof: Megestrolacetat.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, povidon, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Beholder med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb AB

Box 15200

167 15 Bromma

Sverige

Repræsentant i Danmark

Bristol-Myers Squibb

Lyngby Hovedgade 98

2800 Lyngby

Fremstiller

Lawrence Laboratories

Unit 12, Distribution Centre

Shannon Free Zone, Shannon Industrial Estate

County. Clare

Irland

Denne indlægsseddel blev revideret i august 2011.