

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN  
**Dulcolax® 10 mg, suppositorier**  
Bisacodyl

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.
- Du kan få Dulcolax uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Dulcolax.
- Kontakt lægen hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre indenfor få dage.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Den til enhver tid nyeste indlægsseddel kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dulcolax
3. Sådan skal du tage Dulcolax
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

**1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Dulcolax er et afføringsmiddel. Det virker ved at øge tyktarmens bevægelser (peristaltikken) og ophobe vand i tyktarmen.

Dulcolax bruges ved forstoppelse.

Dulcolax bruges til tømning af tarmen før operation eller undersøgelse af tarmen.

Hvis din læge har sagt du skal tage Dulcolax for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

**2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DULCOLAX**

**Tag ikke Dulcolax**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for bisacodyl eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis der er ingen eller kun dårlig passage i mavetarmkanalen (f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen)
- hvis du generelt er dehydreret, dvs. har indtaget for lidt væske gennem længere tid
- hvis du har betændelse i tarmen
- hvis du har stærke mavesmerter med kvalme og opkastninger (f.eks. blindtarmsbetændelse).

**Vær ekstra forsigtig med at tage Dulcolax**

- Hvis du har et dagligt behov for afføringsmiddel, bør det undersøges, hvorfor du har et sådant dagligt behov. Dulcolax bør kun indtages dagligt over længere perioder efter aftale med din læge.

- For enkelte patienter har dét, at skulle på toilettet, været forbundet med anstrengelse og smerte, hvilket har været årsag til svimmelhed og besvimelse. Vær opmærksom på dette.
- Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller er over 65 år, og hvis du i en periode har indtaget for lidt væske (er dehydreret), skal behandlingen med Dulcolax afbrydes, og må kun genstartes efter aftale med lægen. Tegn på væsketab kan være tørst og nedsat vandladning (mindre urin).

### **Brug af anden medicin**

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Ved overdrevent brug af Dulcolax og samtidig anvendelse af vanddrivende medicin eller medicin indeholdende binyrebarkhormoner, er der risiko for forstyrrelser i saltbalancen i kroppen. Forstyrrelser i saltbalancen i kroppen øger bivirkningerne ved brug af digoxin (hjertemedicin).

### **Graviditet og amning**

Spørg læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du er gravid skal du normalt ikke tage Dulcolax. Tal med din læge.

Hvis du ammer, kan du godt bruge Dulcolax.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**


Dulcolax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

På grund af mavesmerter forårsaget af forstoppelse kan der forekomme bivirkninger i form af svimmelhed og/eller besvimelse, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner. Hvis du oplever, at du bliver svimmel, skal du undgå at foretage dig ting, der kan være farlige, såsom bilkørsel eller brug af værktøj eller maskiner.

## **3. SÅDAN SKAL DU TAGE DULCOLAX**

Hvis din læge har ordineret Dulcolax til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Børn under 10 år, som har kronisk eller vedvarende forstoppelse, må kun behandles efter aftale med lægen. Dulcolax må ikke anvendes til børn under 2 år.



Tag suppositoriet ud af folien, som vist på figuren.

Det er en god ide at fugte suppositoriet med lidt vand før anvendelse.

Suppositoriet skal indføres i endetarmen med den spidse ende forrest. Virkningen af suppositoriet kan forventes indenfor 20 minutter.

Suppositoriet må ikke deles. Suppositoriet må ikke indtages gennem munden.

### Dosering ved forstoppelse:

**Voksne og børn over 10 år:** 1 suppositorie (10 mg) indføres i endetarmen kort tid før virkningen ønskes.

Dosering ved tarmtømning før operation eller tarmundersøgelse:

Kun efter lægens anvisning.

**Voksne og børn over 10 år:** Dagen før undersøgelsen tages 2 Dulcolax enterotabletter (10 mg) om morgenen og 2 Dulcolax enterotabletter (10 mg) om aftenen. Om morgenen på selve undersøgelsesdagen indføres 1 suppositorie (10 mg) i endetarmen.

Enterotabletterne skal synkes hele med et glas vand og tages som hovedregel om aftenen ved sengetid. Virkningen kan forventes næste morgen.

Hvis du mener, at virkningerne af Dulcolax er for kraftige eller for svage, bør du tale med din læge eller apotek herom.

**Hvis du har taget for mange Dulcolax**

Hvis du har taget for mange Dulcolax, og du føler dig utilpas, så kontakt lægen, skadestuen eller apoteket. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være diarré, mavekramper og væsketab.

Ved kronisk overforbrug af afføringsmidler ses kronisk diarré, mavesmerter, nedsættelse af blodets kaliumindhold, hvilket kan medføre muskeltræthed og nyrepåvirkninger såsom nyresten og nyrebeskadigelse.

**Hvis du har glemt at tage Dulcolax**

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

#### 4. BIVIRKNINGER

Dulcolax kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er mavekramper eller diarré.

**Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •**

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 behandlede):

Mavekramper, mavesmerter, diarré, kvalme og ubehag i maven.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000):

Svimmelhed. Opkastning, blod i afføringen (haematokexia) i et begrænset omfang. Ubehag ved endetarmen.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000):

- Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (colitis). Kontakt lægen
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

- Hævelser og udslæt (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læbe og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Tørst. Almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.

### **Indberetning af bivirkninger**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

E-mail: [dkma@dkma.dk](mailto:dkma@dkma.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Tag ikke Dulcolax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdato (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Dulcolax suppositorier 10 mg indeholder:

- Aktivt stof: Bisacodyl
- Øvrigt indholdsstof: Hårdfedt.

### **Udseende og pakningsstørrelse**

Dulcolax suppositorier 10 mg er hvide og torpedoformede.

Dulcolax suppositorier findes i pakningsstørrelse med 6 stk.

### **Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

#### **Repræsentant i Danmark:**

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

#### **Markedsføring i Danmark:**

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim am Rhein, Tyskland

#### **Fremstiller:**

Istituto De Angeli s.r.l.,

Reggello, Italien

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2011.**

Den til enhver tid nyeste indlægsseddel kan findes på [indlægsseddel.dk](http://indlægsseddel.dk)

© Boehringer Ingelheim International GmbH/Boehringer Ingelheim Danmark A/S, februar 2011.