

INDLÆGSSEDDEL

Bayticol pour-on vet., pour-on, opløsning, 10 mg/ml

Seneste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Tyskland

Repræsentant:

Elanco Denmark ApS
Lautrupvang 12, 1.
2750 Ballerup

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Bayticol pour-on vet., pour-on, opløsning, 10 mg/ml
Flumethrin

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml indeholder:

Aktivt stof: Flumethrin 10 mg

Andre indholdsstoffer: Octyldodecanol; paraffinolie, tynd; butylhydroxytoluen

INDIKATIONER

Ektoparasitter hos kvæg.

Lus og flåter hos får.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen kendte.

BIVIRKNINGER

Ingen kendte.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemedelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemedelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemedelstyrelsens netsted. www.lmst.dk

DYREARTER

Kvæg og får.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ

Spis, drik og ryg ikke under påføring af produktet.

Kvæg:

Pelslus: 1 mg/kg legemsvægt svarende til 10 ml opløsning pr. 100 kg legemsvægt.

Blodsugende lus og skabmider: 2 mg/kg legemsvægt svarende til 20 ml opløsning pr. 100 kg legemsvægt.

Ved skab gentages behandlingen efter 1-2 uger.

Præparatet appliceres på huden i ryggens midtlinie. Ved behandling af haleskab hos kvæg fordeles dosis over kryds, halegruber, baglår og spejl.

Får:

Lus og flåter: 2 mg/kg legemsvægt svarende til 2 ml opløsning pr. 10 kg legemsvægt

Præparatet appliceres på huden i ryggens midtlinie.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Ved behandling af langpelsede får deles ulden på ryggen og den samlede dosis anbringes i denne fordybning.

TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning, kvæg: 5 dage; får: 21 dage

Mælk, kvæg: 8 dage

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke nedfryses.

Opbevares adskilt fra fødevarer og dyrefoder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på etiketten efter "EXP".

Opbevaringstid efter første åbning af flasken: 9 måneder.

SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Anvend beskyttelseshandsker (nitril engangshandsker). Undgå kontakt med hud, øjne og mund.

Undgå at indtage produktet.

Vask hænder, ansigt og eksponeret hud med vand og sæbe efter brug.

I tilfælde af uheld hvor produktet spildes på huden, afvaskes med vand og sæbe. I uheldstilfælde hvor produktet kommer i øjnene eller munden, skylles med rigeligt vand.

I tilfælde af uheld hvor produktet spildes på tøjet, fjernes det kontaminerede tøj og hænder og hud afvaskes grundigt med vand og sæbe.

Overdosering

Hudkløe. Specifikt antidot er ikke kendt.

Drægtighed og diegivning

Kan anvendes

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Genbrug ikke emballagen til noget formål.

Produktet er giftigt for fisk, vandlevende organismer og bier.

Bayticol vet. må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGGSSEDLEN

01/2024