

INDLÆGSSEDDEL  
Baytril® vet., 25 mg/ml, oral opløsning

**Navn og adresse på indehaveren af markedsføringstilladelsen samt på den indehaver af virksomhedsgodkendelse, som er ansvarlig for batchfrigivelse, hvis forskellig herfra**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Bayier Animal Health GmbH  
D-51368 Leverkusen  
Tyskland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
D-24106 Kiel  
Tyskland

Repræsentant:

Elanco Denmark ApS  
Lautrupvang 12, 1.  
2750 Ballerup

**Veterinærlægemidlets navn**

Baytril® vet., 25 mg/ml, oral opløsning.  
Enrofloxacin

**Angivelse af det aktive stof og andre indholdsstoffer**

Aktivt stof: Enrofloxacin 25 mg/ml  
Andre indholdsstoffer: kaliumhydroxid, benzylalkohol, methylhydroxypropylcellulose og rensat vand.

**Indikationer**

Infektioner forårsaget af enrofloxacinfølsomme bakterier.

**Kontraindikationer**

Må ikke anvendes til lakterende køer, æglæggende fjerkræ og til heste.

**Bivirkninger**

Sjældent: mave-tarmforstyrrelser.

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. [www.lmst.dk](http://www.lmst.dk)

### **Dyrearter**

Til kalve

### **Dosering for hver dyreart, anvendelsesmåde og indgivelsesvej**

Vær opmærksom på at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Anbefalet dosis:

Oral opløsning 25 mg/ml:

Kalve: 2,5-5 mg/kg svarende til 1-2 ml/10kg legemsvægt dagligt i 3-10 dage.

### **Oplysninger om korrekt anvendelse**

Opløsningen blandes i mælken eller foderet eller gives direkte i munden.

### **Tilbageholdelsestid**

Slagtning: 10 døgn

### **Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring**

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen efter "EXP".

### **Særlige advarsler**

Bør ikke anvendes til dyr med nedsat nyrefunktion.

Bør ikke anvendes til hunde med epilepsi.

Samtidig behandling med theofyllin bør undgås.

### **Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne, om nødvendigt**

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier

### **Dato for seneste revision af indlægssedlen**

August 2020