

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DOXAZOSIN COPYFARM

Doxazosin

Depottabletter 4 mg

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Doxazosin Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give Doxazosin Copyfarm til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Doxazosin Copyfarms virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Copyfarm
3. Sådan skal du tage Doxazosin Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Doxazosin Copyfarm
6. Yderligere oplysninger

1. Doxazosin Copyfarms virkning og hvad du skal bruge det til**Virkemåde:**

Doxazosin Copyfarm er et blodtryksnedsættende lægemiddel, der virker ved at udvide blodkarrene, således at modstanden nedsættes og blodtrykket falder. Desuden virker Doxazosin Copyfarm afslappende på muskulaturen i blærehalskirtlen.

Medicinen anvendes til:

Doxazosin Copyfarm anvendes til symptomatisk behandling af vandladningsbesvær ved forstørret prostata. Doxazosin Copyfarm anvendes også til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Copyfarm**Tag ikke Doxazosin Copyfarm hvis**

- du er overfølsom over for doxazosin, andre quinazoliner (f.eks. prazosin og terazosin), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doxazosin Copyfarm
- du har godartet forstørrelse af blærehalskirtlen og samtidig overfyldning i øvre urinveje, kronisk urinvejsinfektion og blæresten
- du har manglende evne til at holde på vandet, ophørt urinproduktion eller fremadskridende utilstrækkelig nyrefunktion
- du har eller har haft forsnavring af spiserøret eller i mave-tarm-kanalen
- du ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Doxazosin Copyfarm

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du har en

- leversygdom
- hjertesygdom
- gastrointestinale sygdomme (sygdomme i mavetarmkanalen)

Hvis du skal opereres for grå stær (uklarhed i øjets linse), så skal du inden operationen fortælle øjenspecialisten, at du bruger Doxazosin Copyfarm. Det skyldes, at Doxazosin Copyfarm kan medføre komplikationer under operationen, som kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.

Brug af anden medicin

Doxazosin Copyfarm øger effekten af anden blodtryksnedsættende medicin.

Medicin mod impotens (for eksempel sildenafil, tadalafil, vardenafil) kan give forhøjet blodtryk, hvis du samtidig er i behandling med doxazosin.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Doxazosin Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Doxazosin Copyfarm sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet: Ved graviditet eller ønske herom, må du ikke tage Doxazosin Copyfarm, før du har talt med din læge om det. Erfaringer med doxazosin er endnu begrænsede under graviditet.

Amning: Hvis du ammer, må du ikke tage Doxazosin Copyfarm. Hvis behandling er nødvendig, skal amning ophøre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Doxazosin Copyfarm kan især i begyndelsen af behandlingen give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Doxazosin Copyfarm

Tag altid Doxazosin Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Doxazosin Copyfarm depottabletter skal synkes hele, og må derfor ikke tygges, deles eller knuses. Den ydre skal af depottabletten er uopløselig. Det betyder, at det aktive indholdsstof langsomt udløses fra tabletten, men selve tabletten opløses ikke. Du skal derfor ikke blive urolig, hvis du af og til ser noget i afføringen, der ligner en tablet.

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand. Doxazosin Copyfarm depottabletter skal synkes hele. De må ikke tygges, deles eller knuses.

Voksne

Den normale dosis er 4 mg én gang dagligt. Om nødvendigt kan dosis øges til 8 mg én gang dagligt.

Ældre

Samme dosis som angivet under "Voksne".

Børn:

Anbefales ikke til børn.

Nedsat leverfunktion:

Det er ved let nedsat leverfunktion nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Doxazosin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Doxazosin Copyfarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at tage Doxazosin Copyfarm

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Doxazosin Copyfarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Træthed, utilpashed, kraftløshed, hovedpine, bryst smerter og unormal søvnighed.

- Ørthed, svimmelhed, væskeophobninger og hjertebanken.
- Muskelkramper.
- Forstoppelse og fordøjelsesbesvær.
- Åndenød og snue.
- Forsinket sædafgang og sløvhed.
- Hyppig vandladningstrang og øget vandladning.
- Synsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Væskeophobninger i ansigtet og i kroppen generelt, kortvarige bevidsthedstab, ansigtsrødmen, feber/kulderystelser og bleghed.
- Lavt blodtryk ved stillingsændring fra liggende til stående, hjerterytmeforstyrrelser, utilstrækkelig iltforsyning til de yderste legemsdele, hjertekramper, hurtig puls og blodprop i hjertet.
- Rysten og muskelstivhed.
- Anoreksi og øget appetit.
- Hårtab.
- Næseblod, astmalignende anfald, hoste og betændelse i svelget.
- Tørst, for lavt kaliumindhold i blodet og gift.
- Muskelsmerter, hævelser af led/ledsmerter og muskelsvaghed.
- Mareridt, hukommelsestab og humørsvingninger.
- Inkontinens, vandladningsforstyrrelser og vandladningssmerter.
- Tåreflåd og lysoverfølsomme øjne.
- Tinnitus (ringen for ørerne).
- Smagsforstyrrelser.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Forstyrrelser i blodtilførslen til hjernen.
- Depressioner, ophidselse og føleforstyrrelser i huden.
- Væskeophobninger i strubehovedet.
- Udslæt, kløe og små blødninger i hud og slimhinder.
- Mavekneb, diaré og opkastning.
- Gulsot og forhøjede leverværdier.
- For lavt blodsukker.
- Sløret syn.
- Impotens, smertefuld erektion og lav legemstemperatur hos ældre.

Desuden er der set enkelte tilfælde med:

- Forstyrrelser i blodbilledet.
- For lavt blodtryk ved stillingsændring fra liggende til stående og der kan i sjældne tilfælde forekomme kortvarige bevidsthedstab i starten af behandlingen, især ved meget høje doser, men også når behandlingen påbegyndes igen efter en pause.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5. Sådan opbevarer du Doxazosin Copyfarm

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke Doxazosin Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Doxazosin Copyfarm indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Doxazosin Copyfarm er: Doxazosinmesylat svarende til doxazosin 4 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletterne: Polyethylenoxid, mikrokrySTALLinsk cellulose, povidon, butylhydroxytoluen (E 321), a-tocopherol, vandfri kolloid silica og natriumstearylformurat.

Tablet overtræk: Methacrylsyre copolymer (Eudragir L30 D-55), macrogol 1300-1600 og titandioxid (E 171).

Doxazosin Copyfarms udseende og pakningstørrelse

Udseende:

Doxazosin Copyfarm er en hvid, rund, hvælvet depottablet, mærket med "DL".

Pakningsstørrelser:

28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter (blisterpakning). Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Copyfarm A/S, Energivej 15, DK-Odense S

Email: info@copyfarm.com



(03) 1957502

Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700