

FINASTERID COPYFARM

Filmovertrukne tabletter, 5 mg
Finasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Finasterid Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Finasterid Copyfarms virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Copyfarm
3. Sådan skal du tage Finasterid Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Finasterid Copyfarm
6. Yderligere oplysninger

1. Finasterid Copyfarms virkning og hvad du skal bruge det til.

Finasterid Copyfarm tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes 5-alfa reductase hæmmere. De virker ved at formindske størrelsen af blærehalskirtlen hos mænd.

Finasterid Copyfarm bruges til behandling og kontrol af godartet forstørrelse af prostata (benign prostatahyperplasi – BPH). Det formindsker den forstørrede prostata, forbedrer urinstrømmen og symptomer, der skyldes BPH og nedsætter risikoen for en pludselig tilbageholdelse af urinen og behov for operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Copyfarm.

Tag ikke Finasterid Copyfarm

- Hvis du er overfølsom over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du er en kvinde (se også under "Graviditet og amning")
- Hvis du er et barn.

Vær ekstra forsigtig med at tage Finasterid Copyfarm

- Hvis du har en stor resterende urinmængde i blæren efter vandladning og/eller stærkt formindsket urinstrøm. Hvis det er tilfældet, bør du undersøges grundigt for forsnævring af urinrøret.
- Hvis du har nedsat leverfunktion.

Tal med din læge, hvis en af de ovenstående ting er relevante for dig nu eller har været det tidligere.

Brug af anden medicin

Der er ikke nogen kendte problemer med at anvende andre lægemidler samtidig.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Finasterid Copyfarm er kun til behandling af mænd.

Kvinder, der er gravide, eller måske kan være gravide, må ikke berøre knuste eller knækkede Finasterid Copyfarm tabletter. Hvis

finasterid optages gennem huden eller efter indtagelse gennem munden hos kvinder der er gravide med et drengefoster, kan barnet blive født med misdannede kønsorganer. Tabletterne er filmovertrukne, hvilket forhindrer kontakt med finasterid, hvis tabletterne ikke er knuste eller knækkede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke nogen oplysninger om, at Finasterid Copyfarm påvirker trafik- eller arbejdssikkerhed.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid Copyfarm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Finasterid Copyfarm, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Finasterid Copyfarm.

Tag altid Finasterid Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Den sædvanlige dosis er 1 tablet om dagen (svarende til 5 mg finasterid).

De filmovertrukne tabletter kan enten tages på tom mave eller sammen med et måltid. De filmovertrukne tabletter skal sluges hele og må ikke deles eller knuses.

Selvom der observeres bedring i løbet af kort tid, kan det være nødvendigt med mindst seks måneders behandling for at kunne bedømme, om der er opnået en tilfredsstillende respons på behandlingen.

Din læge vil fortælle dig, hvor lang tid du skal fortsætte med at tage Finasterid Copyfarm 5 mg. Afbryd ikke behandlingen for tidligt, da symptomerne kan komme tilbage.

Nedsat leverfunktion:

Der er ingen erfaring med brugen af Finasterid Copyfarm hos patienter med nedsat leverfunktion (se også "Vær ekstra forsigtig med at tage Finasterid Copyfarm").

Nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Brugen af Finasterid Copyfarm hos patienter, der skal i hæmodialyse er endnu ikke blevet undersøgt.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du føler, at virkningen af Finasterid Copyfarm er for stærk eller for svag.

Hvis du har taget for mange Finasterid Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Finasterid Copyfarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Det samme gælder hvis børn har taget Finasterid Copyfarm ved en fejltagelse.

Hvis du har glemt at tage Finasterid Copyfarm

Hvis du har glemt at tage en dosis Finasterid Copyfarm kan du tage den, så snart du husker det, medmindre det er tid til den næste dosis, og hvis det er tilfældet, skal du fortsætte med din medicin på den måde, den er blevet ordineret. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger.

Finasterid Copyfarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er impotens og nedsat seksuallyst. Disse bivirkninger forekommer ofte i begyndelsen af behandlingen men varer som regel ikke lang tid hos de fleste patienter, hvis behandling fortsættes.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Impotens

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Nedsat seksuallyst, nedsat sædmængde, bryststørhed/forstørrelse af brystet, problemer med ejakulation (udløsning).
- Udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Testikelsmerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kløe, nældefeber. Allergiske reaktioner, f.eks. hævelse af ansigt og læber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Sekret fra brysterne, knuder i brystet.

Hypigheden ikke kendt:

- Træthed

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Finasterid Copyfarm

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirk-

ninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Sådan opbevarer du Finasterid Copyfarm

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Finasterid Copyfarm efter den udløbsdato, der står på beholderen og den ydre karton. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide medicinrester i afløbet, toiletlet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Aktivt stof: Finasterid. En filmovertrukket tablet indeholder 5 mg finasterid.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLINSK cellulose, prægelatineret stivelse (majs), natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat og natriumlaurilsulfat. Filmovertrukket indeholder hypromellose, mikrokrySTALLINSK cellulose, macrogolstearat (type I)

Finasterid Copyfarms udseende og pakningstørrelse

Finasterid Copyfarm er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7 mm og de er præget med "F" og "5" på den ene side.

Blisterpakninger (PVC/PVDC/Aluminium): 20, 28, 30, 35, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 105, 110, 120 og 126 tabletter.

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Copyfarm A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S
Mail: info@copyfarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finasterid Copyfarm

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den 08.02.2007

