

Indlægsseddel: Information til brugeren

Furosemid Copyfarm 20 mg og 40 mg tabletter

furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Copyfarm
3. Sådan skal du tage Furosemid Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Furosemid tilhører en gruppe af lægemidler kaldet diuretika, der øger mængden af urin der udskilles af nyrerne, og derved hjælper kroppen med at udskille overskydende væske. Diuretika kaldes også "vanddrivende" lægemidler.

Furosemid Copyfarm anvendes til behandling af ødemer (væskeophobning i kroppen) forårsaget af sygdomme i hjerte, nyrer eller lever og anvendes enten alene eller i kombination med andre blodtrykssænkende lægemidler. Tabletterne kan også anvendes til behandling af lungeødem (ophobning af væske i lungerne) og mild til moderat hypertension (forhøjet blodtryk).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Copyfarm

Tag ikke Furosemid Copyfarm hvis:

- du er allergisk (overfølsom) over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid Copyfarm (angivet i pkt. 6). Tegn på en allergisk reaktion kan være: udslæt, problemer med at synke eller trække vejret, hævelse af læber, ansigt, hals eller tunge.
- du er allergisk overfor amilorid, sulfonamider eller sulfonamid derivater så som sulfadiazin eller co-trimoxazol.
- du har fået at vide at du har for lavt blodvolumen eller væskemangel (med eller uden lavt blodtryk som følge deraf).
- du har fået at vide af din læge at du har nyresvigt. Ved visse typer af nyresvigt er det stadig i orden at anvende dette lægemiddel. Det vil din læge afgøre.
- du har alvorlige leverproblemer (cirrhose).
- du har elektrolytmangel (dvs. mangel på kalium og natrium i blodet).
- du ikke producerer urin.
- du har en sygdom kaldet Addisons sygdom. Den kan få dig til at føle dig træt og svag.
- du tager anden medicin som ændrer mængden af kalium i dit blod (se "Brug af anden medicin sammen med Furosemid Copyfarm").

- du er under 18 år. Furosemid Copyfarm egner sig ikke til behandling af børn.
- du ammer (se ”Graviditet, amning og fertilitet”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Furosemid Copyfarm hvis:

- du har for lavt blodtryk eller bliver svimmel, når du rejser dig op.
- du har saltmangel. Natrium- og kaliumniveauerne i dit blod bør måles regelmæssigt og dosis bør justeres i henhold til disse.
- du har diabetes (sukkersyge)
- du er 65 år eller ældre
- du har svært ved at tisse
- du har urinsyrerigt (podagra)
- du har lever- eller nyreproblemer
- du har for lavt indhold af protein i blodet (hypoproteinæmi)
- du har symptomer på akut porfyri, hvilket kan betyde kraftige smerter i mave, ryg eller lår. Kvalme, opkastning eller forstoppelse kan forekomme tillige med svaghed i arme og ben.
- du er en ældre patient med demens og er i behandling med risperidon
- du har problemer med prostata
- du føler dig svimmel eller dehydreret. Dette kan ske hvis du har mistet en stor mængde væske fordi du har kastet op, haft diarre eller har tisset meget ofte. Eller hvis du har svært ved at drikke og spise.
- du skal have lavet en glukosetest
- du tager andre vanddrivende lægemidler
- du skal give dette lægemiddel til et for tidligt født spædbarn.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt noget af ovenstående passer på dig, så tal med din læge eller apotekspersonale inden du tager Furosemid Copyfarm.

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Copyfarm

Fortæl altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Grunden er, at Furosemid Copyfarm kan påvirke andre lægemidlers virkning, ligesom visse andre lægemidler kan påvirke Furosemid Copyfarmes virkning.

Nedenstående lægemidler kan påvirke Furosemid Copyfarmes virkning og øge risikoen for bivirkninger:

- Ramipril, enalapril, perindopril (også kaldet ”ACE-hæmmere”) eller losartan, candesartan, irbesartan (kaldet ”angiotensin II receptor antagonist”). Din læge skal muligvis ændre dosis eller bede dig stoppe med at tage Furosemid Copyfarm.
- Lægemidler mod forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer. Din læge skal muligvis ændre dosis.
- Lægemidler til behandling af for højt blodtryk eller prostataproblemer så kaldte alfareceptor-blokkere f.eks. prazosin.
- Andre lægemidler som anvendes til at behandle højt blodtryk og andre vanddrivende lægemidler som f.eks. amilorid, spironolakton, acetazolamid og metolazon.
- Lægemidler som påvirker indeholdet af kalium i blodet. Dette inkluderer kaliumtilskud som f.eks. kaliumchlorid og visse vanddrivende tabletter (diuretika) så som triamteren,
- Lægemidler til behandling af uregelmæssige hjerteslag som f.eks. amiodaron, diospyramid, flekanid, lidokain, sotalol og mexiletin.
- Lægemidler der hjælper dig til at sove og slappe af, fx klorhydrat
- Muskelafslappende lægemidler der anvendes ved operationer. Hvis du skal opereres, skal du sikre dig at lægen eller sygeplejersken ved du tager Furosemid Copyfarm.
- Lægemidler mod diabetes. Virkningen kan svækkes når du tager Furosemid Copyfarm.
- Theophyllin – anvendes ved hvæsen eller vejrtrækningsbesvær.
- Phenytoin – anvendes ved epilepsi. Kan svække virkningen af Furosemid Copyfarm.

- Antipsykotiske lægemidler som f.eks. risperidon, amisulprid, sertindol, pimoqid og chlorpromazid. Undgå behandling med pimoqid samtidig med furosemid.

Nedenstående lægemidler kan øge risikoen for bivirkninger, når de tages sammen med Furosemid Copyfarm:

- Lithium – anvendes ved psykiske sygdomme. For at hindre bivirkninger skal din læge muligvis ændre din lithium dosis og kontrollere mængden af lithium i dit blod.
- Platinforbindelser / Cisplatin – anvendes ved visse former for kræft.
- Digoxin – anvendes ved hjerteproblemer.
- Ikke-steroid antiinflammatoriske lægemidler (NSAID'er) – anvendes ved smerte og betændelsestilstande, fx acetylsalicylsyre, ibuprofen, ketoprofen eller indometacin.
- Carbamazepin – anvendes ved epilepsi.
- Aminoglutethimid – anvendes ved brystkræft.
- Cyclosporin, takrolimus, aldesleukin – anvendes efter organtransplantation.
- Moxisylyt – anvendes til behandling af Raynaud's syndrom.
- Lægemidler til behandling af angina som lægges under tungen eller sprøjtes ind i munden som f.eks. glycerol trinitrat eller isosorbid dinitrat.
- Methotrexat – anvendes ved hudkræft, led- eller tarmsygdomme.
- Carbenoxolon og sucralfat – anvendes ved sår i spiserøret.
- Reboxetin, amitriptylin og phenelzin – anvendes ved depression.
- Amphotericin (ved længere tids brug) – anvendes ved svampeinfektioner.
- Kortikosteroider, fx prednisolon – anvendes ved betændelsestilstande.
- Atomoxetin – anvendes til behandling af ADHD
- Muskelafslappende lægemidler som f.eks. baclofen og tizanidin.
- Antihistaminer som anvendes mod allergi f.eks. ceterizin.
- Alprostadil – som anvendes mod impotens.
- Østrogen og drospirenon i p-piller eller hormonerstatningsterapi.
- Lakrids i store mængder – ofte når brugt i hostemedicin.
- Probenecid - anvendes ved urinsyregeigt.
- Lægemidler mod infektioner fx gentamicin, amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, vancomycin eller høje doser af cephalosporiner.
- Lægemidler anvendt som injektioner før røntgenundersøgelser (kontraststoffer).
- Lægemidler anvendt mod forstoppelse (laksantia), hvis de bruges over lang tid, f.eks. bisacodyl.
- Lægemidler mod astma, når de gives i høje doser, eks. salbutamol, terbutalinsulfat, salmeterol, formoterol eller bambuterol
- Lægemidler til behandling af stoppet næse f.eks. efedrin eller xylometazolin
- Kaliumsalte som anvendes til at behandle kaliummangel.
- Lægemidler som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom som f.eks. levodopa.
- Andre vanddrivende lægemidler (diuretika) f. eks. bendroflumethiazid. Din læge skal muligvis ændre dosis af din medicin.

Brug af Furosemid Copyfarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør undgå at drikke alkohol når du tager Furosemid Copyfarm da det kan sænke dit blodtryk yderligere.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må **ikke** tage Furosemid Copyfarm hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke amme hvis du tager Furosemid Copyfarm fordi små mængder furosemid passerer over i brystmælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furosemid Copyfarm kan give bivirkninger fx svimmelhed eller utilpashed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Furosemid Copyfarm indeholder lactose.

Hvis din læge har fortalt dig at du ikke kan tåle visse sukkerarter, så kontakt din læge inden du tager dette lægemiddel.

3. Sådan skal du tage Furosemid Copyfarm

Tag altid Furosemid Copyfarm nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet.

Antallet af tabletter du skal tage afhænger af din tilstand.

Tabletterne bør sluges hele med et glas vand.

Du bør tage tabletterne på nogenlunde samme tidspunkt hver dag før et måltid eller som anvist af din læge.

Voksne og ældre:

Den sædvanlige dosis er en til to tabletter som det første om morgenen. Din læge vil fortælle dig hvor mange tabletter du skal tage.

Brug til børn og unge (under 18 år):

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn og unge, da sikkerheden endnu ikke er fastslået.

Hvis du tager sucralfat (lægemiddel mod mavesår).

Tag ikke sucralfat samtidig med Furosemid Copyfarm. Tag din dosis mindst 2 timer før eller efter Furosemid Copyfarm. Ellers kan virkningen af din medicin blive påvirket.

Delekærven på Furosemid Copyfarm 40 mg er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Hvis du har taget for mange Furosemid Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furosemid Orifarm end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag æsken med.

Har du taget for mange Furosemid Copyfarm kan du komme til at føle dig forvirret, have svært ved at koncentrere dig, være ligeglad eller uinteresseret i alting. Du kan også føle dig ør, svimmel, besvime (på grund af for lavt blodtryk), opleve uregelmæssig hjerterytme, muskelsvaghed eller kramper og blodpropper (tegn på dette er smerte og hævelse i den del af kroppen der er påvirket). Du kan også få problemer med dine nyrer eller blod.

Hvis du har glemt at tage Furosemid Copyfarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Tag den dosis du har glemt, så snart du kommer i tanke om det, med mindre det er om aftenen, da du så vil skulle op om natten for at gå på toilettet. Tag din næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Furosemid Copyfarm

Fortsæt med at tage Furosemid Copyfarm indtil din læge fortæller dig at du kan stoppe med at tage det.

Blodprøver

Din læge vil muligvis tage nogle blodprøver for at kontrollere niveauerne af visse salte i blodet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende frekvenser anvendes:

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

STOP med at tage dette lægemiddel, og fortæl straks din læge, hvis du oplever nogle af følgende reaktioner:

- Allergiske reaktioner såsom kløen, hududslæt med kraftig kløe og nældefeber, feber, overfølsomhed overfor lys, alvorlig allergisk reaktion med (høj) feber, røde pletter på huden, ledsmerter og/eller øjenbetændelse, alvorlig akut (allergisk) reaktion ledsaget af feber og blistre på huden/afskalning af huden og små prikker forårsaget af blødning i huden.
- Pludselig betændelse i bugspytkirtlen ledsaget af kraftig smerte i den øvre del af maven og om i ryggen.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter/behandlede

- Furosemid kan forårsage for stor udskillelse af kropsvæsker (dvs. man tisser oftere end normalt) og mineraler (natrium, kalium, magnesium, calcium). Symptomer der kan forekomme er tørst, hovedpine, forvirring, muskelkramper, muskelsammentrækninger, muskelsvaghed, forstyrrelser i hjerterytmen og mave-tarmproblemer såsom uro og utilpashed i maven med opkastning eller diarre.
- **Hvis du har natriummangel:**
 - Krampe i lægmusklerne
 - Manglende appetit
 - Ugidelighed
 - Svaghed
 - Svimmelhed
 - Døsighed
 - Forvirring
- **Hvis du har kaliummangel:**
 - Muskelsvaghed og manglende evne til at trække en eller flere muskler sammen (lammelse)
 - Øget udskillelse af urin
 - Hjerterproblemer
 - Ved alvorlig kaliummangel: påvirkning af tarmfunktionen eller forvirring, der kan føre til koma
- **Hvis du har magnesium eller calciummangel:**
 - Muskelsammentrækninger
 - Forstyrrelser i hjerterytmen
 - Lavt blodtryk, hvilket resulterer i nedsat koncentration og reaktionsevne, svimmelhed, en følelse af trykken inde i hovedet, hovedpine, døsighed, kroppen føles svag, synsforstyrrelser, tør mund og manglende evne til at stå oprejst.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter/behandlede

- Unormale blodtal ledsaget af blå mærker og blødningstendens
- Lysfølsomhed
- Ufrivillig vandladning (inkontinens)
- Hos ældre kan der forekomme fald i blodvolumen, væskemangel og fortykning af blodet. Dette kan føre til dannelse af blodpropper.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter/behandlede

- Unormale blodtal (for få hvide blodlegemer) ledsaget af øget modtagelighed overfor infektioner
- Forhøjelse af bestemte blodceller (eosinophile celler)
- Kriblende fornemmelse på huden, kløe eller prikken uden årsag
- Livstruende bevidstløshed
- Påvirkning af hørelsen og ringen for ørerne. Disse lidelser er normalt forbigående
- Betændelse i et blodkar
- Akut nyresvigt
- Nyrebetændelse ledsaget af blod i urinen, feber og smerter i siderne. Hvis du har tilstoppet urinrør, kan øget urinproduktion forekomme eller blive forværret.
- Hvis du har en sygdom i blæren, forstørret prostata eller forsnævring af urinlederne kan urinproduktionen pludselig stoppe
- Shock (kraftigt fald i blodtryk, ekstrem bleghed, rastløshed, svag hurtig puls, klam hud, påvirket bevidsthed) som resultat af en pludselig alvorlig udvidelse af blodkarrene pga. allergi.
- Feber
- Mindre psykiske forstyrrelser

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter/behandlede

- Anæmi (mangel på røde blodlegemer)
- Meget alvorlig forstyrrelse i blodbilledet (mangel på hvide blodlegemer) ledsaget af pludselig høj feber, kraftige smerter i halsen og sår i munden
- Visse leversygdomme
- Forhøjelse af visse leverenzymmer

Ved behandling med furosemid kan niveauerne af visse fedtstoffer (kolesterol og triglycerider) stige, men vender ofte tilbage til det normale indenfor 6 måneder.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Furosemid Copyfarm utilgængeligt for børn.

Æsker med blisterkort: Opbevares ikke over 25 °C. Opbevares i original emballage.

Plastbeholder: Opbevares ikke over 25 °C. Bøtten holdes tæt lukket.

Brug ikke Furosemid Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Copyfarm indeholder:

- Aktivt stof: furosemid 20 mg eller 40 mg
- Øvrige indholdsstoffer: laktosemonohydrat, majsstivelse, pregelatineret majsstivelse, natriumstivelsesglycolat (type A) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid Copyfarm 20 mg er runde, hvide til off white tabletter, den ene side mærket F20, den anden side mærket BL.

Furosemid Copyfarm 40 mg er runde, hvide til off white tabletter, den ene side med delekærv og mærket F40, den anden side mærket BL.

Al/PVC/PVdC blisterkort, pakningsstørrelser af 28, 30, 50, 56, 84, 98 og 100 tabletter.

HDPE plastbeholder, pakningsstørrelser af 100, 250, 500 og 1000 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Copyfarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2014