

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Indapamid Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Indapamid Orifarms virkning og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Indapamid Orifarm.
3. Sådan skal du tage Indapamid Orifarm.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Indapamid Orifarm.
6. Yderligere oplysninger.

1. Indapamid Orifarms virkning og hvad du skal bruge det til.

Virkemåde

Indapamid Orifarm tilhører gruppen af lægemidler kaldet vanddrivende midler. Indapamid Orifarm virker ved at øge udskillelsen af vand fra kroppen, hvormed blodtrykket sænkes.

Medicinen anvendes til

Forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Indapamid Orifarm.

Tag ikke Indapamid Orifarm hvis

- Du er overfølsom over for Indapamid, andre sulfonamider eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Indapamid Orifarm.
- Du har alvorlig nyresvigt.
- Du har en hjernelidelse forårsaget af svær leversygdom.
- Du har svært nedsat leverfunktion.
- Du har for lavt kaliumindhold i blodet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Indapamid Orifarm hvis

- I visse tilfælde bør der udvises forsigtighed ved brug af Indapamid Orifarm. Dette gælder hvis:
 - Du har forstyrrelser i væske- og saltbalancen og har nedsat leverfunktion.
 - Du er diabetiker.
 - Du har podagra (urinsyregigt).
 - Du har let til moderat nedsat nyrefunktion.
 - Du oplever en øget følsomhed af huden for lys.
- Doping: Hvis det virksomme indholdsstof forekommer i urinen ved kontrol, vil det medføre diskvalifikation af den sportsudøvende.

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler tages samtidigt, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler samtidig med Indapamid Orifarm, da dosis eventuelt skal justeres:

- Kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid, bepridil, difemanil (midler mod hjerterytmeforstyrrelser).
- Litium (middel mod sindslidelse).
- Visse antipsykotika (midler mod depression, f.eks. fenotiaziner, benzamider, butyrofenoner og tricykliske antidepressiva).
- Cisaprid (middel mod forstoppelse).
- Erythromycin, sparfloracin og moxifloxacin (antibiotika).
- Halofantrin (middel mod malaria).
- Mizolastin (middel mod allergi).
- Pentamidin (antimikrobielt middel).
- NSAID (smertestillende midler mod bl.a. gigt).
- ACE-hæmmere og Vincamin (midler mod forhøjet blodtryk).
- Amfotericin B (middel mod svampeinfektion).
- Tetracosactid (anvendes til undersøgelse af binyrebarkfunktionen).
- Laksativer (midler mod forstoppelse).
- Baclofen (muskelfalslappende middel).

- Digitalis præparater (midler mod utilstrækkelig hjertefunktion).
- Kaliumbesparende vanddrivende midler.
- Metformin (middel mod type II diabetes).
- Calcium salte.
- Cyklosporin (immunundertrykkende middel).
- Kortikosteroider (binyrebarkhormon).
- Iod-holdige kontrastmidler.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Indapamid Orifarm sammen med mad og drikkevarer

Da kan tage Indapamid Orifarm sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du bør ikke tage Indapamid Orifarm, hvis du er gravid.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke tage Indapamid Orifarm, da indapamid udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Indapamid Orifarm kan måske give bivirkninger, der specielt i begyndelsen af behandlingen i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Indapamid Orifarm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Indapamid Orifarm

Tag altid Indapamid Orifarm nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Tabletterne bør synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Må ikke tygges.

Voksne:

1 tablet pr. dag, fortrinsvis om morgenen.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at dosis justeres. Tal med lægen.

Børn:

Du må kun bruge Indapamid Orifarm efter lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Indapamid Orifarm må ikke anvendes ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Indapamid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Indapamid Orifarm, end der står i denne indlægsseddel, eller flere, end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Forstyrrelser i væske- og saltbalancen. Kvalme, opkastning, for lavt blodtryk, kramper, svimmelhed, sløvhed, forvirring samt abnorm stor, meget lille eller slet ingen vandladning.

Hvis du har glemt at tage Indapamid Orifarm

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Indapamid Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Udslæt med mindre afgrænsede røde pletter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Opkastning.
- Mindre blødninger i hud og slimhinder.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed, træthed, hovedpine, fornemmelse af prikken og snurren i huden.
- Kvalme, forstoppelse, mundtørhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Nældefeber. Kraftig afskalning og afstødning af hud. Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.

Hvis nogle af disse bivirkninger kommer, kontakt da læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Ændringer i blodbilledet.
- Hjerterytmeforstyrrelser, for lavt blodtryk.
- Betændelse i bugspytkirtlen.
- Unormal leverfunktion.
- Nyresvigt.
- Forhøjet calciumindhold i blodet.

Ikke kendt hyppighed:

- Forvirring, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen. **Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.**
- Forværring af bindevævssygdommen Lupus erythematosus disseminatus.
- Fald i mængden af kalium i blodet der resulterer i kaliummangel.
- Nedsat koncentration af natrium i blodet med dehydrering og lavt blodtryk ved skift fra liggende til stående stilling til følge.
- Øget følsomhed af huden for lys.
- Forøgelse af blodsukker og urinsyre i blodet.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Indapamid Orifarm utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Anvend ikke Indapamid Orifarm efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Indapamid Orifarm indeholder

Det virksomme indholdsstof i Indapamid Orifarm er:

Indapamid 1,5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Lactosemonohydrat, pregelatineret stivelse, hypromellose, silica dioxid, kolloid, magnesiumstearat, makrogol 6000 og titandioxid (E 171).

Indapamid Orifarms udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Hvide/off white, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter

Pakningsstørrelse:

28, 29, 30, 84, 90, 91 stk. i blister.

Det er ikke sikkert, at alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@Orifarm.com

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm Generics A/S.

Revisionsdato: 04/2008.



(01) 2901402

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700