

KLARIGEN®

Næsespray, opløsning, 1 mg/ml
Xylometazolin

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne i denne information. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Klarigen®.
3. Sådan skal du bruge Klarigen®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

- Klarigen® er et lægemiddel til anvendelse i næsen
- Klarigen® virker ved at få de mikroskopiske blodårer i næseslimhinden til at trække sig sammen, sådan at blodgennemstrømningen nedsættes og slimhindehævelsen derfor aftager. Virkningen kommer efter et par minutter og varer 10 – 12 timer.

Medicinen anvendes til

Klarigen® anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og/eller bihulebetændelse. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Klarigen®.

Brug ikke Klarigen® hvis

- Du er overfølsom over for xylometazolinhydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Klarigen®
- Du har grøn stær med snæver kammervinkel
- Du har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næsen eller munden

Særlige forholdsregler

- Klarigen® må ikke anvendes til børn under 2 år og ikke til børn under 10 år uden lægens anvisning.
- Behandlingen bør højst vare 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af slimhinden i næsen.
- Anvend Klarigen® med forsigtighed hvis du er følsom overfor stoffer, der giver dig søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelser i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk.

Klarigen® må kun anvendes efter lægens anvisning hvis du lider af

- stofskiftesygdomme
- sukkersyge
- forhøjet blodtryk
- åreforkalkning
- udposning på pulsåren
- visse hjertesygdomme
- vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata
- visse depressioner behandlet med MAO hæmmere

- sygdom hvor du får lægemiddel der forhøjer blodtrykket
 - en svulst udgående fra binyremarven, som producerer adrenalin.
- Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler anvendes samtidig, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende lægemidler samtidig med Klarigen®, da dosis eventuelt skal justeres:

- tricykliske eller tetracykliske antidepressive midler
- MAO-hæmmere
- midler som forhøjer blodtrykket.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du bør ikke bruge Klarigen® hvis du er gravid.

Amning

Du må kun bruge Klarigen® efter lægens anvisning hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klarigen® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klarigen®

Klarigen® indeholder sorbitol. Hvis din læge har fortalt dig, at du lider af intolerance for nogle sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Klarigen®.

3. Sådan skal du bruge Klarigen®.

Dosering

Voksne og børn over 10 år:

1 pust i hvert næsebor højst 3 gang daglig i højst 10 dage.

Ældre:

Samme dosis som angivet under "Voksne".


Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Brugsanvisning

1. Puds næsen. Fjern den løse plasthætte.

2. Inden sprayen tages i brug pumpes et par gange, indtil Klarigen® kommer ud af flasken som en fin tåge. Herefter er sprayen klar til anvendelse.
3. Sprayen anbringes mellem fingrene. Der pumpes ved at trykke kraven ned mod flasken.
4. Bøj hovedet let forover.
5. Spidsen på flasken føres op i næseboret. Der pumpes en gang, samtidig med at vejret trækkes gennem næsen. Gentag proceduren i det andet næsebor.



Har du brugt for meget Klarigen®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Klarigen®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer:

- Fald af legemstemperaturen
- Sveden
- Døsighed
- Hovedpine
- Hurtig og uregelmæssig puls
- Forhøjet blodtryk
- Koma

Har du glemt at bruge Klarigen®?

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Klarigen® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brænden, flod fra næsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Tilstoppet næse, især efter hyppig eller langvarig brug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Allergiske reaktioner.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirk-

ninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

- Opbevar Klarigen® utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Efter anbrud er Klarigen® holdbar i 12 uger.
- Anvend ikke Klarigen® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Klarigen®, næsespray, opløsning 1 mg/ml indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Klarigen® er:
Xylometazolinhydrochlorid 140 mikrogram/dosis

De øvrige indholdsstoffer er:

Dinatriumedetat; natriumdihydrogenphosphat dihydrat; dinatriumphosphatdodecahydrat; sorbitol og vand, renset.

Indeholder ikke konserveringsmidler.

Udseende

Klarigen® er en klar væske i plastsprayflaske.

Pakningsstørrelser

10 ml sprayflaske

Markedsføring i Danmark

Copyfarm A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S
Mail: info@copyfarm.com

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Copyfarm A/S.

Revisionsdato: Maj 2007