

INDLÆGSEDLER FOR:

Lansoprazol Orifarm, hårde enterokapsler

Lansoprazol

15mg

Indhold:

Indlægsseddel for medicinen købt i håndkøb

Indlægsseddel for medicin købt på recept

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lansoprazol Orifarm, hårde enterokapsler, 15 mg

Pakningsstørrelser over 56 kapsler.

lansoprazol

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lansoprazol Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Orifarm
3. Sådan skal du tage Lansoprazol Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

#### **Virkemåde**

Lansoprazol Orifarm er en såkaldt syrepumpehæmmer, som virker ved at hæmme syreproduktionen i mavesækken.

#### **Medicinen anvendes til**

- Behandling af sår på tolvfingertarmen eller mavesår.
- Behandling af inflammation af dit spiserør (betændelse forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret, også kaldet reflux sygdom).

- Forebyggelse af betændelse i spiserøret forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret (reflux sygdom).
- Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre.
- Behandling af infektioner forårsaget af *Helicobacter pylori* i kombination med antibiotika.
- Behandling eller forebyggelse af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat NSAID behandling (NSAID behandling bruges mod smerte eller inflammation).
- Behandling af sår i mavesækken eller tolvfingertarmen forårsaget af øget produktion af mavesyre på grund af forøget produktion af det hormon, som styrer dannelsen af mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Lægen kan have givet dig Lansoprazol Orifarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LANSOPRAZOL ORIFARM

### Tag ikke Lansoprazol Orifarm

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for lansoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du tager et lægemiddel, som indeholder det aktive stof atazanavir (anvendes til behandling af HIV).

### Vær ekstra forsigtig med at tage Lansoprazol Orifarm

Fortæl din læge, hvis du har en alvorlig leversygdom. Din læge kan have behov for at justere dosis.

Din læge vil muligvis udføre eller have udført en undersøgelse som kaldes endoskopi for at diagnosticere din lidelse samt udelukke ondartede lidelser.

Hvis diarre forekommer under behandlingen med Lansoprazol Orifarm skal du straks kontakte din læge, eftersom lansoprazol er blevet forbundet med en lille øgning i infektiøs diarre.

Hvis din læge har givet dig Lansoprazol Orifarm sammen med anden medicin til behandling af *Helicobacter pylori* infektion (antibiotika) eller sammen med anti-inflammatorisk medicin til behandling af smerte eller rheumatiske sygdomme: læs venligst også indlægssedlen for disse lægemidler.

Hvis du tager Lansoprazol Orifarm som langtidsbehandling (længere end 1 år) vil din læge sandsynligvis holde dig under jævnligt opsyn. Du bør rapportere alle nye eller usædvanlige symptomer og omstændigheder når du ser din læge.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særligt vigtigt at du fortæller din læge hvis du tager medicin, som indeholder nogle af de følgende aktive indholdsstoffer, eftersom Lansoprazol Orifarm kan påvirke måden disse lægemidler virker på:

- Ketoconazol, itraconazol, rifampicin (bruges mod infektioner).
- Digoxin (bruges mod hjerteproblemer).
- Theophyllin (bruges mod astma).
- Tacrolimus (bruges til at forhindre afstødning af transplantationer)
- Fluvoxamine (bruges mod depression og psykiske sygdomme).
- Antacida (bruges til at behandle halsbrand og tilbageløb af syre).
- Sucralfat (bruges til opheling af mavesår).
- Prikbladet perikum (*Hypericum perforatum*) (bruges til at behandle mild depression).

### **Brug af Lansoprazol Orifarm sammen med mad og drikke**

For at få det bedste resultat bør du tage Lansoprazol Orifarm mindst 30 minutter før mad.

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid, ammer eller der er en mulighed for at du kan være gravid, skal du spørge din læge til råds inden du tager denne medicin.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Bivirkninger som svimmelhed, balanceproblemer, træthed og synsforstyrrelser kan nogle gange forekomme hos patienter som tager Lansoprazol Orifarm. Hvis du oplever bivirkninger som disse, skal du udvise forsigtighed eftersom din reaktionsevne kan være påvirket.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lansoprazol Orifarm**

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## **3. SÅDAN SKAL DU TAGE LANSOPRAZOL ORIFARM**

Tag altid Lansoprazol Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

## Dosering

Du skal sluge kapslerne hele sammen med vand. Hvis du har svært ved at sluge kapslerne kan din læge anvisne alternative måder at tage denne medicin på. Du må ikke knuse eller tygge kapslerne eller indholdet af den tømte kapsel, fordi dette vil forhindre medicinen i at virke ordentligt.

Hvis du tager Lansoprazol Orifarm en gang daglig skal du prøve at tage det på samme tid hver dag. Du får muligvis de bedste resultater hvis du tager Lansoprazol Orifarm som det første om morgenen.

Dosen af Lansoprazol Orifarm afhænger af din sygdom. Den sædvanlige dosis for voksne er angivet nedenfor. Din læge kan nogen gange udskrive en anden dosis og vil fortælle dig hvor lang tid din behandling vil vare.

## Voksne

### Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre

15 mg eller 30 mg daglig i fire uger. Hvis dine symptomer ikke er forsvundet skal du kontakte din læge. Hvis dine symptomer ikke forbedres inden for fire uger skal du kontakte lægen.

### Behandling af sår på tolvfingertarmen

30 mg daglig i to uger.

### Behandling af mavesår

30 mg daglig i fire uger.

### Behandling af betændelse i spiserøret (reflux sygdom)

30 mg daglig i fire uger.

### Langtidsbehandling af reflux sygdom

15 mg daglig. Din læge kan justere dosis til 30 mg daglig.

### Behandling af infektion med *Helicobacter pylori*

Den sædvanlige dosis er en 30 mg kapsel i kombination med to forskellige antibiotika om morgenen og en 30 mg kapsel i kombination med to forskellige antibiotika om aftenen. Behandlingen er sædvanligvis hver dag i syv dage.

De anbefalede kombinationer af antibiotika er:

- 30 mg Lansoprazol Orifarm sammen med 250-500 mg clarithromycin og 1000 mg amoxicillin.
- 30 mg Lansoprazol Orifarm sammen med 250 mg clarithromycin og 400-500 mg metronidazol.

Hvis du bliver behandlet for infektion fordi du har mavesår er det usandsynligt at dit mavesår kommer tilbage når din infektion er blevet behandlet med succes. For at give medicinen den bedste mulighed for at virke skal du tage medicinen på det rigtig tidspunkt og det er vigtigt ikke at misse en dosis.

### Behandling af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat behandling med NSAID

30 mg daglig i fire uger.

### Forebyggelse af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat behandling med NSAID

15 mg daglig. Din læge kan justere dosis til 30 mg daglig.

### Zollinger-Ellisons syndrom

Den sædvanlige dosis er to 30 mg kapsler hver dag til at begynde med, og herefter vil din læge justerede dosis afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen.

### **Børn**

Brugen af Lansoprazol Orifarm anbefales ikke til børn.

### **Hvis du har taget for mange Lansoprazol Orifarm**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lansoprazol Orifarm, end der står i denne indlægsseddel eller mere, end lægen har foreskrevet.

### **Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Orifarm**

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til næste dosis. Hvis dette sker, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

### **Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Orifarm**

Du må ikke stoppe behandlingen før tid, fordi dine symptomer er aftaget. Din tilstand er måske endnu ikke fuldstændigt helbredt og kan vende tilbage, hvis du ikke gennemfører hele behandlingsforløbet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. BIVIRKNINGER**

Lansoprazol Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Diarre, forstoppelse, mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, tør eller øm mund eller hals.
- Udslæt, kløe.
- Ændringer i leverfunktions test.
- Træthed.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter):

- Depression.
- Ledsmerter eller muskelsmerter.
- Øget væske i kroppen (ødem) eller hævelser.
- Ændringer i blodets sammensætning.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mindre end 1 ud af 1000 patienter):

- Feber.
- Rastløshed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, svimmelhed som følge af balanceproblemer.
- Smagsændringer, tab af appetit, betændelse i tungen (glossitis).
- Hudreaktioner som en brændende eller prikkende fornemmelse under huden, blå mærker, rødmen og øget svedtendens.
- Følsomhed overfor lys.
- Hårtab.
- Følelse af myrekryb (paræstesi), rysten.
- Anæmi (bleghed).
- Nyreproblemer.
- Betændelse i bugspytkirtlen.
- Betændelse i leveren (kan ses som gule øjne eller gul hud).
- Brysthævelser hos mænd, impotens.
- Candidiasis (svampeinfektion som kan påvirke hud eller slimhinder).
- Angioødem: du bør kontakte lægen med det samme hvis du oplever symptomer på angioødem, som hævelse af ansigtet, tungen eller svælget, besvær med at synke, udslæt eller vejrtrækningsproblemer.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Svære overfølsomhedsreaktioner herunder også shock. Symptomerne på overfølsomhedsreaktioner kan inkludere feber, udslæt, hævelser og nogen gange fald i blodtrykket.
- Betændelse i munden (stomatitis).
- Betændelse i tyktarmen (colitis).
- Ændringer i testværdier såsom natrium, kolesterol og triglycerider.
- Meget alvorlige hudreaktioner med rødmen, blærer, alvorlig inflammation og hudtab.
- Meget sjældent kan lansoprazol forårsage en reduktion af antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft overfor infektioner kan svækkes. Hvis du oplever en infektion med symptomer som feber og alvorlig forringelse af din almene tilstand, eller feber med lokale symptomer såsom øm hals/svælg/mund eller problemer med urinvejene, skal du straks kontakte din læge. En blodprøve vil blive taget for at undersøge en mulig reduktion af antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lansoprazol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Lansoprazol Orifarm, 15 mg, hårde enterokapsler indeholder:**

Aktivt stof: Lansoprazol, 15 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Hypromellose; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), dispersion 30%; triethylcitrat; saccharose; majsstivelse; talcum; gelatine; titandioxid (E171) og sort printfarve.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Lansoprazol Orifarm 15 mg er hvide kapsler mærket med LAN 15.

Pakningsstørrelser: 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
5260 Odense S  
Danmark  
info@orifarm.com

### **Denne indlægsseddel blev senest revideret**

06/2011

---

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

## INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

**Lansoprazol Orifarm, hårde enterokapsler, 15 mg**

**Pakningsstørrelser over 56 kapsler.**

lansoprazol

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lansoprazol Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen:**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Orifarm
3. Sådan skal du tage Lansoprazol Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

#### **Virkemåde**

Lansoprazol Orifarm er en såkaldt syrepumpehæmmer, som virker ved at hæmme syreproduktionen i mavesækken.

**Medicinen anvendes til**

- Behandling af sår på tolvfingertarmen eller mavesår.
- Behandling af inflammation af dit spiserør (betændelse forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret, også kaldet reflux sygdom).
- Forebyggelse af betændelse i spiserøret forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret (reflux sygdom).
- Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre.
- Behandling af infektioner forårsaget af *Helicobacter pylori* i kombination med antibiotika.
- Behandling eller forebyggelse af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat NSAID behandling (NSAID behandling bruges mod smerte eller inflammation).
- Behandling af sår i mavesækken eller tolvfingertarmen forårsaget af øget produktion af mavesyre på grund af forøget produktion af det hormon, som styrer dannelsen af mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Lægen kan have givet dig Lansoprazol Orifarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LANSOPRAZOL ORIFARM

### Tag ikke Lansoprazol Orifarm

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for lansoprazol eller et af de øvrige indholdstoffer.
- hvis du tager et lægemiddel, som indeholder det aktive stof atazanavir (anvendes til behandling af HIV).

### Vær ekstra forsigtig med at tage Lansoprazol Orifarm

Fortæl din læge, hvis du har en alvorlig leversygdom. Din læge kan have behov for at justere dosis.

Din læge vil muligvis udføre eller have udført en undersøgelse som kaldes endoskopi for at diagnosticere din lidelse samt udelukke ondartede lidelser.

Hvis diarre forekommer under behandlingen med Lansoprazol Orifarm skal du straks kontakte din læge, eftersom lansoprazol er blevet forbundet med en lille øgning i infektiøs diarre.

Hvis din læge har givet dig Lansoprazol Orifarm sammen med anden medicin til behandling af *Helicobacter pylori* infektion (antibiotika) eller sammen med anti-inflammatorisk medicin til behandling af smerte eller rheumatiske sygdomme: læs venligst også indlægssedlen for disse lægemidler.

Hvis du tager Lansoprazol Orifarm som langtidsbehandling (længere end 1 år) vil din læge sandsynligvis holde dig under jævnligt opsyn. Du bør rapportere alle nye eller usædvanlige symptomer og omstændigheder når du ser din læge.

### Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særligt vigtigt at du fortæller din læge hvis du tager medicin, som indeholder nogle af de følgende aktive indholdsstoffer, eftersom Lansoprazol Orifarm kan påvirke måden disse lægemidler virker på:

- Ketoconazol, itraconazol, rifampicin (bruges mod infektioner).
- Digoxin (bruges mod hjerteproblemer).
- Theophyllin (bruges mod astma).
- Tacrolimus (bruges til at forhindre afstødning af transplantationer)
- Fluvoxamine (bruges mod depression og psykiske sygdomme).
- Antacida (bruges til at behandle halsbrand og tilbageløb af syre).
- Sucralfat (bruges til opheling af mavesår).
- Prikbladet perikum (*Hypericum perforatum*) (bruges til at behandle mild depression).

### **Brug af Lansoprazol Orifarm sammen med mad og drikke**

For at få det bedste resultat bør du tage Lansoprazol Orifarm mindst 30 minutter før mad.

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid, ammer eller der er en mulighed for at du kan være gravid, skal du spørge din læge til råds inden du tager denne medicin.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Bivirkninger som svimmelhed, balanceproblemer, træthed og synsforstyrrelser kan nogle gange forekomme hos patienter som tager Lansoprazol Orifarm. Hvis du oplever bivirkninger som disse, skal du udvise forsigtighed eftersom din reaktionsevne kan være påvirket.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lansoprazol Orifarm**

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

## **3. SÅDAN SKAL DU TAGE LANSOPRAZOL ORIFARM**

Tag altid Lansoprazol Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

## Dosering

Du skal sluge kapslerne hele sammen med vand. Hvis du har svært ved at sluge kapslerne kan din læge anvise alternative måder at tage denne medicin på. Du må ikke knuse eller tygge kapslerne eller indholdet af den tømte kapsel, fordi dette vil forhindre medicinen i at virke ordentligt.

Hvis du tager Lansoprazol Orifarm en gang daglig skal du prøve at tage det på samme tid hver dag. Du får muligvis de bedste resultater hvis du tager Lansoprazol Orifarm som det første om morgenen.

Dosen af Lansoprazol Orifarm afhænger af din sygdom. Den sædvanlige dosis for voksne er angivet nedenfor. Din læge kan nogen gange udskrive en anden dosis og vil fortælle dig hvor lang tid din behandling vil vare.

## Voksne

### Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre

15 mg eller 30 mg daglig i fire uger. Hvis dine symptomer ikke er forsvundet skal du kontakte din læge. Hvis dine symptomer ikke forbedres inden for fire uger skal du kontakte lægen.

### Behandling af sår på tolvfingertarmen

30 mg daglig i to uger.

### Behandling af mavesår

30 mg daglig i fire uger.

### Behandling af betændelse i spiserøret (reflux sygdom)

30 mg daglig i fire uger.

### Langtidsbehandling af reflux sygdom

15 mg daglig. Din læge kan justere dosis til 30 mg daglig.

### Behandling af infektion med *Helicobacter pylori*

Den sædvanlige dosis er en 30 mg kapsel i kombination med to forskellige antibiotika om morgenen og en 30 mg kapsel i kombination med to forskellige antibiotika om aftenen. Behandlingen er sædvanligvis hver dag i syv dage.

De anbefalede kombinationer af antibiotika er:

- 30 mg Lansoprazol Orifarm sammen med 250-500 mg clarithromycin og 1000 mg amoxicillin.
- 30 mg Lansoprazol Orifarm sammen med 250 mg clarithromycin og 400-500 mg metronidazol.

Hvis du bliver behandlet for infektion fordi du har mavesår er det usandsynligt at dit mavesår kommer tilbage når din infektion er blevet behandlet med succes. For at give medicinen den bedste mulighed for at virke skal du tage medicinen på det rigtig tidspunkt og det er vigtigt ikke at misse en dosis.

### Behandling af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat behandling med NSAID

30 mg daglig i fire uger.

### Forebyggelse af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat behandling med NSAID

15 mg daglig. Din læge kan justere dosis til 30 mg daglig.

### Zollinger-Ellisons syndrom

Den sædvanlige dosis er to 30 mg kapsler hver dag til at begynde med, og herefter vil din læge justerede dosis afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen.

### **Børn**

Brugen af Lansoprazol Orifarm anbefales ikke til børn.

### **Hvis du har taget for mange Lansoprazol Orifarm**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lansoprazol Orifarm, end der står i denne indlægsseddel eller mere, end lægen har foreskrevet.

### **Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Orifarm**

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til næste dosis. Hvis dette sker, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

### **Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Orifarm**

Du må ikke stoppe behandlingen før tid, fordi dine symptomer er aftaget. Din tilstand er måske endnu ikke fuldstændigt helbredt og kan vende tilbage, hvis du ikke gennemfører hele behandlingsforløbet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. BIVIRKNINGER**

Lansoprazol Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Diarre, forstoppelse, mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, tør eller øm mund eller hals.
- Udslæt, kløe.
- Ændringer i leverfunktions test.
- Træthed.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter):

- Depression.
- Ledsmerter eller muskelsmerter.
- Øget væske i kroppen (ødem) eller hævelser.
- Ændringer i blodets sammensætning.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mindre end 1 ud af 1000 patienter):

- Feber.
- Rastløshed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, svimmelhed som følge af balanceproblemer.
- Smagsændringer, tab af appetit, betændelse i tungen (glossitis).
- Hudreaktioner som en brændende eller prikkende fornemmelse under huden, blå mærker, rødmen og øget svedtendens.
- Følsomhed overfor lys.
- Hårtab.
- Følelse af myrekryb (paræstesi), rysten.
- Anæmi (bleghed).
- Nyreproblemer.
- Betændelse i bugspytkirtlen.
- Betændelse i leveren (kan ses som gule øjne eller gul hud).
- Brysthævelser hos mænd, impotens.
- Candidiasis (svampeinfektion som kan påvirke hud eller slimhinder).
- Angioødem: du bør kontakte lægen med det samme hvis du oplever symptomer på angioødem, som hævelse af ansigtet, tungen eller svælget, besvær med at synke, udslæt eller vejrtrækningsproblemer.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Svære overfølsomhedsreaktioner herunder også shock. Symptomerne på overfølsomhedsreaktioner kan inkludere feber, udslæt, hævelser og nogen gange fald i blodtrykket.
- Betændelse i munden (stomatitis).
- Betændelse i tyktarmen (colitis).
- Ændringer i testværdier såsom natrium, kolesterol og triglycerider.
- Meget alvorlige hudreaktioner med rødmen, blærer, alvorlig inflammation og hudtab.
- Meget sjældent kan lansoprazol forårsage en reduktion af antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft overfor infektioner kan svækkes. Hvis du oplever en infektion med symptomer som feber og alvorlig forringelse af din almene tilstand, eller feber med lokale symptomer såsom øm hals/svælg/mund eller problemer med urinvejene, skal du straks kontakte din læge. En blodprøve vil blive taget for at undersøge en mulig reduktion af antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lansoprazol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Lansoprazol Orifarm, 15 mg, hårde enterokapsler indeholder:**

Aktivt stof: Lansoprazol, 15 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Hypromellose; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), dispersion 30%; triethylcitrat; saccharose; majsstivelse; talcum; gelatine; titandioxid (E171) og sort printfarve.

### **Udseende og pakningsstørrelser**

Lansoprazol Orifarm 15 mg er hvide kapsler mærket med LAN 15.

Pakningsstørrelser: 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Orifarm Generics A/S  
Energivej 15  
5260 Odense S  
Danmark  
info@orifarm.com

### **Denne indlægsseddel blev senest revideret**

06/2011

---

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)