

LANSOPRAZOL ORIFARM

hårde enterokapsler, 15 mg

Pakningsstørrelser til og med 56 kapsler.

lansoprazol

**Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.**

Du kan få Lansoprazol Orifarm uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Lansoprazol Orifarm

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 14 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Orifarm
3. Sådan skal du tage Lansoprazol Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Lansoprazol Orifarm er en såkaldt syrepumpehæmmer, som virker ved at hæmme syreproduktionen i mavesækken.

Medicinen anvendes til

- Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre.

Din læge kan også udskrive Lansoprazol Orifarm til behandling af følgende tilstande

- Behandling af sår på tolvfingertarmen eller mavesår.
- Behandling af inflammation af dit spiserør (betændelse forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret, også kaldet reflux sygdom).
- Forebyggelse af betændelse i spiserøret forårsaget af tilbageløb af syre i spiserøret (reflux sygdom).
- Behandling af infektioner forårsaget af *Helicobacter pylori* i kombination med antibiotika.
- Behandling eller forebyggelse af sår på tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter som har brug for fortsat NSAID behandling (NSAID behandling bruges mod smerte eller inflammation).
- Behandling af sår i mavesækken eller tolvfingertarmen forårsaget af øget produktion af mavesyre på grund af forøget produktion af det hormon, som styrer dannelsen af mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Lægen kan have givet dig Lansoprazol Orifarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Orifarm

Tag ikke Lansoprazol Orifarm

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for lansoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du tager et lægemiddel, som indeholder det aktive stof atazanavir (anvendes til behandling af HIV).

Vær ekstra forsigtig med at tage Lansoprazol Orifarm

Fortæl din læge, hvis du har en alvorlig leversygdom. Din læge kan have behov for at justere dosis.

Din læge vil muligvis udføre eller have udført en undersøgelse som kaldes endoskopi for at diagnosticere din lidelse samt udelukke ondartede lidelser.

Hvis diarre forekommer under behandlingen med Lansoprazol Orifarm skal du straks kontakte din læge, eftersom lansoprazol er blevet forbundet med en lille øgning i infektiøs diarre.

Hvis din læge har givet dig Lansoprazol Orifarm sammen med anden medicin til behandling af *Helicobacter pylori* infektion (antibiotika) eller sammen med anti-inflammatorisk medicin til behandling af smerte eller reumatiske sygdomme: læs venligst også indlægssedlen for disse lægemidler.

Hvis du tager Lansoprazol Orifarm som langtidsbehandling (længere end 1 år) vil din læge sandsynligvis holde dig under jævnligt opsyn. Du bør rapportere alle nye eller usædvanlige symptomer og omstændigheder når du ser din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særligt vigtigt at du fortæller din læge hvis du tager medicin, som indeholder nogle af de følgende aktive indholdsstoffer, eftersom Lansoprazol Orifarm kan påvirke måden disse lægemidler virker på:

- Ketoconazol, itraconazol, rifampicin (bruges mod infektioner).
- Digoxin (bruges mod hjerteproblemer).
- Theophyllin (bruges mod astma).
- Tacrolimus (bruges til at forhindre afstødning af transplantationer)
- Fluvoxamine (bruges mod depression og psykiske sygdomme).
- Antacida (bruges til at behandle halsbrand og tilbageløb af syre).
- Sucralfat (bruges til ophelelse af mavesår).
- Prikbladet perikum (*Hypericum perforatum*) (bruges til at behandle mild depression).

Brug af Lansoprazol Orifarm sammen med mad og drikke

For at få det bedste resultat bør du tage Lansoprazol Orifarm mindst 30 minutter før mad.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Hvis du er gravid, ammer eller der er en mulighed for at du kan være gravid, skal du spørge din læge til råds inden du tager denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger som svimmelhed, balanceproblemer, træthed og synsforstyrrelser kan nogle gange forekomme hos patienter som tager Lansoprazol Orifarm. Hvis du oplever bivirkninger som disse, skal du udvise forsigtighed eftersom din reaktionsevne kan være påvirket.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lansoprazol Orifarm

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Lansoprazol Orifarm

Tag altid Lansoprazol Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Du skal sluge kapslerne hele sammen med vand. Hvis du har svært ved at sluge kapslerne kan din læge anviser alternative måder at tage denne medicin på. Du må ikke knuse eller tygge kapslerne eller indholdet af den tomte kapsel, fordi dette vil forhindre medicinen i at virke ordentligt.

Voksne

Behandling af halsbrand og tilbageløb af syre
15 mg eller 30 mg daglig i fire uger. Hvis dine symptomer ikke er forsvundet skal du kontakte din læge. Hvis dine symptomer ikke forbedres inden for fire uger skal du kontakte lægen.

Børn

Brugen af Lansoprazol Orifarm anbefales ikke til børn.

Hvis du har taget for mange Lansoprazol Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lansoprazol Orifarm, end der står i denne indlægsseddel eller mere, end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Orifarm

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til næste dosis. Hvis dette sker, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Orifarm

Du må ikke stoppe behandlingen før tid, fordi dine symptomer er aftaget. Din tilstand er måske endnu ikke fuldstændigt helbredt og kan vende tilbage, hvis du ikke gennemfører hele behandlingsforløbet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Lansoprazol Orifarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed.
- Diarre, forstoppelse, mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, tør eller øm mund eller hals.
- Udslæt, kløe.
- Ændringer i leverfunktions test.
- Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter):

- Depression.
- Ledsmarter eller muskelsmerter.
- Øget væske i kroppen (ødem) eller hævelser.
- Ændringer i blodets sammensætning.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1000 patienter):

- Feber.
- Rastløshed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, svimmelhed som følge af balanceproblemer.
- Smagsændringer, tab af appetit, betændelse i tungen (glossitis).
- Hudreaktioner som en brændende eller prikkende fornemmelse under huden, blå mærker, rødmen og øget svedtendens.
- Følsomhed overfor lys.
- Hårtab.
- Følelse af myrekryb (paræstesi), rysten.
- Anæmi (bleghed).
- Nyreproblemer.
- Betændelse i bugspytkirtlen.
- Betændelse i leveren (kan ses som gule øjne eller gul hud).
- Brysthævelser hos mænd, impotens.
- Candidiasis (svampeinfektion som kan påvirke hud eller slimhinder).
- Angioødem: du bør kontakte lægen med det samme hvis du oplever symptomer på angioødem, som hævelse af ansigtet, tungen eller svælget, besvær med at synke, udslæt eller vejrtrækningsproblemer.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Svære overfølsomhedsreaktioner herunder også shock. Symptomerne på overfølsomhedsreaktioner kan inkludere feber, udslæt, hævelser og nogen gange fald i blodtrykket.
- Betændelse i munden (stomatitis).
- Betændelse i tyktarmen (colitis).
- Ændringer i testværdier såsom natrium, kolesterol og triglycerider.
- Meget alvorlige hudreaktioner med rødmen, blærer, alvorlig inflammation og hudtab.
- Meget sjældent kan lansoprazol forårsage en reduktion af antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft overfor infektioner kan svækkes. Hvis du oplever en infektion med symptomer som feber og alvorlig forringelse af din almene tilstand, eller feber med lokale symptomer såsom øm hals/svælg/mund eller problemer med urinvejene, skal du straks kontakte din læge. En blodprøve vil blive taget for at undersøge en mulig reduktion af antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lansoprazol Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Lansoprazol Orifarm, 15 mg, hårde enterokapsler indeholder:

Aktivt stof:

Lansoprazol, 15 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Hypromellose; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), dispersion 30 %; triethylcitrat; saccharose; majsstivelse; talcum; gelatine; titandioxid (E171) og sort printfarve.

Udseende og pakningsstørrelser

Lansoprazol Orifarm 15 mg er hvide kapsler mærket med LAN 15.

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 2x49, 50, 56 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2011

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk



266680201