

Terbinafin Copyfarm

250 mg tabletter

Terbinafin



Læs denne indlægseddelse grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægseddelen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Terbinafin Copyfarm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægseddelen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Terbinafin Copyfarm
3. Sådan skal du tage Terbinafin Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Terbinafin Copyfarm tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antimykotika (svampemidler).

Terbinafin Copyfarm anvendes til behandling af svampeinfektioner i hud og negle, som skyldes terbinafinfølsomme svampe.

Lægen kan have givet dig Terbinafin Copyfarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Terbinafin Copyfarm

Tag ikke Terbinafin Copyfarm

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for terbinafin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Terbinafin Copyfarm
- hvis du har meget nedsat nyrefunktion
- hvis du har meget nedsat leverfunktion

Vær ekstra forsigtig med at tage Terbinafin Copyfarm

- Tal med lægen, inden du tager Terbinafin Copyfarm, hvis du
- har eller har haft en leversygdom
 - har psoriasis
 - er gravid eller planlægger at blive gravid mens du tager Terbinafin Copyfarm
 - får feber eller ondt i halsen under behandlingen, bør du kontakte lægen.

Vær opmærksom på følgende

Det er vigtigt, at du øjeblikkeligt kontakter lægen, hvis du får vedvarende kvalme, opkastninger, mavesmerter, anoreksi, usædvanlig træthed, gulsot, hudkløe, usædvanlig mørkfarvet urin eller lys afføring (tegn på leverproblemer).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:

- Rifampicin
- Cimetidin
- P-piller (du kan få menstruationsforstyrrelser og pletblødninger)
- Medicin mod depression eller andre psykiske sygdomme
- Medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen
- Beta-blokkere
- Ciklosporin

Anden medicin kan påvirke virkningen af Terbinafin Copyfarm, eller Terbinafin Copyfarm kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Terbinafin Copyfarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Terbinafin Copyfarm uafhængigt af mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Terbinafin Copyfarm, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer må du ikke tage Terbinafin Copyfarm, da Terbinafin Copyfarm går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbinafin Copyfarm påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Men hvis du bliver svimmel, mens du tager Terbinafin Copyfarm, skal du lade være med at arbejde med værktøj eller maskiner, og du skal ikke køre bil eller motorcykel og lade være med at cykle.

3. Sådan skal du tage Terbinafin Copyfarm

Tag altid Terbinafin Copyfarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Tabletterne bør indtages hele sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Voksne og ældre:

Den sædvanlige dosis er 250 mg én gang om dagen.

Behandlingens længde afhænger af infektionens type og alvor.

Hudinfektioner

Den sædvanlige behandlingstid er:

- Hudinfektion: 2-6 uger
- Negleinfektion: 6-12 uger selv om det for nogle patienter med infektion i tånegle kan være nødvendigt at tage tabletterne i 6 måneder eller længere.

Børn og unge:

Børn og unge må normalt ikke få Terbinafin Orifarm 250 mg tabletter.

Nedsat nyrefunktion:

Det er nødvendigt at reducere dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Patienter med en kronisk eller aktiv leversygdom må normalt ikke bruge Terbinafin Copyfarm.

Hvis du har taget for meget Terbinafin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Terbinafin Copyfarm, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering: Hovedpine, kvalme, mavepine og svimmelhed.

Hvis du har glemt at tage Terbinafin Copyfarm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Terbinafin Copyfarm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Følg altid lægens anvisninger. Forskellige personer har forskellige behov.

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer sig, efter behandlingen med Terbinafin Copyfarm er stoppet.

4. Bivirkninger

Terbinafin Copyfarm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er observeret hos patienter, der behandles med terbinafin:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hovedpine, nedsat appetit, utilpashed, fordøjelsesbesvær, diarré, mæthedsfølelse, lettere mavesmerter, nældefeber, udslet, hævelse, ildebefindende, og træthed. Der er observeret muskelsmerter og ledsmerter, ofte med en allergisk hudreaktion som hævelse eller udslet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Tab af smagssans eller ændret smagssans, som normaliseres nogen tid efter endt behandling er blevet observeret af et lille antal patienter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Myrekryben, nedsat følesans, svimmelhed, alvorlige allergiske reaktioner, træthed og sovende fornemmelser eller snurren. Lever-påvirkning (fx gulsot, galdeophobning i galdegange, leverbetændelse) og alvorligt hududslæt (hævelse og blisterdannelse). Hvis du får nogle af disse symptomer, så skal du omgående holde op med at tage din medicin og fortælle lægen det..

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Påvirkning af blodets sammensætning, depression og angst, svimmelhed eller forværring af psoriasis. Hvis du tager P-piller, så skal du være opmærksom på, at terbinfin kan medføre menstruationsforstyrrelser. Det er sjældent, at der er blevet observeret alvorlige hudreaktioner som for eksempel lysfølsomhed, hårtab, alvorlige hudskader og Stevens-Johnson syndrom, eller at der viser sig områder med misdannelse af hud og væv. En tilstand, som kaldes lupus (en længerevarende sygdom med symptomer som hududslæt og led- og muskelsmerter), kan forekomme eller forværres. Behandling skal afsluttes, hvis der kommer fremadskridende hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.meldenbivirkning.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Terbinafin Copyfarm utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Terbinafin Copyfarm ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Terbinafin Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Terbinafin Copyfarm 250 mg tabletter:

- Aktivt indholdsstof: terbinafin som hydrochlorid.
- Øvrige indholdstoffer: magnesiumstearat, vandfri kolloidal kiselsyreanhydrid, hypromellose, mikrokrySTALLINSK cellulose og croscarmellose-natrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Terbinafin Copyfarm 250 mg tabletter er en rund, hvid, flad tablet med skrå kant, præget med "R250" på den ene side og med kærv på den anden side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eller 100 tabletter og bølter med 60 eller 500 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Copyfarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Telefon: 63 95 28 00
Mail: info@copyfarm.com

Fremstiller:

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd, 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, UK

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Copyfarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 05.2010



110870103